

BASF

We create chemistry



Mibelya®

Fungicida

EL SECRETO DE UN ARROZ
SANO Y RENTABLE

FUNGICIDA

Mibelya®

EL SECRETO DE UN ARROZ

SANO Y RENTABLE

Mibelya® SC es un fungicida con acción preventiva y curativa que está compuesto por dos ingredientes activos: Revysol® (Mefentrifluconazole) y Xemium® (Fluxapiroxad) fungicidas con propiedades sistémicas y de amplio espectro de control.

Su cultivo de arroz libre de las principales enfermedades (*Rhizoctonia*, *Gaeumannomyces*) con una química innovadora de alto desempeño, que con un menor número de aplicaciones mantiene el cultivo sano por más tiempo, maximizando así la productividad y rentabilidad.

CULTIVO SANO Y PRODUCTIVO

Tranquilidad por su amplio espectro de control de las principales enfermedades del cultivo de arroz: *Rhizoctonia*, *Gaeumannomyces*.

OPTIMIZA SU INVERSIÓN

Herramienta antirresistencia, combinando dos mecanismos de acción, con dos ingredientes activos únicos e innovadores.

MAXIMIZA LA RENTABILIDAD DE SU CULTIVO

Menor número de aplicaciones por ciclo de cultivo, con alta eficacia y persistencia en el control.



BASF Soluciones para la
Agricultura



BASF

We create chemistry



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Mibelya® SC en arroz se debe aplicar en épocas tempranas de manera preventiva, cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda rotar con otros mecanismos de acción como estrategia de manejo antirresistencia. Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo.



RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	*P.C. (días)	**P.R.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Pudrición de la vaina (<i>Gaeumannomyces graminis</i>)	0.5 L/ha	21	12 horas
	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.4 L/ha		

*P.C. = Periodo de Carencia en días **P.R. = Periodo de reentrada.

*Los límites máximos pueden no haber sido establecidos en otros países o diferir de los existentes en Colombia, por lo que, para los cultivos tratados o subproductos destinados a la exportación, se debe respetar el límite máximo de residuos en el país de destino.

**Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO



Cuidado



BASF Ecuatoriana S.A.
Av. Rodrigo de Chávez, Parque empresarial
Colón, Edificio Pacífica Center.
Piso 9, Guayaquil.
agriculture.bASF.com/ec
Línea de atención al cliente:
+593 4 2687170



We create chemistry



@BASF.AgroCO



Basf_Agro_Lap_Sur



BASF Soluciones para la Agricultura
Latinoamérica Pacífico



Triple Lavado

- Vierta la solución al tanque de aspersión.
- Entregue el envase vacío y con triple lavado en los sitios autorizados por el programa "Campo Limpio" de recolección de envases.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.



En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM a los teléfonos:
1800-593005 - WhatsApp: +573124628730. Servicio las 24 horas.

Servicio al Cliente BASF. Tels.: 0800 - 555 - 2273.

- Vierta la solución al tanque de aspersión.
- Entregue el envase vacío y con triple lavado en los sitios autorizados por el programa "Campo Limpio" de recolección de envases.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.