Termidor® WG





Inovação da marca líder no controle de cupins, com alta eficácia e menor contato do aplicador com o produto. Indicado para tratamentos pré e pós-construção, controla e previne infestações de cupins, eliminando colônias com um efeito residual eficaz.

Benefícios

- Facilidade na manipulação e aplicação.
- Controle mais rápido e ágil, economizando recurso.
- Sachês hidrossolúveis de 4g, com a menor e mais fácil dosagem.
- Excelente diluição e homogeneização.
- Efeito residual no controle de cupins de solo potencializado.



agriculture.basf.com/br/pt.html

fazenda-agro.basf.com

^{@ @}basf_agro_br

BASF Agro Brasil

[®] BASF Agricultural Solutions



Características do Produto

Grupo Químico
Fenil Pirazol



Concentração
Fipronil 80% p/p

FormulaçãoWG (Grânulos dispersíveis em água)

Embalagem 45x16x0,16kg

Modo de Aplicação

• 10 litros de calda são suficientes para tratar 200 m² de superfície.

Pragas	Nome científico	Doses (sachê) para 10L de água	Locais de aplicação
Barata	Blattella germanica e Periplaneta americana	1 sachê (4g)	Perímetro e superfície, ralos, bueiros, frestas e fendas
Pulga	Ctenocephalides spp.	1 sachê (4g)	Perímetro e superfície, ralos, bueiros, frestas e fendas
Formiga doméstica	Tapinoma melanocephalum e Monomorium spp.	1 sachê (4g)	Perímetro e superfície, ralos, bueiros, frestas e fendas
Formiga lava-pé	Solenopsis spp.	1 sachê (4g)	Na parte epígea do montículo de forma que encharque o ninho, preferencialmente em períodos de temperatura mais amena (primeiras horas do período da manhã)
Formiga cortadeira	Atta ssp.	1 sachê (4g)	Nos locais onde as formigas estão forrageando, sobre suas trilhas e ao redor e dentro do ninho, quando possível. Recomenda-se fazer também a aplicação no perímetro de jardins, estruturas e/ou edíficos.
Formiga carpinteira	Camponotus spp.	1 sachê (4g)	Nos locais onde as formigas estão forrageando, sobre suas trilhas e ao redor e dentro do ninho, quando possível. Recomenda-se fazer também a aplicação no perímetro de jardins, estruturas e/ou edíficos.
Cupim subterrâneo	Coptotermes gestroi, Nasutitermes spp. e heterotermes	1 sachê (4g)	Pré-Construção e Pós-Construção
Cupim de madeira seca	Cryptotermes brevis	1 sachê (4g)	Injeção em áreas nidificadas
Carrapatos	Rhipicephaulus spp.	2 sachê (8g)	Frestas, fendas, paredes e piso