
Zampro®

Fungicida





Papa





D • BASF

We create chemistry

Control efectivo de Mildio en vid y Pasmo negro en papa

- · Fungicida con doble efecto
- · Curativo y erradicante
- El mejor aliado para el cuidado de su cultivo
- NO necesita coadyuvantes (surfactante, pegantes y aceite)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: FUNGICIDA CON DOBLE EFECTO



Curativo:

Initium[®] actúa bloqueando una enzima de la cadena respiratoria mitocondrial en los patógenos oomicetes, causando una rápida perdida en los niveles de ATP celular y la muerte del hongo.

Residual:

Dimetomorf: interrumpe la formación de la pared celular del hongo. La actividad antiesporulante del dimetomorf disminuye la diseminación de la infección.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Ingrediente activo: Concentración de i.a.: Grupo químico: Tipo de formulación: Initium (Ametoctradin)
300 g/lt
Triazolopirimidilaminas
Suspensión Concentrada SC

Dimetomorf 225 g/lt Morfolina

BENEFICIOS:

Alta protección: Con acción preventiva, alto poder curativo y erradicante (efecto antiesporulante).

Tiene dos ingredientes activos que se complementan uno al otro entregando protección contra todas las fases del ciclo de vida del hongo. Acción preventiva "Premium" con actividad sistémica local dada por Initium[®] y acción sistémica, preventiva y curativa de dimetomorf.

Ideal para manejo anti-resistencia: No tiene resistencia cruzada con otros fungicidas. Presenta una excelente selectividad para los cultivos recomendados.

Formulación liquida (SC), cómoda y flexible: Mezcla lista, ya formulada. Resistente al lavado de lluvia y compatible con otros productos.

NO necesita coadyuvantes (surfactante, pegantes y aceite)

MANEJO Y DOSIS:

Vid Botritis de la vid 1 (Botritis cienerea) Papa Tizon tardío 1a 1.2	CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/ha
Papa Tizon tardío 1a 1.2	Vid	The state of the s	1
(Pnytophthora infestans)	Papa	Tizon tardío (Phytophthora infestans)	1a 1.2











