Alika®

- Excelente poder de volteo.
- Máxima residualidad.
- Acción sistémica de contacto e ingestión.
- Control adicional de trips, defoliadores y tucuras.
- Control prolongado de ninfas.
- Se obtiene mayor rendimiento que con el uso de endosulfán.
- Menor porcentaje de chauchas vanas.
- Menor porcentaje de granos vacíos y dañados.
- Mezcla lista para usar.

LISTO PARA APLICAR

TIAMETOXAM
(Neonicotinoide)

LAMBDACIALOTRINA
(Piretroide microencapsulado)

ALIKA® es un producto registrado de SYNGENTA AGRO S.A.

BASF Argentina S.A.
0800-555-2273
Tucumán 1 (C1049AAA)
Ciudad de Buenos Aires
agro.basf.com.ar
/ BASFAgroArgentina

BASF
We create chemistry

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

GONZALEZ TARRAS/GUEVARA

Alika®

Volteo y residualidad con mayor rendimiento

BASF
We create chemistry

Alika®

Excelente control de chinches y otras plagas.

Alika® es un insecticida foliar de alta tecnología que combina dos principios activos:

- **Lambdacialotrina:** piretroide microencapsulado de última generación que garantiza un excelente poder de volteo.
- **Tiametoxam:** neonicotinoide con muy buena solubilidad en agua y altamente sistémico que ofrece excelente residualidad.

- Excelente poder de volteo.
- Mayor residualidad.
- Altamente sistémico.
- Mayor control de chinches y orugas defoliadoras.

MÁXIMO VOLTEO Y RESIDUALIDAD

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN	
Tipo de aplicación	Aérea o Terrestre
Volumen de agua	Aérea: 10 l/ha - Terrestre: 80-100 l/ha
Cobertura	20-25 impactos por cm^2 en la parte media del cultivo
Pastilla	Abanico Plano o TK
Tamaño de gota	200-400 micrones
Humedad relativa	Superior a 40%
Temperatura óptima	Inferior a 30ºC
Vehículo	Agua, no mezclar con gasoil

Plagas que controla

Soja

Alika® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y permite obtener un excelente control de chinches (ninfas y adultos) y también de trips, defoliadoras y tucuras.

PLAGA	DOSIS	UMBRALES (Siembras a 52 cm) Estadios reproductivos de la soja		
		R3-R4	R5	R6-R7
Chinche verde *(Nezara viridula)*	200 cm^2	0,6 a 0,7/m lineal	1,5/m lineal	3 a 4/m lineal
Chinche de la alfalfa *(Piezodorus guildinii)*	200 cm^2	0,4 a 0,5/m lineal	0,7/m lineal	2/m lineal
Alquiche chico *(Edessa meditabunda)*	200 cm^2	2 a 3/m lineal	4/m lineal	Más de 10/m lineal

PLAGA	DOSIS	UMBRALES (Siembras a 52 cm)	
		Período vegetativo	Período reproductivo
Oruga de las leguminosas *(Anticarsia gemmatalis)*	150-200 cm^2/ha	20 orugas mayores de 1,5 cm/m lineal	10 orugas mayores de 1,5 cm/m lineal
Oruga medidora *(Rachiplusia nu)*	150-200 cm^2/ha	20 orugas mayores de 1,5 cm/m lineal	10 orugas mayores de 1,5 cm/m lineal
Trips *(Caliothrips phaseoli)*	150-200 cm^2/ha	5 ninfas por folíolo	
Tucuras *(Dichroplus sp.)*	150 cm^2/ha	VC-V4 2 tuc/m^2	V5-R5 5 tuc/m^2

Otros cultivos

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Algodón	Pulgón del algodonero *(Aphis gossypii)*	200 cm^3/ha
	Trips (Caliothrips phaseoli, *Frankliniella schultzei)*	
	Oruga capullera *(Heliothis sp.)*	
	Mosca blanca *(Bemisia tabaci)*	
	Mosca blanca de los invernáculos *(Trialeurodes vaporariorum)*	
	Chinche tintórea *(Dysdercus chaquensis)*	
Cebolla	Trips *(Thrips tabaci)*	200 cm^3/ha
Durazno	Pulgón negro *(Aphis gossypii)*	50 cm^3/100 l de agua + 500 cm^3 de aceite mineral refinado 90% p/v/100 l de agua. Lograr una dosis mínima de 750 cm^3/ha.
	Polilla del duraznero, Grafolita *(Cydia molesta)*	
Pasturas a base de alfalfa	Tucuras *(Dichroplus sp.)*	150 cm^3/ha
	Trips *(Thrips tabaci)*	150-200 cm^3/ha
	Trips de los invernáculos *(Heliothrips haemorrhoidalis)*	
	Pulgón azul *(Acyrthosiphon kondoi)*	75-100 cm^3/ha
	Pulgón de las leguminosas *(Aphis craccivora)*	
Tomate	Mosca blanca *(Bemisia tabaci)*	100 cm^3/100 l de agua. Asegurar una dosis mínima de 800 cm^3/ha.
	Mosca blanca de los invernáculos *(Trialeurodes vaporariorum)*	
Trigo	Pulgón verde de los cereales *(Schizapis graminum)*	75 cm^3/ha
	Pulgón de la espiga *(Sitobium avenae)*