

Gebruik

RODEX® G BLOC is een vochtbestendige waxblok op basis van gemengde graansoorten en gebroken graan in eetbare paraffinewas ter bestrijding van ratten en muizen zowel binnenshuis als buitenshuis (rond gebouwen) en in rioleringen.

RODEX® G BLOC bevat 0,005% bromadiolone, een bloedstollingsremmend middel, en een bitterstof als afschrikmiddel voor mens en niet-doelwit dieren. De dood treedt slechts op na enkele dagen (4 tot 10 dagen)

Dosis

Ratten:

- Grote plaag: tot 200 g lokaas per lokaaspunt om de 5m
- Geringe plaag: tot 200 g lokaas per lokaaspunt om de 10m

Muizen:

- Grote plaag: Tot 40 g lokaas per lokaaspunt om de 2m
- Geringe plaag: tot 40 g lokaas per lokaaspunt om de 5m

Het aantal te gebruiken lokdozen is afhankelijk van de te behandelen zone, de geografische context en de besmettingsgraad. Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen ('tamper-resistant') lokdozen. Te gebruiken in afgedekte en beveiligde lokaaspunten.


Gebruiksaanwijzing, risicobeperkende maatregelen en overige informatie : zie bijsluiter

VEILIGHEID

Kan het ongeboren kind schaden. Veroorzaakt schade aan organen bloed bij langdurige of herhaalde blootstelling .. Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Beschermende handschoenen dragen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud en verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SICHERHEIT

Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Schädigt die Organe Blut bei längerer oder wiederholter Exposition. Enthält 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Bei Exposition oder falls betroffen Ärztlichen Rat einholen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt und Behälter nach einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfall zuführen.



Rodex® G Bloc

miniblokjes met centrale opening
mini blocs à ouverture centrale

Usage

RODEX® G BLOC est un bloc coulé résistant à l'humidité à base d'un mélange de céréales et de grains concassés dans de la paraffine comestible, destiné à la lutte contre les rats et les souris à l'intérieur et à l'extérieur (autour des bâtiments) et dans les égouts.

RODEX® G BLOC contient 0,005 % de bromadiolone, un anticoagulant, et un agent d'amertume qui rend le produit dissuasif pour les personnes et les animaux non ciblés. La mort survient quelques jours (4 à 10 jours) après la consommation de l'appât, sans éveiller la méfiance des rongeurs. L'appât est utilisable pendant toute l'année.

Dosage

Rats:

- Forte infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres
- Faible infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 10 mètres

Souris:

- Forte infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 2 mètres
- Faible infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres
- Nombre de stations d'appât dépend du site traité, du contexte géographique, du niveau et de la gravité de l'infestation.
- Appâts prêts à l'emploi à utiliser dans des boîtes d'appâtage sécurisées.
- Appâts prêts à l'emploi à utiliser dans des stations d'appâtage couvertes et protégées.

Mode d'emploi, mesures de gestion des risques et autre information : voir notice

SECURITE

Peut nuire au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les organes sang à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

GEVAAR / DANGER / GEFÄHR



Tegen ratten en muizen binnenshuis, buitenshuis,
in rioleringen en op vuilstortplaatsen

Contre les rats et les souris à l'intérieur,
à l'extérieur, dans les égouts et décharges

Biocide PT14 – rodenticide

Lokaas in blokform, klaar voor gebruik

Appât en bloc, prêt-à-l'emploi (RB)

Gewaarborgde samenstelling - Composition garantie:
Bromadiolone 0,0050% (CAS 28772-56-7).

Toelatingsnummer - Numéro d'autorisation: BE2013-0017

Toelatingshouder - Détenteur de l'autorisation :

PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay,

69002 Lyon Frankrijk tél. +33 472 15 78 51

Tel. Antigifcentrum - Centre Antipoisons: 070 245 245

a Pelsis Group Brand  **pelsis**

Verdeeld door/Distribué par:

Pelsis Belgium NV

Industrieweg 15 · B-2880 Bornem

T: +32 (0)3 886 22 11 · F: +32 (0)3 886 24 60

www.edialux.com · E: info@edialux.be



V-1731



Lotnr. / N° du lot: zie verpakking - voir l'emballage

10 kg e

+/- 500 blokjes van 20 g met centrale opening
+/- 500 blocs de 20 g à ouverture centrale

RODENTICIDE BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK (gesloten circuit)
RODENTICIDE DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL (circuit restreint)

Version 12-2019

RODEX® G BLOC

RODEX G BLOC

RODENTICIDE DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL (circuit restreint)

RB - Appât en bloc prêt-à-l'emploi. Biocide PT14 – rodenticide

Composition garantie: Bromadiolone 0,005% (CAS 28772-56-7)

Numéro d'autorisation: BE2013-0017

Détenteur de l'autorisation : PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay, 69002 Lyon Frankrijk tél. +33 472 15 78 51 Centre Antipoisons: 070 245 245

USAGE

RODEX® G BLOC est un bloc coulé résistant à l'humidité à base d'un mélange de céréales et de grains concassés dans de la paraffine comestible, destiné à la lutte contre les rats et les souris à l'intérieur et à l'extérieur (autour des bâtiments) et dans les égouts.

RODEX® G BLOC contient 0,005 % de bromadiolone, un anticoagulant, et un agent d'amertume qui rend le produit dissuasif pour les personnes et les animaux non ciblés. La mort survient quelques jours (4 à 10 jours) après la consommation de l'appât, sans éveiller la méfiance des rongeurs. L'appât est utilisable pendant toute l'année.

UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

Utilisation 1 - Souris domestiques et rats – Professionnels - Intérieur

Organisme cible : Rattus norvegicus-rat brun-juvéniles et adultes. Mus musculus-Souris domestique Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Taux et fréquences d'application : Rats: Forte infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Faible infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 10 mètres. Souris: Forte infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 2 mètres. - Faible infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Consignes d'utilisation spécifiques : - Souris: Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. - Rats: Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. - Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné. Mesures de gestion des risques spécifiques : - Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

Utilisation 2 - Souris domestiques et rats – réservé aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées – intérieur
Organisme cible : Mus musculus-Souris domestique-Rattus norvegicus-Rat brun-Adultes et juvéniles. Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Points d'appâts couverts et protégés. Taux et fréquences d'application : Rats: Forte infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Faible infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 10 mètres. Souris: Forte infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 2 mètres. - Faible infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Consignes d'utilisation spécifiques : Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement. - Lorsque cela est possible, il est recommandé de revisiter la zone traitée toutes les 4 semaines au minimum afin d'éviter de favoriser la sélection d'une population résistante. - Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné. Mesures de gestion des risques spécifiques : - Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation. - Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable. - Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé. L'appâtage permanent est strictement limité aux sites présentant un fort potentiel de réinfestation lorsque d'autres méthodes de contrôle se sont révélées insuffisantes. - La stratégie d'appâtage permanent doit être régulièrement réexaminée dans le contexte d'une lutte intégrée et de l'évaluation du risque de réinfestation. - Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

Utilisation 3 - Souris et rats – professionnels – extérieur autour de bâtiments

Organisme cible : Rattus norvegicus-rat brun-Mus musculus-House mouse-Adultes et juvéniles

- Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés. Taux et fréquences d'application : Rats: Forte infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Faible infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 10 mètres. Souris: Forte infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 2 mètres. - Faible infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Appâtage dans terrier: 20-200 g d'appât par terrier. Consignes d'utilisation spécifiques : Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. - Souris: Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. - Rats: Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. - Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné. Mesures de gestion des risques spécifiques : - Ne placer pas directement ce produit dans les terriers. - Lorsque des points d'appât sont placés à proximité d'eaux de surfaces ou de systèmes d'évacuation des eaux, (rivières, étangs, canaux d'eau, digues, fossés d'irrigation) s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

Utilisation 4 - Souris et rats – professionnels ayant des compétences avancées démontrées –extérieur autour de bâtiments

Organisme cible : Mus musculus-souris domestique-Rattus norvegicus-rat brun-Adultes et juvéniles. Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Points d'appâts couverts et protégés. Application directe d'appâts prêts à l'emploi dans le terrier. Taux et fréquences d'application : Rats: Forte infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Faible infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 10 mètres. Souris: Forte infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 2 mètres. - Faible infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Appâtage dans terrier: 20-200 g d'appât par terrier. Consignes d'utilisation spécifiques : Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. - Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. - Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement (sauf lorsqu'il est directement appliqué dans des terriers). - Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites stratégiques pour minimiser l'exposition aux espèces non ciblées. - Les appâts doivent être placés de manière à minimiser l'exposition des espèces non ciblées et des enfants. Couvrir ou bloquer les entrées du terrier où est placé l'appât afin de réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé. Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné. - Lorsque cela est possible, il est recommandé de revisiter la zone traitée toutes les 4 semaines au minimum afin d'éviter de favoriser la sélection d'une population résistante. Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné. Mesures de gestion des risques spécifiques : - Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation. - Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. - Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable. - Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé. L'appâtage permanent est strictement limité aux sites présentant un fort potentiel de réinfestation lorsque d'autres méthodes de contrôle se sont révélées insuffisantes. - La stratégie d'appâtage permanent doit être régulièrement réexaminée dans le contexte d'une lutte intégrée et de l'évaluation du risque de réinfestation.

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité d'eaux de surfaces ou de systèmes d'évacuation des eaux, (rivières, étangs, canaux d'eau, digues, fossés d'irrigation) s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

Utilisation 5 - Rats - Réservé aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées - Zones ouvertes extérieures et décharges

Organisme cible : Rattus norvegicus-rat brun-Adultes et juvéniles. Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Points d'appâts couverts et protégés. Application directe d'appâts prêts à l'emploi dans le terrier. Taux et fréquences d'application : Rats: Forte infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Faible infestation - Jusqu'à 200 g d'appât par point d'appât tous les 10 mètres. Souris: Forte infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 2 mètres. - Faible infestation - Jusqu'à 40 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres. Appâtage dans terrier: 20-200 g d'appât par terrier. Mesures de gestion des risques spécifiques : - Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation. - Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. - Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable. - Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé. L'appâtage permanent est strictement limité aux sites présentant un fort potentiel de réinfestation lorsque d'autres méthodes de contrôle se sont révélées insuffisantes. - La stratégie d'appâtage permanent doit être régulièrement réexaminée dans le contexte d'une lutte intégrée et de l'évaluation du risque de réinfestation. - Lorsque des points d'appât sont placés à proximité d'eaux de surfaces ou de systèmes d'évacuation des eaux, (rivières, étangs, canaux d'eau, digues, fossés d'irrigation) s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

Utilisation 6 - Rats – réservé aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées – égouts

Organisme cible : Rattus norvegicus-Rat brun-Adultes et juvéniles. Appât prêt à l'emploi à fixer ou appliquer dans des postes d'appâtage pour empêcher l'appât d'entrer en contact avec les eaux usées. Points d'appâts couverts et protégés. Taux et fréquences d'application : Rats: Jusqu'à 200 g par point d'appât (bouche d'égout) Consignes d'utilisation spécifiques : Les appâts doivent être appliqués de façon à ne pas entrer en contact avec l'eau et à ne pas être emportés. Mesures de gestion des risques spécifiques : Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. - Avant de placer un appât, mener un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation. - Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle. - Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. - Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcs, sites de nidification, parcs d'enfaisnement, trous, terriers, etc.). - Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. - Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette). Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts. - L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage. - Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés. - Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers. - Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374-1:2003) pendant la phase de manipulation du produit. - Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. - Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appât à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât. - Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de lutte alternative. Retirer tout appât restant ou les postes d'appât au terme de la période de traitement.

Professionnels ayant des compétences avancées démontrées

- Utilisateur déterminant lui-même la fréquence des inspections de la zone traitée, à la lumière des résultats de l'étude réalisée au début du traitement. Cette fréquence doit être compatible avec les recommandations contenues dans le code de bonnes pratiques applicable. - Les sites où l'on utilise des appâts dans les terriers devraient être visités plus fréquemment que ceux où l'on utilise des postes d'appâtage sécurisés.

MESURES DE GESTION DES RISQUES

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation. Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable. - Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement. - Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs. - Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants: Le produit ne doit pas être fourni au grand public (par exemple, « usage professionnel uniquement »). - L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. - Ne pas nettoyer les postes d'appâtage à l'eau entre deux applications. Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée.

Professionnels ayant des compétences avancées démontrées

- Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active. - Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.

Peut nuire au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les organes sang à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spécial.

Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées. - Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement. - En cas-: d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse; d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes; d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette. - Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. - Dangereux pour la faune.

Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Utilisation de gants est recommandée. L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée.

Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. - Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. - Durée de conservation: 2 ans.

Autres informations

- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. - Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinceaux pour les éliminer. - Ce produit contient un agent amérissant et un colorant.



RODEX® G BLOC

RODENTICIDE BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK (gesloten circuit)

RB – Lokaaas in blokvorm (klaar voor gebruik) Biocide PT14 – rodenticide

Gewaarborgde samenstelling: Bromadiolone 0,0050% (CAS 28772-56-7).

Toelatingsnummer: BE2013-0017

Toelatingshouder : PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay, 69002 Lyon Frankrijk tél. +33 472 15 78 51 Tel. Antificticentrum: 070 245 245.

GEBRUIK

RODEX® G BLOC is een vochtbestendige waxblok op basis van gemengde graansoorten en gebroken graan in eetbare paraffinewas ter bestrijding van ratten en muizen zowel binnenshuis als buitenshuis (rond gebouwen) en in rioleringen.

RODEX® G BLOC bevat 0,005% bromadiolone, een bloedstollingsremmend middel, en een bitterstof als afschrikmiddel voor mens en niet-doelwit dieren. De dood treedt slechts op na enkele dagen (4 tot 10 dagen)

TOEGELATEN GEBRUIK

Gebruik 1 – Huismuisen en/of ratten – professioneel – binnen

Doelorganisme: *Rattus norvegicus* Bruine rat *Mus musculus* Huismuis jonge en volwassen dieren. Klaar voor gebruik lokaaas. Kant-en-klaar lokaaas te gebruiken in beveilide lokaaasdozen. Dosering en frequentie van de toepassing: Ratten:- Grote plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. Geringe plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 10m. Muizen:- Grote plaag: Tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 2m. - Geringe plaag: tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies: - Huismuisen: Aan het begin van de behandeling moeten de lokaaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaaas wordt aanvaard, de lokaaasdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaaas aan wanneer dat nodig is. - Ratten: De lokaaasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaaas geaccepteerd wordt en de lokaaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaaas indien nodig aanvullen. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen: Wanneer lokaaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaaas met water wordt voorkomen.

Gebruik 2 – Huismuisen en/of ratten – gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – binnen

Doelorganisme: *Rattus norvegicus* Bruine rat *Mus musculus* Huismuis jonge en volwassen dieren. Klaar voor gebruik lokaaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen. Afgedekte en beschermde lokaaaspunten. Dosering en frequentie van de toepassing: Ratten:- Grote plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. - Geringe plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 10m. Muizen:- Grote plaag: Tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 2m. - Geringe plaag: tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies: - Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode. - Indien mogelijk wordt aanbevolen het behandelde gebied minimaal om de vier weken te bezoeken om selectie van een resistente populatie te voorkomen. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen: Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdiербestrijdingscampagne. Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. Om secundaire vergiftiging te voorkomen, zoek naar en verwijder dode knaagdieren op regelmatige tijdstippen tijdens de bestrijding, in lijn met de aanbevelingen van de code van goede praktijk. Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaaasbehandelingen. Permanente voorziening van lokaaas is beperkt tot locaties met een hoge kans op een nieuwe invasie wanneer andere bestrijdingsmethoden onvoldoende zijn gebleken. De strategie van permanente voorziening van lokaaas dient regelmatig te worden herzien in het kader van geïntegreerd plaagbeheer en de beoordeling van het risico op een nieuwe plaag. Wanneer lokaaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaaas met water wordt voorkomen.

Gebruik 3 – Huismuisen en/of ratten – professioneel – buiten rond gebouwen

Doelorganisme: *Rattus norvegicus* Bruine rat *Mus musculus* Huismuis jonge en volwassen dieren. Klaar voor gebruik lokaaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen. Directe toepassing van kant-en-klaar lokaaas in het hol. Afgedekte en beschermde lokaaaspunten. Dosering en frequentie van de toepassing: Ratten:- Grote plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. - Geringe plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 10m. Muizen:- Grote plaag: Tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 2m. - Geringe plaag: tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies: - Bescherm lokaaas tegen atmosferische omstandigheden (regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaaasdozen op plaatsen waar geen overstromingen kunnen optreden. - Huismuisen: Aan het begin van de behandeling moeten de lokaaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaaas aan wanneer dat nodig is. - Ratten: De aasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaaas indien nodig aanvullen. - Vervang lokaaas in lokaaaskisten waar het lokaaas werd aangetast door water of verontreinigd werd. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen: Dit product niet direct in de holten toepassen. Wanneer lokaaas dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaaas met water wordt voorkomen.

Gebruik 4 – Huismuisen en ratten – gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – buiten rond gebouwen

Doelorganisme: *Rattus norvegicus* Bruine rat *Mus musculus* Huismuis jonge en volwassen dieren. Kant-en-klaar lokaaas te gebruiken in beveilide lokaaasdozen. Afgedekte en beschermde lokaaaspunten. Directe toepassing van kant-en-klaar lokaaas in het hol. Dosering en frequentie van de toepassing: Ratten:- Grote plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. - Geringe plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 10m. Muizen:- Grote plaag: Tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 2m. - Geringe plaag: tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. Voor gebruik in holten: 20 - 200g lokaaas per hol. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies: - Bescherm lokaaas tegen atmosferische omstandigheden. Plaats de lokaaasdozen op plaatsen waar geen overstromingen kunnen optreden. - Vervang lokaaas in lokaaasdozen waar het lokaaas is aangetast door water of verontreinigd werd. - Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode. (behalve wanneer het product rechtstreeks in de holten wordt toegepast) - Voor buitentoepassing, moeten de lokaaaspunten afgedekt worden en op strategische plaatsen gezet om blootstelling aan niet-doelorganismen te minimaliseren. - Lokaaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt. Bedek of blokkeer de ingangen van holten die van lokaaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaaas eruit gegooid en versplind wordt. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan. - Indien mogelijk wordt aanbevolen het behandelde gebied minimaal om de vier weken te bezoeken om selectie van een resistente populatie te voorkomen. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen: Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van de behandelde zone en de omgeving) over de knaagdiербestrijdingscampagne. - Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. - Om secundaire vergiftiging te voorkomen, zoek naar en verwijder dode knaagdieren op regelmatige tijdstippen tijdens de bestrijding, in lijn met de aanbevelingen van de code van goede praktijk. - Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaaasbehandelingen. - Permanente voorziening van lokaaas is beperkt tot locaties met een hoge kans op een nieuwe invasie wanneer andere bestrijdingsmethoden onvoldoende zijn gebleken. - De strategie van permanente voorziening van lokaaas dient regelmatig te worden herzien in het kader van geïntegreerd plaagbeheer en de beoordeling van het risico op een nieuwe plaag. Wanneer lokaaas dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaaas met water wordt voorkomen.

Gebruik 5 – Ratten – gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – Open gebieden buiten vuilstorplaatsen

Doelorganisme: *Rattus norvegicus*-Bruine rat-Adulten en jongeren. Kant-en-klaar lokaaas te gebruiken in beveilide lokaaasdozen. Afgedekte en beschermde lokaaaspunten. Directe toepassing van kant-en-klaar lokaaas in het hol. Dosering en frequentie van de toepassing: Ratten:- Grote plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. - Geringe plaag: tot 200 g lokaaas per lokaaaspunt op de 10m. Muizen:- Grote plaag: Tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 2m. - Geringe plaag: tot 40 g lokaaas per lokaaaspunt op de 5m. Voor gebruik in holten: 20 - 200g lokaaas per hol. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies: - Bescherm lokaaas tegen atmosferische omstandigheden. Plaats de lokaaasdozen op plaatsen waar geen overstromingen kunnen optreden. - Vervang lokaaas in lokaaasdozen waar het lokaaas is aangetast door water of verontreinigd werd. - Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode. (behalve wanneer het product rechtstreeks in de holten wordt toegepast) - Voor buitentoepassing, moeten de lokaaaspunten afgedekt worden en op strategische plaatsen gezet om blootstelling aan nietdoelorganismen te minimaliseren. - Lokaaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt. Bedek of blokkeer de ingangen van holten die van lokaaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaaas eruit gegooid en versplind wordt. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan. - Indien mogelijk wordt aanbevolen het behandelde gebied minimaal om de vier weken te bezoeken om selectie van een resistente populatie te voorkomen. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen: Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van de behandelde zone en de omgeving) over de knaagdiербestrijdingscampagne. Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. - Om secundaire vergiftiging te voorkomen, zoek naar en verwijder dode knaagdieren op regelmatige tijdstippen tijdens de bestrijding, in lijn met de aanbevelingen van de code van goede praktijk. - Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaaasbehandelingen. - Permanente voorziening van lokaaas is beperkt tot locaties met een hoge kans op een nieuwe invasie

wanneer andere bestrijdingsmethoden onvoldoende zijn gebleken. - De strategie van permanente voorziening van lokaaas dient regelmatig te worden herzien in het kader van geïntegreerd plaagbeheer en de beoordeling van het risico op een nieuwe plaag. Wanneer lokaaas dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaaas met water wordt voorkomen.

Gebruik 6 – Ratten – gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – riolen

Doelorganisme: *Rattus norvegicus*-bruine rat-Adulten en jongeren. - Kant-en-klaar lokaaas om vast te leggen of toe te passen in lokaaasdozen om te voorkomen dat het lokaaas in contact komt met afvalwater. - Afgedekte en beschermde lokaaaspunten. Dosering en frequentie van de toepassing: Ratten:- Tot 200 g lokaaas per mangat. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen:- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaaasbehandelingen.

GEBRUIKSVORSCHRIFT

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkoopunt, alvorens het product te gebruiken. - Voor voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnsteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen. - Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnsteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaaas lastiger maakt. - Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden - Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. - Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdiëractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holten, nesten enz.). Waar mogelijk moeten de lokaaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt. Lokaaaskisten moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan). - Het lokaaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaaaskist. - Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doelsoorten. - Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruikvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee. Draag beschermende handschoenen (EN 374-1:2003) bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is. - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product. - Als de inname van het lokaaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaaskisten naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaaasformulering. - Als het lokaaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt; en geen afname in knaagdiëractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel. - Verwijder het resterende lokaaas of de lokaaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

Enkel voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling. De zones waar het het lokaaas wordt toegepast in de holten dienen meer frequent bezocht worden dan die waar het lokaaas wordt toegepast in lokaaasdozen.

RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders over de knaagdiербestrijdingscampagne. - Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen (bijv. ten minste twee keer per week) dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan. - De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling. - Gebruik lokaaas dat werkzame bloedverdünnende stoffen bevat niet als permanent lokaaas ter preventie van knaagdiërplagen of om knaagdiëractiviteit te monitoren. - De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat: Het product mag niet aan het algemene publiek worden geleverd (bijv. "uitsluitend voor professionals"). - Het etiket van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdiëractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen. - Reinig tussen het toepassen de lokaaaskisten niet met water. -Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hietoe gespecialiseerde of vergunde onderneming.

Enkel professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen. - Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdünnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel.

Kan het ongeboren kind schaden. Veroorzaakt schade aan organen bloed bij langdurige of herhaalde blootstelling ... Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Beschermende handschoenen dragen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud en verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Schädigt die Organe Blut bei längerer oder wiederholter Exposition. Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Bei Exposition oder falls betroffen ärztlichen Rat einholen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt und Behälter nach einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfälle zuführen.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen, mogelijk met enige vertraging, symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloedsuurstoringen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine. - Tegengif: Vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel. - In geval van: -blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep. - blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste tien minuten open houden. - blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Noot iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen - Raadpleeg een dierenarts bij inname van het product door een huisdier. - Gevaarlijk voor wilde dieren.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Gebruik van handschoenen wordt aanbevolen. De verpakking en (ongegeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hietoe gespecialiseerde of vergunde onderneming.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren. - Op een plaats bewaren waartoe kinderen, vogels, huis- en boerderijdieren geen toegang hebben. - Houdbaarheid: 2 jaar.

Overige informatie

- Vanwege de vertraagde werking kan het na consumptie van het lokaaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdünnende rodenticiden effectief zijn. - Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen. - Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof

GEVAAR/ GEFAHR



EDIALUX
PROFESSIONAL PRODUCTS
a Pelsis Group Brand **pelsis**
Verdeeld door:
Pelsis Belgium NV
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60
www.edialux.com • info@edialux.be