

AEDES
Protecta

LONGUE DURÉE

PRO⁵⁰
USAGE PROFESSIONNEL



Stelliox[®] D₅₀
SOURICIDE - RATICIDE



3 308082 001203

BLOCS NUS

Blocs extrudés nus 25g à base 0,005% Difénacoum

Numéro d'autorisation : FR-2013-0014 • blocs parafinés, prêt à l'emploi

Code article : RD-DIF-35029

Poids net
5 kg

CONSIGNES D'UTILISATION :

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation. Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle. Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcs, sites de nidification, parcs d'engraisement, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (voir section suivante pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette). Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts. L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être déplacé à l'extérieur du poste d'appâtage. Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât. Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants : dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative. Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (nitrile, caoutchouc).

► Usage contre rats et souris en intérieur

Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

► Usage contre rats et souris en extérieur autour des bâtiments, et usage contre rats en zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries

Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.

Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

MESURES DE GESTION DES RISQUES :

Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation. Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active. Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement. Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant. Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage. Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié. Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.

► Usage contre rats et souris en intérieur

Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (comblez les trous, retirez autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs. Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé. Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

► Usage contre rats et souris en extérieur autour des bâtiments

Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (comblez les trous, retirez autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs. Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé. Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

► Usage contre rats en zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries

Application dans les terriers : couvrir ou bloquer les entrées du terrier où est placé l'appât afin de réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé.

DETAILS RELATIFS AUX EFFETS INDESIRABLES DIRECTS OU INDIRECTS POSSIBLES, INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS ET MESURES D'URGENCE A PRENDRE POUR PROTEGER L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées. Antidote : Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement. En cas :

- d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;
- d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes;
- d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. Chaque poste

d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «STELLIOX® D50 ou FR-2013-0014»; «Difénacoum» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison». Dangereux pour la faune.

Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

CONSIGNES POUR UNE ELIMINATION SURE DU PRODUIT ET DES SON EMBALLAGE :

Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DUREE DE CONSERVATION DU PRODUIT BIOCIDÉ DANS LES CONDITIONS DE STOCKAGE NORMALES :

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Durée de conservation : 24 mois

AUTRES INFORMATIONS :

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Ce produit contient un agent amérissant et un colorant.

Dosage : Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées ou autres points d'appâts couverts et protégés.

Contre souris (Mus musculus), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 25 g d'appât par point d'appât espacés de 3 mètres.

Contre rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs (Rattus rattus), usage intérieur, extérieur autour des bâtiments, et zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries : 50-100 g d'appât par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres.

H360D Peut nuire au fœtus • **H373** Risque présumé d'effets graves pour les organismes aquatiques • **P201** Se procurer les instructions spéciales avant utilisation • **P202** Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité • **P262** Éviter tout contact avec les yeux, la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • **P280** Porter des gants de protection • **P301+P310** EN CAS d'ingestion: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON • **P314** Consulter un médecin en cas de malaise • **P404** Stocker dans un récipient fermé • **P405** Garder sous clé • **P501** Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale.

Centre antipoisons (France) : 01 45 42 59 59

Numéro d'autorisation : FR-2013-0014 • Biocide PT 14 (rodenticide)

Société responsable de la mise sur le marché : Belgagri SA, Rue des Tulliers 1, 4480 Engis, Belgium, +32 85 519 519

Contient 0.005% p/p difénacoum (CAS 56073-07-5)

UFI : 84KQ-SGJ7-5T57-RBWG

Distribué par **AEDES PROTECTA sas** - ZAC de la Plaine 13440 Cabannes
contact@an-protecta.eu - Tél. 04 90 02 16 20.



DANGER