

"LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO"

PARTE CENTRAL

"APLICACIÓN URBANA "

NYGUARD™
IGR



SECRETARÍA DE SALUD
COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE
PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS

ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 173300603X0012
20/12/2017

piriproxifen

INSECTICIDA / CONCENTRADO EMULSIONABLE / PIRIDINA

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL":

INGREDIENTE ACTIVO

piriproxifen

%p/p

10.0%

4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi)propil éter
(Equivalente a 93.8 g/L i.a. a 20°C)

INGREDIENTES INERTES

Solventes y Surfactantes

90.0%

TOTAL

100.0%

No. Registro:

Contenido Neto:

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

Número de Lote:

Fecha de Fabricación: AA/MM/DD

Fecha de Caducidad: Dos años a partir de su fecha de elaboración

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

VALENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Vallarta No. 6503 G 8

Col. Ciudad Granja, C.P. 45010,

Zapopan, Jalisco, México.

Tel. 01(33) 31 10 01 62

"HECHO EN E.U.A."

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

09



PRECAUCIÓN

Pantone Verde (347-C)

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Previamente a la aplicación de **NYGUARD™ IGR CONCENTRATE**, lea detenidamente esta etiqueta y las instrucciones de uso aquí recomendadas.

Antes de manipular, durante la preparación, carga y aplicación de este producto use el siguiente equipo de protección: camisa manga larga de algodón y pantalón u overol de algodón, utilice protección de vías respiratorias, protector de cara o lentes de seguridad con protección lateral, botas y guantes de neopreno. Durante la aplicación evite el contacto con la piel, y al finalizar la jornada laboral, antes de quitarse los guantes, deben lavarse con agua y jabón al igual que la ropa y equipo de protección utilizados. Al finalizar, deberá utilizar ropa limpia. La ropa y calzado utilizados deberán destinarse a este único fin y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Mantenga **NYGUARD™ IGR CONCENTRATE** en una habitación limpia, seca y ventilada, separada del lugar de vivienda.

- Antes de aplicar el producto, retire las mascotas, aves y cubra los acuarios.
- No utilice este producto en o sobre equipos eléctricos debido a la posibilidad de descargas eléctricas.
- Una vez que el producto sea aplicado, no permita el acceso de personas y mascotas a las áreas tratadas hasta que el rocío se haya secado.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO":

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA".

"PRIMEROS AUXILIOS"	
EN CASO DE INGESTIÓN:	▪ Llame inmediatamente a un centro de control toxicológico o a un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento. ▪ No administre ningún tipo de líquido a la persona. ▪ No induzca al vómito a menos que se lo indique el centro de control toxicológico o un médico. ▪ No administre nada por vía oral si la víctima esta inconsciente.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:	▪ Mantenga el ojo abierto y enjuague con agua limpia, lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos. ▪ Si lleva puesto lentes de contacto, quíteselos; después de transcurridos 5 minutos, continúe enjuagando el ojo. ▪ Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:	▪ Quítese la ropa contaminada y de inmediato, enjuáguese la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. ▪ Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento.
EN CASO DE INHALACIÓN:	▪ Trasladar a la persona a un sitio con aire fresco. ▪ Si la persona no respira, llamar a una ambulancia. Posteriormente, administrar respiración artificial por personal capacitado y, si es posible, preferiblemente boca a boca. ▪ Llamar al centro de información toxicológica o a un médico para obtener instrucciones adicionales.

SECRETARÍA DE SALUD
COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN
CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUTORIZACIÓN DE
PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS

ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 173300603X0012
2012/2017

PATRICIA DEL CARMEN GONZÁLEZ MORA
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES
COFEPRIS / SECRETARÍA DE SALUD

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

- Grupo químico: Piridina
- Antídoto y tratamiento médico: No existe antídoto específico, brindar tratamiento sintomático y de sostén.
- Los signos y síntomas de intoxicación más comunes por vía inhalatoria son; dolor de cabeza, náuseas, debilidad. Si el producto tiene contacto con los ojos o la piel, se puede presentar enrojecimiento e irritación. Si se ingiere, puede ocasionar dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito y debilidad.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PRODUCTOS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO."

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)."

"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO."

ESTADOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN
CONSEJO DE RIESGOS SANITARIOS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ENERGÍA

ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 173300603X0012
20/12/2017

PATRULLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES
COFEPRIS / SECRETARÍA DE SALUD



PRECAUCIÓN



Pantone Verde (347-C)

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

ÁREAS Y SITIOS DE APLICACIÓN

Puede aplicarse en interiores y exteriores de: Inmuebles (casas habitación, edificios, comerciales, hospitales, escuelas, vehículos de transporte, mobiliario y áreas recreativas).

INSECTOS QUE CONTROLA

Nombre Común

Cínifes
Cucarachas Alemanas
Cucarachas Asiáticas
Cucarachas de Banda Café
Escarabajo Dermestes
Escarabajo Negro
Escarabajos del Cuero
Escarabajos del Estiércol
Gorgojo Confuso de la Harina
Gorgojo de los Cigarros
Gorgojo Rojo de la Harina
Grillos
Hormigas
Jejenes
Moscas
Mosquitos
Polilla del Arroz
Polilla del Tabaco
Polilla India de la Comida
Polillas
Pulgas
Silvano del Maíz

Nombre Científico

Diptera
Blattella germanica
Blattella asahinai
Supella longipalpa
Dermestidae
Tenebrionidae
Silphidae
Alphitobius diaperinus
Tribolium confusum
Lasioderma serricorne
Tribolium Castaneum
Acheta domesticus
Formicidae
Nematocera
Diptera
Culicidae
Corcyra cephalonica
Ephestia elutella
Plodia interpunctella
Lepidoptera
Siphonaptera
Oryzaephilus surinamensis

PARA CONTROLAR LAS PULGAS (*Siphonaptera*):

El ingrediente activo de **NYGUARD™ IGR CONCENTRATE** es similar a las hormonas de crecimiento que se producen naturalmente en los insectos y actúan sobre los estados de vida inmaduros de la pulga, evitando así que se convierta en una pulga adulta. Los huevos de pulga depositados en las áreas tratadas no madurarán en pulgas adultas. Las larvas de pulga que anden por las superficies tratadas tampoco llegarán a pulgas adultas. Las propiedades exclusivas de **NYGUARD™ IGR CONCENTRATE** eliminan la población de pulgas cuando se usa según las instrucciones. **NYGUARD™ IGR CONCENTRATE** provoca una reducción gradual y finalmente elimina la población de pulgas al interrumpir su ciclo reproductivo. **NYGUARD™ IGR CONCENTRATE** interrumpe el ciclo vital de la pulga y detiene el desarrollo de los estadios inmaduros de huevos y larvas durante 7 meses, impidiendo que alcancen el estadio adulto, que es cuando pican. Las pulgas adultas y las pupas ya existentes no se ven afectadas.

Es importante controlar las pulgas en las mascotas para prevenir la introducción de pulgas adultas. Las mascotas, los lugares donde éstas duermen y frecuentan también deben tratarse con productos para el control de pulgas y garrapatas, como collares antipulgas y antigarrapatas, talco, spray, líquido para sumergir, champú para mascotas y champú antipulgas y antigarrapatas, como parte de un programa completo de control de las pulgas juntamente con esta aplicación para minimizar la introducción de pulgas adultas.

NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede usar antes de la temporada de pulgas. La aplicación de este producto en áreas que se sabe son frecuentadas por mascotas y otros animales y donde hayan ocurrido infestaciones previas prevendrá la aparición de pulgas adultas y también controlará las pulgas en aquellos estadios en que no son pulgas adultas. El tratamiento previo con este producto antes de que las pulgas se conviertan en adultas, y comiencen a picar y reproducirse ayudará a reducir las poblaciones en desarrollo.



SECRETARÍA DE SALUD
COMISION FEDERAL DE PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
DIRECCION EJECUTIVA DE AUTORIZACION DE
PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS

ETIQUETA AUTORIZADA
REF: EXP. NO. 173300603X0012
2012/2017

PATRICIA DEL CARMEN PONDE MOO
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES
COFEPRIS / SECRETARÍA DE SALUD

Control de Pulgas	Tratamiento	Preparación de la Solución para Rociar	Cobertura por Unidad de Superficie	Intervalos entre cada aplicación
Control de las Pulgas en Espacios Interiores	Aplicación Superficial General (Inclusivo al Voleo, Localizada, y en Grietas y Hendiduras)	4 ml *de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua	4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,500 pies cuadrados	 SECRETARÍA DE SALUD COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS Vuelva a aplicar en exterior cada 21 días
	En Conjunción con Champú para Alfombras	4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de dilución de champú	Sigue las instrucciones de la etiqueta del champú	
En Criaderos y Perrerías	Aplicación Superficial General (Inclusivo al Voleo, Localizada, y en Grietas y Hendiduras)	4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua	4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,500 pies cuadrados	
Control de las Pulgas al Aire Libre	Aplicación Superficial General (Inclusivo al Voleo, Localizada, y en Grietas y Hendiduras)	4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en un volumen de agua suficiente para lograr una cobertura completa	4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,000 pies cuadrados	

* ml = mililitros

CONTROL DE LAS PULGAS EN ESPACIOS INTERIORES:

Antes del tratamiento, se debe pasar bien a fondo la aspiradora a las alfombras, los cortinados y el mobiliario tapizado, y la bolsa de la aspiradora debe desecharse en un receptáculo para basura fuera de la casa. Saque las mascotas del área a tratar. No permita el acceso de personas y mascotas a las áreas tratadas hasta que el rocío se haya secado.

INSTRUCCIONES DE USO: NYGUARD™ IGR CONCENTRATE debe mezclarse con agua y aplicarse con equipo rociador a baja presión usado típicamente para aplicaciones en interiores.

PREPARACIÓN DEL ROCÍO: Prepare una solución diluida para rociar agregando 4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua. Llene parcialmente con agua el recipiente para la mezcla, agregue NYGUARD™ IGR CONCENTRATE, agite y llene hasta lograr el volumen final. No permita que la mezcla para rociar quede sin usar hasta el día siguiente. Mezcle antes de cada uso.

APLICACIÓN SUPERFICIAL GENERAL: Aplique NYGUARD™ IGR CONCENTRATE diluido en rocío a razón de 1 galón por cada 1,500 pies cuadrados. Aplique en todas aquellas áreas que puedan albergar pulgas, como alfombras, muebles, lugares donde duermen las mascotas y tapetes. Rocíe debajo de cojines y muebles tapizados. No permita que los niños o las mascotas entren en contacto con las superficies hasta que el rocío se haya secado.

EN CONJUNCIÓN CON CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS: NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede combinar con una aplicación de champú líquido para alfombras que no extraiga calor. Siga las instrucciones para la dilución del champú para alfombras, agregue 4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de champú diluido a aplicarse a la alfombra. Mezcle bien y limpie la alfombra siguiendo las instrucciones de la etiqueta del champú. Deje secar completamente y pase la aspiradora a fondo.

EN CRIADEROS Y PERRERAS: El tratamiento de estas áreas impedirá que las pulgas preadultas se transformen en pulgas adultas que pican y se reproducen. Con un rociador con manguera ajustable, un rociador de tipo tanque o una regadera, prepare una solución diluida mezclando 4 ml de producto por galón de agua. Llene el rociador parcialmente con el agua, agregue la cantidad necesaria de concentrado en el rociador, agite y llene hasta lograr el volumen final. Agite antes de rociar cada vez. No permita que la mezcla para rociar quede sin usar hasta el día siguiente.

Aplique a razón de 1 galón de solución diluida por cada 1,500 pies cuadrados de superficie. Aplique al edificio, las áreas de descanso, las paredes, el piso, las camas de los animales y las áreas para correr. Saque a los animales antes de rociar y no los lleve de vuelta a las zonas tratadas hasta que el rocío se haya secado completamente.

CONTROL DE LAS PULGAS AL AIRE LIBRE:

Aplique la solución de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en aquellos lugares que suelen frecuentar las mascotas, incluyendo, pero no limitado a debajo de árboles, plantas ornamentales y arbustos, entre otros sitios. Evite empapar las plantas jóvenes o en floración. Las pulgas adultas y las pupas ya existentes no se ven afectadas por este concentrado. La aplicación en el suelo brinda 21 días de actividad reguladora del crecimiento de los insectos.

PREPARACIÓN DEL ROCÍO: En un rociador con manguera, rociador tipo tanque o regadera, prepare una solución diluida para rociar agregando 4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en un volumen de agua suficiente para lograr una cobertura total de 1,000 pies cuadrados. Llene el rociador parcialmente con agua, agregue la cantidad necesaria de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en el rociador, agite y llene hasta lograr el volumen final. Agite antes de rociar cada vez.

Rocíe con un movimiento de barrido lento, asegurándose de cubrir aquellas superficies que las mascotas suelen frecuentar. No permita que la mezcla para rociar quede sin usar hasta el día siguiente. Se debe tener cuidado de no rociar cuando el viento pueda hacer que el rocío salpique a quien está aplicando el producto. No aplique este producto cerca de masas de agua. Repita la aplicación en 21 días. Saque a los animales antes de rociar y no permita que los animales regresen a las zonas tratadas hasta que el rocío se haya secado completamente.

PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS ALEMANAS (*Blattella germanica*), ASIÁTICAS (*Blattella asahina*), Y GRILLOS (*Acheta domestica*)

El ingrediente activo de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE es un regulador del crecimiento de los insectos similar a las hormonas de crecimiento que se producen naturalmente en los insectos y actúa sobre los estadios inmaduros de cucarachas y los grillos evitando que las ninfas se transformen en adultos reproductores. Al poco tiempo de aplicar el concentrado, comenzarán a aparecer cucarachas con las alas retorcidas, lo que indica que NYGUARD™ IGR CONCENTRATE ha surtido efecto: esas cucarachas con las alas retorcidas son incapaces de reproducirse. Las exclusivas propiedades de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE eliminan la población de cucarachas y grillos cuando se usan según las instrucciones. Un solo tratamiento actúa por 6 meses previniendo la metamorfosis de las ninfas de cucarachas y grillos.

Control de Cucarachas y Grillos	Tratamiento	Preparación de la solución para rociar	Cobertura por unidad de superficie	Intervalos entre cada aplicación
En Interiores	Aplicación Superficial General (Inclusivo al Voleo, Localizada, y en Grietas y Hendiduras)	11 ml *de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua	11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,500 pies cuadrados	Un solo tratamiento actúa por 6 meses
Al Aire Libre	Perímetro, Grietas y Hendiduras	11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua	11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,500 pies cuadrados	

*ml = mililitros

PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS (*Blattella*) Y GRILLOS (*Acheta domestica*) EN INTERIORES:

INSTRUCCIONES DE USO: NYGUARD™ IGR CONCENTRATE debe mezclarse con agua y aplicarse con equipo rociador, como un rociador a baja presión usado típicamente en interiores.

PREPARACIÓN DEL ROCÍO: Prepare una solución diluida para rociar mezclando 11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua. Llene parcialmente con agua el recipiente para la mezcla, agregue NYGUARD™ IGR CONCENTRATE, agite y llene hasta lograr el volumen final. Agite antes de rociar cada vez. No permita que la mezcla para rociar quede sin usar hasta el día siguiente.

APLICACIÓN SUPERFICIAL GENERAL: Aplique el rocío diluido a razón de 1 galón por cada 1,500 pies cuadrados de superficie como tratamiento localizado, superficial, y en grietas y hendiduras. Alcance la mayor cantidad de insectos posibles con este rocío además de rociar todas las partes de la habitación donde se sospeche que hay de estos insectos. Se debe prestar especial atención a escondrijos como debajo de fregaderos, detrás de estufas y refrigeradores, grietas y hendiduras, junto a cubos de basura, alacenas, junto a los zócalos, puertas y dinteles de ventanas, marcos de puertas y ventanas, sumideros, caños, plomería, detrás de bibliotecas, lugares de almacenamiento y de instalaciones de servicios públicos, muebles infestados e interior de alacenas y roperos, y rociar sobre los insectos siempre que sea posible. Repita la aplicación en 6 meses, o con más frecuencia si es necesario.

PARA TRATAMIENTOS PERIMETRALES AL AIRE LIBRE PARA CUCARACHAS (*Blattella*) Y GRILLOS (*acheta domestica*):

Prepare un rocío diluido mezclando 11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua en un rociador de bomba a baja presión. A razón de 1 galón por cada 1,500 pies, aplique una banda de 2-4 pies adyacente al perímetro de la estructura y hasta una altura de 2-3 pies de los mimientos donde es posible que haya o encuentren un lugar para entrar las plagas. Rocíe alrededor de marcos de ventanas, puertas, portones de garaje, patios, patios de madera, cobertizos para autos, persianas, donde se encuentran los cubos de basura y demás áreas donde puedan congregarse las cucarachas. Evite rociar al aire. Se debe tener cuidado de no rociar cuando el viento pueda hacer que el rocío salpique a quien está aplicando el producto. No aplique este producto cerca de masas de agua.

PARA EL CONTROL DE LAS PLAGAS DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS:

(Incluyendo Polilla India de la Comida (*Plodia interpunctella*), Polilla del Arroz (*Corcyra cephalonica*), Polilla del tabaco (*Ephesia elutella*), Gorgojo Roja de la Harina (*Tribolium Castaneum*), Gorgojo Confuso de la Harina (*Tribolium*

ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 17330603X0012
20/12/2017

PATRICIA BELARMINO DE MOO
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES
COFEPRIS / SECRETARÍA DE SALUD

confusum), Taladrillo de los Granos (*Rhyssopertha*), Silvano del Maiz (*Oryzaephilus surinamensis*), Gorgojo de los Cigarros (*Lasioderma serricorne*), Escarabajos Dermestes (*Dermestidae*).

ALMACENES: NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede aplicar como tratamiento superficial general, en forma niebla, localizadamente o en grietas y hendiduras en almacenes de alimentos y otros productos o en depósitos. Aplíquelo en aquellos lugares que puedan albergar insectos, inclusive debajo y entre las plataformas de carga. Repita la aplicación en 6 meses, o con más frecuencia si es necesario.

TRATAMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE MANIPULAN ALIMENTOS: (Lugares, excepto de registro sanitario, donde se preparan, procesan, preparan o sirven alimentos):

ÁREAS DONDE NO HAY ALIMENTOS: NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede usar para tratar áreas donde no hay comidas. Estas áreas incluyen cuartos de la basura, lavatorios, sumideros (hacia las cloacas), entradas y vestíbulos, oficinas, vestuarios, salas de máquinas, salas de calderas, garajes, cuartos de limpieza y almacenes (después de embotellado o embotellado).

ÁREAS DONDE HAY ALIMENTOS: NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede usar para tratar áreas donde hay alimentos. Se puede usar en lugares donde se manipulan alimentos en establecimientos, restaurantes u otros lugares donde se preparan o sirven alimentos comercialmente. Solamente se puede usar en áreas donde se sirven alimentos cuando el establecimiento no está en funcionamiento y los alimentos no están expuestos. Las áreas donde se sirven alimentos incluyen todas aquellas áreas donde se preparan o sirven comidas, como comedores. En el hogar todas las superficies donde se procesan alimentos y los utensilios deben taparse durante el tratamiento y lavarse a fondo antes de usar. Las áreas donde hay alimentos incluyen lugares donde se recibe, almacena, envasa (enlata, embotella, empaca) o prepara comida o se guardan restos comestibles y también los sistemas de procesamiento cerrados (molinos, lecherías, aceites comestibles, jarabes). Repita la aplicación en 6 meses, o con más frecuencia si es necesario.

PREPARACIÓN DEL ROCÍO PARA APLICACIONES SUPERFICIALES, LOCALIZADAS, Y EN GRIETAS Y HENDIDURAS:

Prepare un rocío diluido mezclando 11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua. Llene parcialmente con agua el recipiente para la mezcla, agregue NYGUARD™ IGR CONCENTRATE, agite y llene hasta lograr el volumen final. Agite antes de rociar cada vez. No permita que la mezcla para rociar quede sin usar hasta el día siguiente.

Plagas de los Productos Almacenados	Tratamiento	Preparación de la Solución para Rociar	Cobertura por Unidad de Superficie	Intervalos entre cada aplicación
Áreas con y sin alimentos	Aplicación Superficial General (inclusive al voleo, localizada, y en grietas y hendiduras)	11 ml* de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua	11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,500 pies cuadrados	Un solo tratamiento actúa por 6 meses
Áreas con y sin alimentos	Niebla / ULV	11 ml diluidos en el diluyente adecuado	11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE diluido en un diluyente adecuado por cada 12,000 pies cúbicos	

*ml = mililitros

APLICACIÓN SUPERFICIAL GENERAL: Aplique el rocío diluido a razón de un galón cada 1,500 pies cuadrados. Para el tratamiento de establecimientos de procesamiento y manipulación de alimentos, aplique con un rociador de gotas mojadas y gruesas. Rocíe las superficies, grietas y hendiduras en paredes y pisos, debajo y entre plataformas de carga, superficies en la base de maquinaria y equipo, debajo de muebles, en cuartos de limpieza y equipo, detrás de alacenas, debajo de anaqueles y rejillas, alrededor de caños y aberturas en pisos y paredes, junto a zócalos, en huecos en las paredes donde puedan refugiarse los insectos. Rocíe la mayor cantidad de insectos posible. Repita la aplicación en 6 meses, o con más frecuencia si es necesario.

APLICACIONES LOCALIZADAS Y EN GRIETAS Y HENDIDURAS: Aplique solución diluida de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE con un sistema de rocío presurizado que emita un rocío puntual o variable. Las aplicaciones en grietas y hendiduras pueden ser hechos directamente a áreas tales como, pero no limitados a hendiduras, zócalos, pisos, cielorrasos, paredes, juntas de expansión, molduras, alrededor de caños de agua y de cloacas, huecos donde puedan ocultarse los insectos y otras áreas similares. También se pueden efectuar tratamientos localizados en áreas incluyendo, pero no limitado a áreas de almacenamiento, armarios, alrededor de caños de agua, puertas y ventanas, detrás y debajo de refrigeradores, alacenas, fregaderos, estufas y demás equipo, anaqueles, gavetas y áreas similares.

APLICACIONES EN FORMA DE NEBLINA: NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede aplicar en forma de neblina o en una aplicación de volumen ultra bajo ("ULV", por sus siglas en inglés) con equipos tales como equipos para ULV, atomizadores mecánicos, generadores en aerosol o nebulizadores térmicos. Para preparar la solución para aplicar en forma de neblina, siga las instrucciones para preparar la solución que da el fabricante del equipo. Para las aplicaciones en forma de neblina, NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede diluir con agua o destilado de petróleo. Aplique a razón de 11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 12,000 pies cúbicos. Las aplicaciones en forma de neblina se recomiendan para establecimientos de gran tamaño, como almacenes. Cierre el área a tratarse y todos los sistemas de ventilación.

ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 173300603X0012
2012/2017

PATRICK DEL CARMEN CONDE MOO
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES
COFEPRIS / SECRETARIA DE SALUD

Aplique el producto en el aire y dirija la niebla o el rocío hacia aquellas áreas que puedan albergar las plagas que se busca eliminar. Después del tratamiento, deje la habitación cerrada por 30 minutos o más según lo recomiende el fabricante del equipo o las etiquetas de otros productos agregados a la mezcla de tanque. No permanezca en el área tratada. Ventile antes de volver a entrar.

PARA EL CONTROL DE LOS ESCARABAJOS DEL ESTIÉRCOL (*Alphitobius diaperinus*) [como Escarabajo Negro (*Tenebrionidae*), Gorgojo de los Cueros (*Silphidae*): NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede aplicar a las camas de aves, como por ejemplo en plantas avícolas infestadas con escarabajos del estiércol, para interrumpir el ciclo vital de estas plagas. Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, NYGUARD™ IGR CONCENTRATE no daña a los insectos beneficiosos de las camas de los animales, como las avispas depredadoras. Efectúe una aplicación uniforme de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE a la cama a razón de 4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,000 pies cuadrados de volumen de agua suficiente para lograr una cobertura completa. Para una prevención efectiva de las larvas en las camas retire a los animales y las camas del área que se tratará. El tratamiento de las superficies inmediatamente después de haber retirado a los animales y justo antes de volver a colocarlos resulta más eficaz. Preste atención a aquellas áreas donde suele haber escarabajos, como paredes, soportes, jaulas, cubículos y alrededor de los comederos. No contamine los alimentos ni el agua.

Control del Escarabajo del Estiércol	Tratamiento	Preparación de la Solución para Rociar	Cobertura por Unidad de Superficie	Intervalos entre cada aplicación
En Galpones Avícolas	Aplicación Superficial General (Inclusive al Voleo, Localizada, y en Grietas y Hendiduras)	4 ml* de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en un volumen de agua suficiente para lograr una cobertura completa	4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,000 pies cuadrados	No aplicar en recintos donde haya animales presentes.

*ml = mililitros

Aplique NYGUARD™ IGR CONCENTRATE uniformemente a razón de 4 ml por cada 1,000 pies cuadrados en la superficie del piso y las paredes, postes y amazonas de las jaulas (en el caso de aves criadas en jaulas solamente). También se debe aplicar en las grietas y hendiduras y alrededor del aislamiento. Aplique nuevamente después de cada ciclo de engorde o procedimiento de limpieza. Se puede mejorar el control dentro del galpón efectuando aplicaciones alrededor de los cimientos por la parte externa del edificio para impedir que entren escarabajos adultos. Aplique NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en una banda uniforme de como mínimo 1 pie hacia arriba y 1-4 pies hacia afuera de los cimientos. El mantenimiento de un programa de tratamiento durante todo el año evitará que las poblaciones de fondo alcancen niveles problemáticos.

PARA EL CONTROL DE LAS HORMIGAS (*Formicidae*):

Aplique NYGUARD™ IGR CONCENTRATE a razón de 11 ml diluido en agua por cada 1,500 pies cuadrados en áreas interiores donde merodeen activamente las hormigas y en una banda de 6-10 pies de ancho adyacente a la base de la pared exterior del edificio.

- Si es necesario, se pueden repetir los tratamientos con NYGUARD™ IGR CONCENTRATE 14 días después del tratamiento previo o, si llueve copiosamente, según sea necesario.

Control de Hormigas	Tratamiento	Preparación de la Solución para Rociar	Cobertura por Unidad de Superficie	Intervalos entre cada aplicación
Aplicaciones en Interiores y al Aire Libre	Aplicación Superficial General (Inclusive al Voleo, Localizada, y en Grietas y Hendiduras)	11 ml* de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en un volumen de agua suficiente para mojar completamente la superficie a tratar	11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,500 pies cuadrados	Si es necesario, se pueden repetir los tratamientos 14 días después del tratamiento previo.

*ml = mililitros

PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS VOLADORES (como Moscas, Polillas, Jeneas, Mosquitos y Cínifes):

TRATAMIENTOS EN SUPERFICIES GENERALES: Para el control de Moscas Domésticas, Moscas del Establo, Polillas, Mosquitos, Moscas Molestas (Cínifes, Jeneas) y otros insectos plaga voladores como aquellos clasificados como Dípteros o Himenópteros. NYGUARD™ IGR CONCENTRATE es similar a las hormonas de crecimiento de los insectos que se producen naturalmente en las moscas y otros insectos voladores, y actúa sobre los estadios adulto y juvenil. En las moscas domésticas, NYGUARD™ IGR CONCENTRATE provoca una disminución en el número y la maduración de los huevos puestos por las moscas adultas tratadas. Las larvas de las moscas (gusanos) muestran defectos fisiológicos y funcionales que las hacen incapaces de desarrollarse en adultos normales. Cuando se usa por sí solo, NYGUARD™ IGR CONCENTRATE regulador del crecimiento de los insectos produce una reducción de las poblaciones de moscas adultas después de 3-4 semanas una vez que las moscas adultas que habían madurado previamente han muerto por causas naturales.

ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 173300603X0012
REF. EXP. 20/12/2017

PATRICIA DEL CAMINO CONDE MCO
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES
COFEPRIS / SECRETARÍA DE SALUD

NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede usar para controlar las plagas de insectos voladores en aquellas áreas del interior o exterior de los edificios descritas previamente en esta etiqueta bajo el título "INSTRUCCIONES DE USO". Estas áreas incluyen, pero no son limitados a edificios residenciales, comerciales, públicos, industriales y agrícolas a los efectos de controlar las plagas de insectos generales y ocasionales. NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se puede usar para controlar moscas molestas, cínifes, jejenes y mosquitos aplicándolo en áreas húmedas de reproducción (macetas, plantas, residuos húmedos o camas) o en áreas donde hay agua estancada como canaletas, drenajes, piscinas y charcos.

- No aplique directamente a masas de agua naturales como lagunas, lagos, arroyos, ríos, pantanos, baches, etc.
- Si es necesario, se pueden repetir los tratamientos con NYGUARD™ IGR CONCENTRATE 14 días después del tratamiento previo o, si llueve copiosamente, según sea necesario.

Control de Insectos Voladores	Tratamiento	Preparación de la Solución para Rociar	Cobertura por Unidad de Superficie	Intervalos cada aplicación
Interiores y exteriores	Aplicación Superficial General (inclusive al voleo, localizada, y en grietas y hendiduras)	4 ml* de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en un volumen de agua suficiente para mojar completamente la superficie a tratar	4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por cada 1,500 pies cuadrados	• Si es necesario, se pueden repetir los tratamientos 14 días después del tratamiento previo.
	Nebulizador / tratamiento ULV	11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE diluido en un diluyente	11 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE diluido en un envase adecuado por cada 12,000 pies cúbicos	

*ml = mililitros

TRATAMIENTOS DENTRO, ALREDEDOR Y FUERA DE GALPONES PARA GANADO Y AVES Y CRIADEROS DE GATOS Y PERROS: Los operadores de control de plagas y los criadores pueden usar NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en galpones para animales vivos (inclusive avícolas) y perreros de gatos y perros para controlar las plagas de insectos voladores. Se puede usar como aplicación a superficies generales, en forma de neblina/ULV o en grietas y hendiduras donde se congregan y multiplican las plagas voladoras.

Para las aplicaciones en superficies, moje completamente los pisos, paredes, cielorrasos, puertas, alrededor de ventanas y cubos de basura y áreas de desperdicios. Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, NYGUARD™ IGR CONCENTRATE no daña a los insectos beneficiosos en las camas de los animales, como las avispas predadoras. Se puede mejorar el control cuando se limpian las instalaciones y se complementan las aplicaciones en interiores con un tratamiento en el perímetro exterior.

- Se deben tratar las jaulas de aves o los corrales sólo después de haber sacado los animales.
- No efectúe aplicaciones en interiores con NYGUARD™ IGR CONCENTRATE en áreas del establecimiento en donde haya animales presentes.
- Deje que las áreas tratadas se sequen antes de regresar los animales a las áreas tratadas del establecimiento
- No contamine ni aplique a alimentos o comida, agua o equipo para el agua.

TRATAMIENTOS EN ÁREAS Y SUPERFICIES INTERIORES: Use 4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua y aplique a 1,500 pies cuadrados de superficie, o en un volumen suficiente como para lograr una cobertura adecuada. Trate todas aquellas áreas en las cuales se juntan, posen o multipliquen los insectos voladores, como paredes verticales, cielorrasos, caños, conductos, cuadras, puntales, pisos y corredores. Cuando NYGUARD™ IGR CONCENTRATE se usa por sí solo, los tratamientos se pueden extender a las camas de los animales, el estiércol y otras áreas en las que pueden reproducirse los insectos.

TRATAMIENTO DE PERÍMETROS Y SUPERFICIES: Use 4 ml de NYGUARD™ IGR CONCENTRATE por galón de agua y aplique a las superficies exteriores de edificios, porches, patios, garajes y otras áreas donde se hayan observado o encontrado estas plagas. Para un control perimetral, efectuar una aplicación superficial general de 4 ml de producto diluido en agua de modo de cubrir 1,500 pies cuadrados, o en un volumen suficiente para lograr una cobertura adecuada. Para ayudar a prevenir las reinfestaciones de edificios por insectos voladores, trate el suelo, la vegetación y demás sustratos en una banda de 6-10 pies de ancho adyacente a los cimientos del edificio, las paredes y alrededor de puertas y ventanas, y en áreas elevadas donde estas plagas están activas y puedan entrar y refugiarse.

ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 173300603X0012
2017/12/17

PATRICK DEL CARMEN CONDE MOO
SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES
COFEPRIS / SECRETARÍA DE SALUD



PRECAUCIÓN