

Sangha® Gel es la solución más práctica para terminar con las cucarachas en el hogar, industrias, hoteles, etc.
Sangha® Gel contiene un atrayente irresistible para las cucarachas, éstas se alimentan del gel y mueren.
Sangha® Gel elimina la colonia al ser ingerido y llevado de boca a boca, a través del canibalismo y de la coprofagia (comiendo excremento).

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado (guantes).
No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Lávese las manos con agua y jabón después de manejar el producto.
“ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”.
“NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE”.
“EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.
CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Mantenga el producto lejos del alcance de los niños, animales domésticos, alimentos o forrajes.
Transporte y almacene en un lugar seguro, ventilado y alejado del calor o fuego directo.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”.
PRIMEROS AUXILIOS

“ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA”.
“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL, LÁVESE CON ABUNDANTE AGUA”.
En caso de **Inhalación:** traslade a la persona contaminada al aire fresco. Si no respira, suminístrele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca.
En caso de **Ingestión:** De inmediatamente uno o dos vasos con agua e induzca al vómito, tocando suavemente el fondo de la garganta con un dedo u otro objeto sin filo.
No induzca al vómito ni administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
Si ha habido contacto con la Piel: Lave con abundante agua y jabón.
Si ha habido contacto con los Ojos: Enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 10 minutos.
Obtenga atención médica en todos los casos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Avermectinas (lactona macrocíclica) producto derivado de la fermentación natural del hongo *Streptomyces avermiltis*.
SÍNTOMAS Y EFECTOS DE INTOXICACIÓN: Los primeros síntomas de intoxicación que se presentan son la dilatación de las pupilas, falta de coordinación y convulsiones.
ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico. Use tratamiento sintomático.
Tratamiento: La intoxicación seguida por la ingestión del producto, puede ser minimizada induciendo el vómito dentro de los 30 primeros minutos después de la exposición. Si la toxicidad progresa hasta causar vómito severo, debe evaluarse el grado de desequilibrio electrolítico apropiado, junto con otras medidas de soporte (mantenimiento de la presión arterial), como lo indiquen los signos, síntomas y demás mediciones clínicas. En casos severos, se debe continuar observando al paciente por varios días, hasta que la condición clínica sea estable y normal. Debido a que la Abamectina aumenta la actividad del ácido gamma aminobutírico en animales, es prudente evitar drogas que aumenten la actividad de esta sustancia (barbitúricos, benzodiazepinas, ácido valproico). En pacientes con una toxidad potencial por exposición a la Abamectina.

“EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”.

GARANTÍA

ALLISTER DE MÉXICO S.A. de C.V. garantiza que dicho producto está compuesto por los ingredientes que se especifican. No acepta responsabilidad alguna por daños a personas o daños a la propiedad ajena que pudieran resultar de su uso si no se cumple de acuerdo a las instrucciones

INTRUCCIONES DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto se utiliza en aplicaciones únicas o bien como parte de un programa de control integral. El programa debe incluir medidas sanitarias, entre ellas la protección de las reservas alimenticias, eliminación adecuada de la basura y la reparación de daños estructurales como grietas y hendiduras para evitar que las plagas encuentren sitios de refugio.
Antes de iniciar con el tratamiento de **Sangha Gel**, se recomienda realizar una buena inspección previa al tratamiento para evaluar el grado de infestación, si después de aplicar y realizar una evaluación el gel ha sido consumido en su totalidad, pero las cucarachas están todavía presentes habrá que reemplazar los cebos y si el gel está presente sin haber sido consumido, la infestación está eliminada o bien es necesario elegir nuevos sitios de cebado.
Sangha Gel es fácil de manejar. No requiere de preparación previa ni uso de aspersores. Para la aplicación es necesario retirar el tapón que cubre la boquilla de la jeringa, presione ligeramente el émbolo depositando pequeñas porciones o tiras en los lugares de refugio y fuentes de alimentación de estas.
No es necesario esperar para entrar a los lugares tratados ya que la aplicación de **Sangha Gel** se realiza en forma selectiva, sin preparación previa ni uso de aspersores evitando el desprendimiento de olores y vapores.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	
Ingrediente Activo:	% en peso
Abamectina: (Avermectina)	
Mezcla de avermectinas B1 conteniendo no menos del 80% de avermectina B1a y no más del 20% de avermectina B1b	
CONTENIDO NOMINAL.....	0.05 %
(Equivalente a 0,5 g de la./kg de formulación a 20°C)	
Ingredientes inertes:	
Diluyentes y Dispersantes.....	99.95 %
TOTAL :	100.00%

No. de registro: RSCO-DOM-INAC-174-301-092-0.050

No. de lote:

Fecha de Caducidad:
2 años a partir de su elaboración.

Formulado (por maquila) y Distribuido por:
Allister de México S.A de C.V
Circunvalación Sur No.5 C.P.45070
Col. Las fuentes, Zapopan, Jalisco
Tel. (33)31 33 98 00

PLAGAS	DOSIS g/m ²	LUGARES DE APLICACIÓN
Cucarachas: Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha germánica (<i>Blattella germanica</i>)	De 5 a 20 puntos por m ²  0.25 - 1g (tamaño de punto de aplicación) 0.5 cm de diámetro.	Almacenes, cocinas industriales, granjas, industria en general, industria alimentaria, tiendas departamentales, hogares, oficinas, hospitales, hoteles, aviones y cualquier lugar donde se encuentren las cucarachas.

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
PRECAUCIÓN

HECHO EN MÉXICO

ALLISTER®



P R E C A U C I Ó N



Sangha®gel
CUCARACHICIDA

Sangha®gel
CUCARACHICIDA

INSECTICIDA GEL
“USO DOMESTICO”
Cont. 30g
Neto

INCLUYE 9 ESTACIONES PARA COLOCAR EL GEL

“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



¡Póngale el Punto Final a las Cucarachas!
Lo Mejor para
Alacenas
Cocinas
Baños

Sangha®gel
CUCARACHICIDA



Sangha®gel
CUCARACHICIDA

Sangha®gel
CUCARACHICIDA

