

FICHE TECHNIQUE

MAGNUM GEL FOURMIS

Conditionnement: 4 cartouches de 40g.

Référence: 3033

MAGNUM GEL FOURMIS est un appât sous forme de gel, spécialement conçu pour lutter contre tous les types de fourmis qui s'alimentent de sucres et protéines telles que la fourmi argentine (*Linepithema humile*), la fourmi pharaon (*Monomorium pharaonis*), fourmi noire (*Lasius niger*), etc.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour qu'un appât pour fourmis soit efficace, il faut que les fourmis porteuses le répandent dans la colonie avant qu'il ne commence à agir sur elles. Il est donc important d'optimiser son attractivité, sa consommation et la propagation de la trophallaxie (échange de nourriture entre fourmis).

Les fourmis sont attirées par le gel et, en raison de sa viscosité particulière, elles l'ingèrent et le transportent à l'intérieur de leur nid.

MAGNUM GEL FOURMIS, grâce à sa formule spécialement conçue et à sa dose idéale de matière active, a un effet meurtrier retardé, agissant après plusieurs heures. Les ouvrières ont suffisamment de temps pour le transporter jusqu'au nid, le distribuer à d'autres ouvrières (trophallaxie) et le donner aux reines et aux larves, le propageant ainsi dans toute la colonie. Si les reines sont éliminées, la colonie n'est plus viable et meurt.



COMPOSITION:

Imidaclopride	0,01%
Bitrex®	0,008%
Excipients	q.s.p. 100%

MODE D'EMPLOI

Appliquer **MAGNUM GEL FOURMIS**, en lignes ou en gouttelettes allongées, dans les zones où les fourmis sont présentes comme à l'intérieur des nids, près des chemins fréquentés par les fourmis ou dans les trous et les crevasses. A l'extérieur (terrasses, patios ou jardins), appliquer aux endroits où les fourmis sont le plus susceptibles de se trouver : avant-toits, corniches, zones où les câbles ou les tuyaux entrent dans la structure du bâtiment.

DOSAGE:

0,2g/m² (1 goutte = 1 ligne de 3 cm de long = 0,2 gramme d'appât de gel).

Fréquence d'application : Après 7 jours, inspecter les points d'application et réappliquer l'appât s'il est consommé.

Fréquence de traitement : 3 mois après la fin de l'infestation, une nouvelle application peut être faite.

Pour plus d'informations sur le mode d'utilisation, voir l'étiquette.

STOCKAGE ET ELIMINATION

Il est recommandé de stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Le stockage du produit dans son emballage d'origine est de 3 ans dans des conditions normales. Conservez le produit dans son emballage d'origine. Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Les récipients vides doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur par des entreprises de gestion des déchets agréées.