

Magnumgel



CUCARACHAS

ES

MAGNUM GEL CUCARACHAS es un insecticida contra los organismos objetivo adultos: cucaracha alemana (*Blattella germanica*), cucaracha oriental (*Blatta orientalis*), cucaracha americana (*Periplaneta americana*).

MODO DE EMPLEO:

Instrucciones de uso: Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto y respete todas las instrucciones proporcionadas. Haga una inspección antes de aplicar el producto para ver el nivel de infestación y las áreas afectadas. Utilizar solo en interiores.

Instrucciones específicas de uso: Aplicar el producto biocida solamente en huecos y hendiduras, detrás de muebles y máquinas. El producto no se puede utilizar en superficies accesibles. No mezclar con otros productos químicos o en áreas recientemente tratadas con otro insecticida. No lo aplique sobre madera o superficies porosas. Evite el contacto con las superficies tratadas. No exponga las gotas de cebo a la luz directa del sol o a fuentes de calor [Ej: radiador].

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aplicación en forma de gotitas mediante cartucho.

DOSIS: Depende del nivel de infestación y de la especie de cucarachas (1 gota = 0,04g).

Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>)	0.12-0.16g/m ²	[3-4 gotas/m ²]
Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	0.16-0.24g/m ²	[4-6 gotas/m ²]
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	0.16-0.24g/m ²	[4-6 gotas/m ²]

Frecuencia de aplicación: 1 aplicación cada 4 semanas. Volver a aplicar una vez más si la infestación persiste.

Frecuencia de tratamiento: 3 meses después de que la infestación termine, puede volverse a aplicar el tratamiento.

Medidas de mitigación de riesgo: El producto debería usarse alternado con otros productos que no contengan la misma sustancia activa, para evitar poblaciones resistentes. Los cebos no deben colocarse en lugares donde se puedan contaminar alimentos, pienso o agua potable. El producto debe

volver a aplicarse una vez se acabe solo hasta que la infestación sea controlada. Utilice el producto a la dosis y las frecuencias recomendadas. Para optimizar el tratamiento, respetar unas buenas prácticas de higiene: eliminar o impedir el acceso a otras fuentes de alimento que estén disponibles para las cucarachas. El cebo debe ser la principal fuente de comida disponible para las cucarachas. Para optimizar la eficacia, revise los puntos de cebo una vez a la semana y reemplace o reponga el cebo si está dañado o sucio. El producto

debe aplicarse de forma segura para minimizar el riesgo de consumo por otros animales o niños. No tire el producto al suelo, en cursos de agua, el fregadero o el desagüe. Deseche el producto no utilizado, su embalaje y todos los demás residuos (insectos muertos) de acuerdo con las regulaciones locales.

Medidas de mitigación de riesgo específicas del uso: Usar guantes adecuados durante la aplicación. Evitar el contacto con los ojos y la piel. El producto no debe aplicarse en zonas accesibles a niños. Limitar el tratamiento a zonas fuera del alcance de los animales. El producto no puede aplicarse sobre superficies en las que se prepara, se sirve, consume o almacena piensos o alimentos. El producto se aplicará en la industria alimentaria en ausencia de productos alimenticios, excepto en los almacenes donde los productos almacenados se mantienen debidamente envasados. Deben adoptarse medidas adecuadas para garantizar que los alimentos, equipos o cualquier utensilio manipulado en lugares previamente tratados con el producto no contengan residuos de la sustancia activa. Usar en áreas ocultas de difícil acceso y alejadas del agua. Adoptar métodos integrados de control de plagas, como la combinación de métodos químicos y físicos de control y otras medidas de salud pública, teniendo en cuenta las especificidades locales (condiciones climáticas, especies objetivo, condiciones de uso, etc.). Compruebe la eficacia del producto en el sitio: si es necesario, se debe identificar la causa de una eficacia reducida para asegurar que no hay resistencia o para identificar una posible resistencia potencial. No utilice el producto en áreas donde se sospeche o se establezca resistencia. Informe al titular de la autorización si el tratamiento es ineficaz.

Primeros auxilios: Medidas básicas de actuación: En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente: Precauciones: evitar que el producto entre en el medio ambiente (aguas superficiales y subterráneas), alcantarillado, drenaje, etc. con la construcción de barreras protectoras y drenajes de cierre. Comuníquese a las autoridades competentes derrames, fugas en canales, drenajes, alcantarillas...

Métodos y materiales para el confinamiento y la limpieza: absorber el derrame sobre material inerte (arena, caolín...) recoger y colocar en contenedores correctamente etiquetado para su eliminación como residuos peligrosos.


El almacenamiento del producto en su envase original es de 2 años bajo condiciones normales. Mantener en el envase original. Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

ADVERTENCIA: el fabricante garantiza la formulación y el contenido. El usuario asume los riesgos para los daños que pudieran derivarse de hechos que escapen al control del fabricante, así como los prejuicios debidos a un almacenamiento o aplicación inadecuada del producto.

Magnumgel

CUCARACHAS / CAFARDS / BARATAS

CEBO EN GEL (LISTO PARA SU USO)
APPÂT EN GEL (PRÊT À L'EMPLOI)
ISCO GEL (PRONTO A USAR)



MYLVA S.A.

Via Augusta, 48 - 08006 Barcelona

Tel. +34 93 415 32 26

mylva@mylva.eu - www.mylva.eu

Usar por personal profesional especializado - **Nº DE REGISTRO:** ES/AP01NA-2017-18-00449 - Se recomienda conservar el producto a una temperatura entre 5°C y 45°C. - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Contiene 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona y 2-octil-1,2-tiazol-3-ona. Puede producir una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoja el vertido. Elimínelo el contenido y/o su recipiente a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Utilisation par personnel qualifié - **Nº D'ENREGISTREMENT:** FR-2017-0090 - Il est recommandé de conserver le produit à une température comprise entre 5°C et 45°C. - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona y 2-octil-1,2-tiazol-3-ona. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu dans contenant conformément à la réglementation locale.

Usar por pessoal profissional especializado - **Nº DA AUTORIZAÇÃO:** PT/DGS ARMPB-32/2017 - É aconselhável guardar o produto a uma temperatura entre os 5°C e os 45°C. - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Contém 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona y 2-octil-1,2-tiazol-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica. Manter fora do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Recolher o produto derramado. Eliminar o conteúdo em acordo as normas locais.

COMPOSICIÓN
COMPOSITION
COMPOZIÇÃO:
Imidacloprid
Imidaclopride [s.a.]
(Nº CAS 136261-41-3) 2,15%
Bitrex® 0,008%
Excipientes
Excipients [c.s.p/ q.s.p] 100%
CONTENIDO
CONTENU
CONTEÚDO:
4 x 40 gr e



ATENCIÓN
ATTENTION
ATENÇÃO



MANUFACTURED EU

Magnumgel



C A F A R D S

FR

MAGNUM GEL CAFARDS est efficace contre les insectes suivants adultes: Blatte germanique (*Blattella germanica*), Blatte orientale (*Blattella orientalis*), Blatte américaine (*Periplaneta americana*).

MODE D'EMPLOI:

Consignes d'utilisation: Toujours lire l'étiquette ou la notice avant l'utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées. Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement. Déposer le produit à l'abri des rayons du soleil ou d'une source de chaleur (ex. ne pas le placer sous un radiateur). Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et autres mesures d'hygiène publique, en tenant compte des spécificités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d'usage, etc.). Alternier les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents.

Consignes d'utilisation spécifiques: Appliquer le produit biocide de manière ciblée uniquement dans les fissures et crevasses derrière les meubles ou appareils ménagers. Le produit ne doit pas être utilisé sur des surfaces accessibles. Ne pas appliquer sur le bois ou les surfaces poreuses.

METHODE D'APPLICATION: Application ouverte d'un appât en gel sous forme de gouttes avec une cartouche.

DOSE: Dépend du niveau d'invasion et des espèces de blattes (1 goutte = 0,04 g)

Blatte germanique (*Blattella germanica*)
0,12-0,16g/m² [3-4 gouttes/m²]

Blatte orientale (*Blattella orientalis*)
0,16-0,24g/m² [4-6 gouttes/m²]

Blatte américaine (*Periplaneta americana*)
0,16-0,24g/m² [4-6 gouttes/m²]

Fréquence d'application: 1 application sur 4 semaines. Ne réappliquer le produit qu'une seule fois si l'infestation persiste.

Mesures de gestion des risques: Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou ne pas appliquer dans les zones déjà traitées avec un autre insecticide.

Mesures de gestion des risques spécifiques: Eviter le contact avec les surfaces traitées. Porter des gants pendant l'application. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Le produit ne doit pas être appliqué dans des zones accessibles aux enfants. Ne pas appliquer le produit sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux ou avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente. Appliquer dans des zones difficilement accessibles, non susceptibles d'être lavées et totalement à l'abri de l'eau.

Premiers secours: En cas de contact avec la peau: laver la partie contaminée avec de l'eau et du savon. En cas d'apparition de signes d'irritation, contacter le centre antipoison. En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles: rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin. En cas de contact avec la bouche: rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112. Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (comme les insectes morts), dans un circuit de collecte approprié. Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (égout, toilettes...) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.

La stabilité de stockage de ce produit dans son récipient d'origine est de 2 ans dans des conditions normales de stockage. Stocker dans l'emballage commercial. Garder l'emballage fermé dans un endroit sec, frais et ventilé. Protéger du gel.

ATTENTION: Le fabricant garantit la formule et le contenu. L'utilisateur assume les risques de dommages qui pourraient provenir de faits échappant au contrôle du fabricant, ainsi que les préjudices causés par un stockage ou une application non adéquate du produit.

Magnumgel



ROACHES (BARATAS)

PT

MAGNUM GEL ROACHES es un insecticida contra os seguintes insetos visados (adultos): Barata alemã (*Blattella germanica*), Barata oriental (*Blattella orientalis*), Barata americana (*Periplaneta americana*).

Instruções de utilização: Ler sempre a etiqueta ou a brochura antes da utilização e respeitar as respetivas instruções. Inspeção o local antes da aplicação do produto, para verificar o nível de infestação e as áreas afetadas. Utilizar apenas no interior.

Instruções específicas de utilização: Aplicar o produto Biocida exclusivamente em fendas e fissuras, atrás dos móveis e das máquinas. O produto não pode ser utilizado em superfícies acessíveis. Não misturar com outros produtos químicos, nem utilizar em áreas recentemente tratadas com outros inseticidas. Não utilizar sobre madeira ou superfícies porosas. Evitar o contacto com superfícies tratadas. Evitar o contacto com superfícies tratadas. Não expor as gotas de isco à luz solar ou a fontes de calor [p.ex., aquecedor].

MÉTODO DE APLICAÇÃO: Aplicação aberta de isco gel com um cartucho.

DOSE: Depende do nível de infestações e da espécie de barata. (1 gota = 0,04g).

Barata alemã (*Blattella germanica*)
0,12-0,16g/m² [3-4 gotas/m²]

Barata oriental (*Blattella orientalis*)
0,16-0,24g/m² [4-6 gotas/m²]

Barata americana (*Periplaneta americana*)
0,16-0,24g/m² [4-6 gotas/m²]

Frequência de aplicação: 1 aplicação em 4 semanas. Voltar a aplicar, caso a infestação persista. Frequência de tratamento: o tratamento pode ser repetido três meses depois de terminada a infestação.

Medidas de mitigação do risco: Este produto deve ser alternado com outros produtos de diferente modo de ação, para evitar o desenvolvimento de populações resistentes. O isco não deve ser colocado em locais onde os alimentos, rações ou água potável possam ser contaminados. O produto deve ser reaplicado quando terminado, apenas até a praga estar controlada. Utilizar o produto nas doses e intervalos recomendados. Para otimizar a eficácia do tratamento, devem ser respeitadas as boas práticas higiénicas: remover ou impedir o acesso a todos os alimentos. O isco deve ser o único alimento disponível para as baratas. Para otimizar a eficácia, inspecione o isco uma vez por semana e substitua/reabasteça o isco, se este estiver danificado ou estragado. O produto deve ser aplicado de modo a minimizar o risco de consumo por outros animais ou crianças. Não descartar o produto atirando-o para o chão, lançando-o sobre os cursos de água, despejando-o no lava-loiça ou pelo esgoto abaixo.

Utilizar apenas em locais escondidos, de difícil acesso e afastados da água. No fim da campanha de tratamento, recolher as caixas de isco para descarte. Descartar o produto não utilizado, a respetiva embalagem e todos o restante lixo (p.ex., insetos mortos), de acordo com os regulamentos locais.

Medidas de mitigação do risco específicas: Evitar o contacto com os olhos e a pele. O produto não deve ser aplicado em zonas acessíveis a crianças. O tratamento deve ser limitado a áreas fora do alcance dos animais. Não aplicar em superfícies ou utensílios que possam estar em contacto com alimentos/rações. Utilizar exclusivamente em áreas escondidas, de difícil acesso, e afastadas da água. O produto não pode ser aplicado sobre superfícies onde são preparados, servidos, consumidos ou armazenados alimentos ou rações. O produto será aplicado na indústria alimentar, na ausência de alimentos, exceto em armazéns onde estes produtos se encontram adequadamente embalados. Devem ser tomadas medidas adequadas para garantir que os alimentos, o equipamento ou qualquer utensílio manuseado em locais previamente tratados com o produto não contenham resíduos da substância ativa. Adotar métodos integrados de gestão de pragas, tais como a combinação de produtos químicos, métodos de controlo físico e outras medidas de saúde pública, tendo em conta as especificidades locais (condições climáticas, espécies visadas, condições de utilização, etc.). Verificar a eficácia do produto no local: se necessário, a causa da reduzida eficácia deve ser investigada, para garantir que não há resistência, ou para identificar potenciais resistências. Não utilizar o produto em áreas onde se verifique ou suspeite de resistência. Informar o titular da autorização se o tratamento for ineficaz.

Instruções de primeiros socorros: Procedimentos básicos de primeiros socorros. No caso de contacto com os olhos, lavar com muita água durante pelo menos 15 minutos. NÃO esquecer de tirar as lentes de contacto. No caso de contacto com a pele, lavar com sabão e muita água, sem esfregar. Se necessário, transportar o paciente para um hospital e, se possível mostrar a etiqueta ou a embalagem. Não abandonar a pessoa envenenada. Aconselhamento para médicos e pessoal de saúde: Tratamento sintomático e de suporte. NO CASO DE NECESSIDADE DE ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA À MÃO A EMBALAGEM OU A ETIQUETA E CONTACTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: +351 808 250 143.

Medidas de emergência para proteger o ambiente: Precauções: Impedir a penetração do produto no meio ambiente (águas superficiais e profundas), esgoto, tubagens, etc. Construindo barreiras de proteção e bloqueando a drenagem. Comunicar às autoridades competentes os escoamentos para cursos de água, tubagens, esgotos... Métodos e materiais para contenção e limpeza: absorver derrames sobre inertes (areia, calauino...), recolher e colocar em contentores para identificação posterior como gestão de resíduos perigosos. A estabilidade de armazenamento deste produto na embalagem original é de 2 anos, em condições normais de armazenamento. Guardar na embalagem original. Manter as embalagens bem fechadas num local seco, fresco e bem ventilado.

ADVERTÊNCIA: O fabricante garante a formulação e o conteúdo. O usuário assume os riscos pelos danos que possam causar danos que escaparam ao controlo do fabricante, assim como os prejuízos devidos ao armazenamento ou aplicação inadequada do produto.