

Peroxide Multi Surface Disinfectant And Cleaner

MESURES DE PRÉCAUTION DANGER:

Corrosif. Entraîne des lésions oculaires irréversibles et des brûlures cutanées. L'ingestion et l'absorption cutanée de ce produit sont nocives. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter une protection oculaire telle que des lunettes de sécurité et des gants résistants aux substances chimiques pour manipuler ce produit sous forme concentrée. Se laver les mains à fond après la manutention et avant de manger, de boire, de manipuler de la gomme à mâcher, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau. Le contact cutané prolongé ou répété fréquemment peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.

PREMIERS SOINS

Apportez l'étiquette du contenant ou le nom du produit, ainsi que le numéro d'identification du médicament (DIN) lorsque vous consultez un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Tenir l'œil ouvert et rincer lentement et doucement à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les verres de contact s'il y a lieu au bout des 5 premières minutes, puis continuer à rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour prendre conseil sur le traitement à suivre.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de grandes quantités d'eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour prendre conseil sur le traitement à suivre.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour prendre conseil sur le traitement à suivre. Faire boire à la victime de petites gorgées d'eau si elle peut avaler. Ne pas provoquer le vomissement à moins d'en avoir reçu la consigne par le centre antipoison ou le médecin. Ne jamais donner quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente.

EN CAS D'INHALATION: Conduire la victime à l'air frais. Si elle ne respire pas, appeler le 911 (numéro d'urgence) ou une ambulance; puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence la bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour prendre conseil sur le traitement à suivre.

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX D'URGENCE: 1 866 897-8061 (à l'extérieur des États-Unis et du Canada) COMPOSER LE 1 952 852-4656 (aux É.-U.)

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Éviter de contaminer l'eau ainsi que les aliments et la nourriture pour les animaux durant l'entreposage ou l'élimination.

Entreposage: Conserver ce produit dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct et de la chaleur.

Élimination: Éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales. Pour obtenir des renseignements sur l'élimination de produit non utilisé et non désiré ainsi que sur le nettoyage après un déversement, contacter l'organisme de réglementation provincial ou le fabricant.

Manutention et élimination du contenant: ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Contenant de moins de 18,9 litres (5 gallons). Rincer 3 fois le contenant (ou le récipient) immédiatement après usage. Effectuer un triple rinçage comme suit: remplir le contenant au quart avec de l'eau et remettre le couvercle en place. Agiter durant 10 secondes. Vider le contenant et le laisser égoutter durant 10 secondes. Répéter encore deux fois.

Contenant non rempissable: Ne pas réutiliser ce contenant pour conserver des substances autres que de l'eau de rinçage du produit dilué. Envoyer ensuite le contenant au recyclage ou à la récupération, si possible, ou le perforer et l'éliminer dans un site d'enfouissement sanitaire ou selon d'autres méthodes approuvées par les autorités provinciales et municipales.

Désinfectant à large spectre – Nettoyant pour surfaces multiples – Dégraissant – Désodorisant – Déloge les taches tenaces tout en laissant un lustre impeccable

- Ce nettoyant à usages multiples désinfecte et désodorise en tuant les germes les plus courants et en inhibant leur odeur.
- Antibactérien, germicide et fongicide
- Sans parfum
- Nettoie le verre, les fenêtres, les miroirs, les robinets, les comptoirs, l'acier inoxydable et les surfaces brillantes pour leur donner un lustre impeccable sans laisser de résidu ni de pellicule qui ternissent le résultat.
- Nettoie les gros dégâts, enlève les taches d'aliments, déloge la saleté et les taches dans les salles de bain, et vient à bout des résidus de savon et de la graisse.
- Un puissant nettoyant combiné à la puissance du peroxyde.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS DANGER

MODE D'EMPLOI:

Ce produit ne doit pas être utilisé comme produit de stérilisation finale ou de désinfectant de haut niveau sur toute surface ou tout instrument (1) qui est introduit directement dans le corps humain, soit dans la circulation sanguine ou en contact avec celle-ci, ou dans des zones normalement stériles du corps, ou (2) qui entre en contact avec des membranes muqueuses intactes sans toutefois traverser le système sanguin ni pénétrer des parties du corps normalement stériles. Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage ou la décontamination d'instruments critiques ou semi-critiques préalablement à la stérilisation ou à la désinfection de haut niveau. Ce produit est un nettoyant désinfectant multisurface pour les hôpitaux ainsi qu'un neutralisant d'odeurs conçu pour le nettoyage général quotidien et la désinfection de surfaces dures non poreuses exposées à l'air libre. Ce produit est recommandé pour le nettoyage et la désinfection de surfaces dures non poreuses exposées à l'air libre qui sont lavables, notamment:

- Comptoirs sans contact avec les aliments, évier, surfaces externes des réfrigérateurs, de glacières, de congélateurs, dessus de cuisinière, électroménagers et matériel sans contact avec les aliments, tablettes, supports et chariots.
- Claviers de téléphones et d'ordinateurs
- Tables, chaises, bureaux, cadres de lit, murs, armoires, poignées de porte et poubelles
- Chaises hautes
- Cabines de douche, baignoires, carreaux, portes de douche, rideaux de douche, robinetterie de douche et de salle de bain, surfaces externes de cuvettes et d'urinoirs et planchers de salle de bain
- Fenêtres et miroirs
- Éviers, baignoires et bases de douche en fibre de verre
- Planchers (carreaux ou autre)
- Vinye, surfaces peintes ou de plastique, verre, carreaux de céramique vitrifiés, linoléum, plastique (tel que polyéthylène, polypropylène, chlorure de polyvinyle), porcelaine vitrifiée, acier inoxydable et verre.

Secteurs d'utilisation: Restaurants, hôtels, motels, immeubles de bureaux, garderies, écoles et collèges, cliniques vétérinaires et laboratoires de biologie animale, bâtiments de soins animaliers et de ferme, installations industrielles, services diététiques, usines de transformation des aliments et des boissons, installations récréatives, installations médicales, hôpitaux, cuisines, maisons de repos, résidences avec services de soutien, cliniques médicales et dentaires, établissements de vente au détail et en gros, bateaux de croisière, casinos, établissements pénitentiaires, installations sportives, clubs de santé.

Utilisation comme nettoyant désinfectant ou comme nettoyant désinfectant pour salles de bain: Diluer à raison de 47 mL/L (6 oz/gal) d'eau. Nettoyer préalablement les zones très souillées. Appliquer la solution sur des surfaces non poreuses au moyen d'un pulvérisateur à gâchette à gros jet. Pulvériser à 6-8 po de la surface en s'assurant de mouiller celle-ci à fond. Les surfaces doivent rester mouillées durant 5 minutes. Essuyer les surfaces et les laisser sécher à l'air libre. Il n'est pas nécessaire de rincer les surfaces sans contact avec les aliments. Pour les surfaces et/ou les objets qui peuvent entrer en contact direct avec les aliments, un rinçage à l'eau potable est recommandé. Ne pas utiliser ce produit pour le nettoyage ou la désinfection de verres, de vaisselles ou de couverts.



MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL POUR LA PULVÉRISATION ÉLECTROSTATIQUE

Éloignez les passants et les animaux de compagnie de la zone à traiter. N'utilisez pas ce produit pour le traitement des humains ou de l'air ou pour la fumigation. La taille des particules des gouttelettes de pulvérisation doit être limitée à un diamètre volumique médian de $\geq 40 \mu\text{m}$. Utilisez des demi-masques respiratoires avec des cartouches destinées aux produits chimiques et des filtres N95. Planifiez la routine de pulvérisation afin de réduire l'exposition inutile aux zones traitées; par exemple, commencez à appliquer le produit au fond de la pièce ou de la zone et poursuivez en vous dirigeant vers l'avant de la pièce ou de la zone. Réglez la fonction de pulvérisation électrostatique en position de marche (ON) pour les modèles de pulvérisation électrostatique qui offrent la fonctionnalité de basculement Marche/Arrêt (ON/OFF). Après le traitement, prévoyez un temps de repos de 15 minutes avant de retourner dans la zone traitée. Vérifiez la compatibilité des matériaux et les risques de dommages avant de procéder à l'application. Consultez le guide d'utilisation de l'appareil pour connaître les directives de fonctionnement.

POUR UNE UTILISATION COMME NETTOYANT, DÉSINFECTANT ET VIRUCIDE [MULTISURFACE] [EN UNE ÉTAPE] PAR PULVÉRISATION ÉLECTROSTATIQUE

Pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses, diluez à 47 mL par litre d'eau (6 oz par gallon d'eau). Pour les endroits visiblement souillés, un prénettoyage est requis. Appliquez le produit à l'aide d'un pulvérisateur électrostatique sur des surfaces environnementales dures et non poreuses. Vaporisez à une distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po) des surfaces en vous assurant de bien les mouiller complètement. Toutes les surfaces doivent demeurer visiblement humides pendant le temps de contact requis indiqué dans le mode d'emploi, en renouvelant l'application si nécessaire. Essayez ou laissez sécher à l'air libre. En cas d'utilisation sur des surfaces en contact avec les aliments, rincez abondamment toutes les surfaces traitées à l'eau potable.

BACTÉRICIDE efficace en 5 minutes – dilué à raison de 47 mL/L (6 oz/gal) d'eau d'une dureté de 400 ppm – contre les bactéries pathogènes suivantes, selon le test de pulvérisation de germicide modifié en présence de 5 % de sérum organique.

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
Salmonella enterica (ATCC 10708)
Acinetobacter baumannii (ATCC 19606)
Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352)
Shigella flexneri (ATCC 9380)
Streptococcus pyogenes (ATCC 19615)
Shigella dysenteriae (ATCC 29026)
Listeria monocytogenes (ATCC 7644)
Bordetella pertussis (ATCC 12743)
Proteus mirabilis (ATCC 7002)
Enterobacter aerogenes (ATCC 13048)

Antibiotic-Resistant Bacteria:

Staphylococcus aureus (VISA) (ATCC 700788)
Staphylococcus aureus (CA-MRSA) (ATCC BAA-11683)
Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC 33592)
Klebsiella pneumoniae (Carbapenemase producer) (KPC) (ATCC BAA-1705)
Enterococcus faecalis (VRE) (ATCC 51299)

Utilisation comme virucide: Diluer à raison de 47 mL/L (6 oz/gal) d'eau. Nettoyer préalablement les zones très souillées. Appliquer la solution sur des surfaces non poreuses exposées à l'air libre au moyen d'un pulvérisateur à gâchette à gros jet. Pulvériser à 6-8 po de la surface en s'assurant de mouiller celle-ci à fond. Les surfaces doivent rester mouillées durant 5 minutes. Essuyer les surfaces et les laisser sécher à l'air libre. Pour les surfaces et/ou les objets qui peuvent entrer en contact direct avec les aliments, un rinçage à l'eau potable est recommandé.

VIRUCIDE efficace en 5 minutes – dilué à raison de 47 mL/L (6 oz/gal) d'eau d'une dureté de 400 ppm – contre les virus suivants, selon le test de qualification comme virucide modifié en présence de 5 % de sérum organique.

Adenovirus type 5 (ATCC VR-5)
Influenza A Virus H1N1
Norovirus (Feline Calicivirus ATCC VR-782)
Rhinovirus type 37 (ATCC VR-1147)
Poliovirus (chat strain)
Herpes Simplex Virus Type 2 (ATCC VR-734)
Hepatitis B Virus
Murine Norovirus (Strain MNV-1.CW1)
Respiratory Syncytial Virus (ATCC VR-26)

Vaccinia Virus (ATCC VR-119)
Human Coronavirus (SARS)(ATCC VR-740)
Rotavirus (Strain WA)
Canine Parvovirus (ATCC VR-2017)
Canine Distemper Virus (ATCC VR-128)
Newcastle Disease Virus (ATCC VR-108)
Herpes Simplex Virus Type 1 (ATCC VR-733)
SARS-Related Coronavirus 2 (BEI Resources NR-52281) (Strain Isolate USA-WA 1/2020)

VIRUCIDE en 30 secondes à 47 mL par litre (6 oz par gallon) dilué dans 400 ppm d'eau dure contre les virus suivants selon le test de qualification virucide modifié en présence de 5 % de sérum sanguin.

SARS-Related Coronavirus 2 (BEI Resources NR-52281) (Strain Isolate USA-WA 1/2020)

VIRUCIDE efficace en 1 minute – dilué à raison de 47 mL/L (6 oz/gal) d'eau d'une dureté de 400 ppm – contre les virus suivants, selon le test de qualification comme virucide modifié en présence de 5 % de sérum organique.

VIH de type 1

TUE LE VIH ET LE VHB SUR LES SURFACES/OBJETS EXPOSÉS À L'AIR LIBRE PRÉALABLEMENT NETTOYÉES APRÈS AVOIR ÉTÉ SOUILLÉE PAR DU SANG OU DES FLUIDES ORGANIQUES dans les établissements de soins de santé (hôpitaux ou maisons de repos) ou dans d'autres milieux où des souillures par du sang ou des fluides organiques sont susceptibles de se trouver sur des surfaces ou des objets inanimés, et où ces surfaces/objets susceptibles d'être souillés par du sang ou des fluides organiques pourraient transmettre le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) ou du virus de l'hépatite B (VHB).

INSTRUCTIONS SPÉCIALES DE NETTOYAGE ET DE DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH-1 ET LE VHB SUR DES SURFACES/OBJETS SOUILLÉS PAR DU SANG OU DES FLUIDES ORGANIQUES:

Protection individuelle: Durant la manipulation d'articles souillés par du sang ou des fluides organiques, porter des gants en latex, une blouse, un masque et une protection oculaire jetables.

Mode de nettoyage: Le sang et autres fluides organiques doivent être éliminés à fond des surfaces et des objets avant l'application ce produit.

Temps de contact/concentration: Dilué à raison de 47 mL/L (6 oz/gal) d'eau d'une dureté de 400 ppm, le nettoyant désinfectant multisurface avec peroxyde est efficace contre le VIH-1, en présence de 5 % de sérum organique, après un contact de 1 minute, cinq (5) minutes pour tuer le VHB.

Élimination de matières infectieuses: Le sang et autres fluides organiques doivent être passés à l'autoclave et éliminés selon la réglementation en matière d'élimination de déchets infectieux.

CLINIQUES VÉTÉRINAIRES: Retirer tous les animaux et toute la nourriture des locaux, des véhicules de transport animalier, des cages, etc. Débarrasser les planchers, les murs et les surfaces des locaux occupés par les animaux et les surfaces où ceux-ci circulent de toutes traces de litière, d'excréments et de purin. Vider toutes les gamelles de nourriture et d'eau. Saturer les surfaces de solution diluée à raison de 47 mL/L (6 oz/gal) d'eau et laisser agir 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air libre. Saturer tout le matériel de manutention et de rétention des animaux ainsi que les fourches, pelles et racloirs utilisés pour l'enlèvement de litière et de purin. Avant de les réutiliser, rincer à l'eau potable toutes les surfaces qui entrent en contact avec les aliments, y compris l'équipement utilisé pour nourrir et abreuver les animaux. Aérer les bâtiments et autres endroits confinés. Ne pas reloger les animaux dans les lieux ni employer l'équipement avant que toute la solution de traitement soit absorbée, essuyée ou sèche.

DÉSINFECTION ET DÉSODORISATION D'INSTALLATION ANIMALIÈRES (ÉTABLES, CHENILS, CAGES, CLAPIERS, ETC.): Retirer tous les animaux et toute la nourriture des lieux. Enlever la litière, les déchets et les souillures. Vider les mangeoires, les râteliers et tout le matériel servant à nourrir et à abreuver les animaux. Nettoyer à fond toutes les surfaces avec du savon ou du détergent et rincer à l'eau claire. Saturer les licous, cordes et autres types de matériel de manutention et de rétention des animaux ainsi que les fourches, pelles et racloirs utilisés pour l'enlèvement de litière et de purin. Saturer les surfaces de solution diluée à raison de 47 mL/L (6 oz/gal) d'eau et laisser agir 5 minutes. Aérer les bâtiments et autres endroits confinés. Bien frotter avec du savon ou du détergent toutes les surfaces traitées – râteliers, auges, mangeoires, distributeurs automatiques de nourriture, fontaines et abreuvoirs – et les rincer à l'eau potable avant de les réutiliser. Laisser sécher les surfaces à l'air libre avant de réintroduire les animaux dans les lieux.

Voir au verso pour l'anglais