

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Durante la manipulación de este producto siempre utilice equipo adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla con filtros, lentes de seguridad y zapatos o botas cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón, guardarlo de manera separada a la ropa de uso común. La ropa y calzado utilizados deberán destinarse a este único fin y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo al final de la jornada laboral.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”
“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
“NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”
“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”
Centro de Información Toxicológica ATOX: 800 000 2869

“PRIMEROS AUXILIOS”
Si la persona está inconsciente no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.
En caso de ingestión: Enjuague la boca con abundante agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal.
En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire. En caso de dar respiración artificial deberá ser por personal capacitado tomando las debidas precauciones: colóque a la persona sobre el suelo en un lugar fresco y ventilado, evite que la lengua no le impida respirar y utilice un trapo de por medio.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo Químico: Neonicotinóide (tiametoxam) + Piretroide (permetrina).
Antídoto: No existe antídoto específico.
Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático.
Signos y síntomas de Intoxicación. Por vía oral puede causar dolor abdominal, náuseas, vómito. Por vía dérmica e inhalada puede causar irritación.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”
“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”
“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”
“ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”
“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

GARANTÍA
Allister de México, S.A. DE C.V. garantiza la formulación correcta y el contenido neto, **Allister de México, S.A. DE C.V.** no acepta responsabilidad alguna por daños a personas o daños a la propiedad ajena que pudieran resultar de su uso si no se cumple de acuerdo a las instrucciones.

“APLICACIÓN URBANA”



Tiametoxam + Permetrina

Insecticida
Suspo-emulsión

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingrediente activo:	% en peso
Tiametoxam: (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina.....	14.83
(Equivalente a 160 g de i.a./L a 20°C)	
Permetrina: 3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.....	18.55
(Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C)	

Ingredientes inertes:
Tensoactivo, antioxidante, diluyentes..... 66.62

Total : 100.00

Registro sanitario No: RSCO-MEZC-URB-0156-0102U-X0009-425-33.88 Contenido Neto: **1 L**

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**

No. de lote: (Fecha de fabricación: AA/MM/DD)
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fecha de elaboración
Titular del registro y distribuidor:
Allister de México, S.A. de C.V.
Circunvalación Sur No. 5, Col. Las Fuentes
Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45070
Teléfono: 33 3133 0013
www.allister.com.mx

“HECHO EN MÉXICO”
“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Skipper® es un insecticida especialmente diseñado para el control de insectos rastreros y voladores, puede ser aplicado en interiores y exteriores de casas habitación, cocinas, baños, oficinas, bodegas, almacenes, perreras, departamentos, desvanes, hoteles, restaurantes, cafeterías, mercados, hospitales, laboratorios, centros de salud, transportes, cines, teatros, escuelas, supermercados, panaderías, parques industriales, industria alimentaria, industria farmacéutica y escuelas.
No tiene odor ni mancha paredes o ropa.

PLAGA	DOSIS	APLICACIÓN
<i>Triatominos Rhodnius prolixus</i> <i>Chinches de cama Cimex lectularis</i> <i>Chinches Triatoma infestans</i> <i>Pulga Pulex irritans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Ctenocephalides felis</i> <i>Mosquitos Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i> <i>Mosca doméstica Musca domestica</i> <i>Hormiga Faraón Monomorium pharaonis</i> <i>Hormiga de Fuego Solenopsis xyloni</i> <i>Avísopa Vespaula spp.</i> <i>Arañas Latrodectus spp.</i> , <i>Loxosceles spp.</i> <i>Tijerillas Forficula spp.</i> , <i>Euborella annulipes</i> <i>Termita de madera seca Incisitermes spp.</i> , <i>Cryptotermes spp.</i> <i>Escarabajo de la madera Anobium punctatum</i> <i>Hormiga carpintera Camponotus spp.</i> <i>Abeja carpintera Xylocopa spp.</i>	5 + 10 ml / L de agua	Mojar bien techos, paredes y pisos. Utilizar dosis altas en infestaciones severas.
<i>Cucaracha oriental Blatta orientalis</i> <i>Cucaracha germanica Blatella germanica</i> <i>Cucaracha americana Periplaneta americana</i> <i>Alacrán Centruroides spp.</i>	10 ml / L de agua	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga. Para el control de la cucaracha es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras
<i>Termitas subterráneas Heterotermes spp.</i> , <i>Reticulitermes spp</i> <i>Coptotermes spp</i> <i>Termitas de la madera seca Incisitermes spp.</i> , <i>Cryptotermes spp.</i> , <i>Kalotermites spp.</i>	500 ml / 99.5 L de agua + 1000 ml / 99.0 L de agua	Skipper® está recomendado para la prevención y control de termitas en pre-construcción, durante la cimentación y en post-construcción. La aplicación debe ser efectuada por controladores de plagas profesionales con el equipo adecuado.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 30 MINUTOS

“MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”
Durante la manipulación del producto siempre utilice equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla con respirador, lentes de seguridad y zapatos o botas cerrados. Abra el envase cuidadosamente, retire el sello de seguridad, mida la cantidad de producto indicada en esta etiqueta con una probeta. Mezcle el producto en el tanque del aspersor con la mitad de agua recomendada, luego agregue el resto de agua y agite hasta lograr una suspensión uniforme. Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo como se indica en el apartado PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Se recomienda hacer aplicaciones mensuales para mantenimiento, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar el producto en áreas cerradas donde se encuentren personas o animales.

INCOMPATIBILIDAD: **Skipper®** no deberá ser mezclado con otros plaguicidas.



P R E C A U C I Ó N

