

Optigard Cebo Cucarachicida / Optigard Cockroach Bait / Optigard Cebo Cucarachicida 0.1 RB /
Optigard Cockroach Bait 0.1 RB / Optigard Cebo Cucarachicida 1 RB / Optigard Cockroach Bait 1 RB

PARTE CENTRAL DE ETIQUETA
"APLICACION URBANA"

LOGOTIPO SYNGENTA
LOGOTIPO

**Optigard Cebo Cucarachicida / Optigard Cockroach Bait / Optigard Cebo Cucarachicida 0.1 RB /
Optigard Cockroach Bait 0.1 RB / Optigard Cebo Cucarachicida 1 RB / Optigard Cockroach Bait 1 RB®**

benzoato de emamectina/Avermectinas
Insecticida de uso Urbano
Cebo cucarachicida en forma de pasta

"COMPOSICION PORCENTUAL"

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Benzoato de Emamectina : Es la mezcla de benzoato de 5-O-dimetil-4"-
-dioxi-4"-(metilamino)-(4"R)-avermectina A1a y benzoato de 5-O-dimetil-25
-di(1-metilpropil)-4"-dioxi-4"-(metilamino)-25-(1-metiletil)-(4"R)-avermectina A1a
(Equivalente a 1 g de i.a./Kg)

0.10

INGREDIENTES INERTES:

Humectante, dispersante, atrayente, conservador, antiespumante,
espesante, neutralizador, portador y disolvente

TOTAL

99.90
100.00

REG.

CONTENIDO NETO:

®Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION,
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**

No. LOTE:

FECHA DE FABRICACION:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO:

Syngenta Agro, S.A. de C.V
Eje 130 # 125
Col. Zona Industrial del Potosí
78090 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 137 1600

DISTRIBUIDR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V
San Lorenzo No. 1009
Col. Del Valle, 03100
México, D.F.
Tel: (55) 9183 9100

"HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"

**"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LAS
SECRETARIA DE SALUD"**

PRECAUCION

Banda toxicológica color verde

MARCO ANTONIO ARIAS VIDACA
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUTORIZACION DE PRODUCTOS
Y ESTABLECIMIENTOS

ETIQUETA AUTORIZADA
REF EXP NO 103300603X0026
20/012/2010

LADO IZQUIERDO DE ETIQUETA
"¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (mascarilla con filtros, lentes de protección contra químicos, guantes, overol, casco y botas).

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediata y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos inmediatamente por lo menos 15 minutos con suficiente agua; enjuagar también debajo de los párpados. Retire previamente lentes de contacto. Consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón
- En caso de ingestión accidental consulte de inmediato al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de intoxicación en animales domésticos, acuda al médico veterinario y muéstrele la etiqueta.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO". Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
Lada sin costo 01 800 00 92800
01 (55) 55 98-6659 / 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DÍAS DEL AÑO

GRUPO QUIMICO: Avermectinas

SINTOMAS DE INTOXICACION:

No se conocen casos de intoxicación en humanos por ingestión.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:

Consulte al médico. No existe antídoto específico. Aplique tratamiento sintomático. Evite la administración de barbitúricos, benzodiacepinas (diazepam) y ácido valproico.

MARCO ANTONIO ARIAS VIDAGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS
Y ESTABLECIMIENTOS

ETIQUETA AUTORIZADA
REF EXP NO 103300603X0026
20/012/2010

CONTINUACION LADO IZQUIERDO DE LA ETIQUETA

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE"

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)", ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTIA: Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del período de caducidad del mismo. No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, que se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

Al aplicar

Después de aplicar

**PRECAUCION**

Banda toxicológica color verde

MARCO ANTONIO ARIAS VIDACA
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUTORIZACION DE PRODUCTOS
Y ESTABLECIMIENTOS

ETIQUETA AUTORIZADA
REF EXP NO 103300603X0026
20/012/2010

LADO DERECHO DE LA ETIQUETA

"INSTRUCCIONES DE USO" "¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!"

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER LA POBLACION Y LOS TRABAJADORES: A LOS TRABAJADORES:

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- Use ropa y equipo de protección, zapatos, overol, casco, mascarilla, lentes y guantes durante la aplicación de plaguicidas.

CARACTERISTICAS:

Optigard Cebo Cucarachicida / Optigard Cockroach Bait / Optigard Cebo Cucarachicida 0.1 RB / Optigard Cockroach Bait 0.1 RB / Optigard Cebo Cucarachicida 1 RB / Optigard Cockroach Bait 1 RB® es un cebo para el control de cucarachas en forma de pasta, a base de benzoato de emamectina, perteneciente al grupo químico de las avermectinas y es una formulación altamente atractiva para las cucarachas que actúa por ingestión directa del cebo y por el efecto cascada (transferencia) al resto de la colonia, incluyendo las ninfas que no se alimentan de forma activa, pues estas se intoxicarán a través de coprofagia y necrofagia. Las cucarachas intoxicadas por consumo directo y por efecto cascada mueren por parálisis.

Utilice **Optigard Cebo Cucarachicida / Optigard Cockroach Bait / Optigard Cebo Cucarachicida 0.1 RB / Optigard Cockroach Bait 0.1 RB / Optigard Cebo Cucarachicida 1 RB / Optigard Cockroach Bait 1 RB**® estratégicamente en grietas, hendiduras, estructuras huecas, áreas que sirven de refugio a las poblaciones de cucarachas, en interiores y exteriores de instalaciones en áreas habitacionales, en la industria alimentaria y no alimentaria, almacenes, áreas comerciales, restaurantes, plantas procesadoras de alimentos, incluyendo rastros y plantas relacionadas con el procesamiento de cárnicos, vegetales, fábricas de conservas. Utilícese también en supermercados, hospitales, asilos para ancianos, moteles, hoteles, escuelas, laboratorios, centros de cómputo. En transportes: aviones, autobuses, barcos, buques, trenes. En alojamiento de animales: laboratorios de investigación, hípicas, caballerizas, zahurdas, ordeñas, criaderos y tiendas de animales y los zoológicos. Áreas generales y oficinas, basureros, baños, entradas y vestíbulos, vestidores, salas de máquinas, área de calderas, estacionamientos.

RECOMENDACIONES

Recomendación general para insecticidas: evite el contacto directo con los alimentos y las superficies en contacto directo con éstos.

Utilice **Optigard Cebo Cucarachicida / Optigard Cockroach Bait / Optigard Cebo Cucarachicida 0.1 RB / Optigard Cockroach Bait 0.1 RB / Optigard Cebo Cucarachicida 1 RB / Optigard Cockroach Bait 1 RB**® para controlar las siguientes especies de cucarachas: *Periplaneta americana*, *Blattella germanica*, *Blattella asahinai*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta australasiae*, *Supella longipalpa*, *Periplaneta fuliginosa* y *Periplaneta brunnea*.

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Cucaracha alemana	<i>Blattella germánica</i>
Cucaracha asiática	<i>Blattella asahinai</i>
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>
Cucaracha australiana	<i>Periplaneta australasiae</i>
Cucaracha marrón	<i>Periplaneta fuliginosa</i>
Cucaracha parda	<i>Periplaneta brunnea</i>
Cucaracha de banda café	<i>Supella longipalpa</i>

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Dosis de Aplicación.

Optigard Cebo Cucarachicida / Optigard Cockroach Bait / Optigard Cebo Cucarachicida 0.1 RB / Optigard Cockroach Bait 0.1 RB / Optigard Cebo Cucarachicida 1 RB / Optigard Cockroach Bait 1 RB® puede aplicarse en grietas, hendiduras, en interiores y exteriores. Las dosis de aplicación dependen del nivel de infestación y de la especie de cucaracha que se desea controlar. **Optigard Cebo Cucarachicida / Optigard Cockroach Bait / Optigard Cebo Cucarachicida 0.1 RB / Optigard Cockroach Bait 0.1 RB / Optigard Cebo Cucarachicida 1 RB / Optigard Cockroach Bait 1 RB**® debe ser aplicado en lugares frecuentados por cucarachas para una infestación baja de cucarachas se recomienda usar de uno a dos puntos de cebado por m². Para infestaciones altas de cucarachas o cucarachas grandes se recomienda usar de 2 a 4 puntos de cebado por m². Cada punto de cebado debe tener de 0.25 a 0.50 gramos de producto, equivalente a gotas de 3 ó 6 mm de diámetro, respectivamente. También puede aplicar el cebo en tiras de 3 mm de grosor y hasta 5.0 cm. de largo. Los puntos de cebado deben de ser colocados en los refugios o áreas de agregación en esquinas, o en áreas en donde las cucarachas buscan alimento. Un número mayor número de puntos de cebado pequeños promoverán un control mucho más rápido que un número menor de lugares con puntos de cebado más grandes, especialmente para cucaracha alemana.

Uso en interiores.

Puede aplicarse en grietas, hendiduras, agujeros, hoyos, alrededor de tuberías, en contenedores de basura, en superficies ocultas, y áreas de almacenamiento, sótanos, áticos, detrás y debajo de los cajones, gabinetes y estantes detrás y debajo de aparatos de cocina como refrigeradores, microondas y estufas. También puede aplicarse en puntos o espacios entre diferentes elementos de la construcción: espacios entre los equipos y el piso, cajas de circuitos, contactos, huecos en paredes, patas y bases de equipos, paredes de tabla roca, bloques huecos y otros similares en donde se ocultan estas plagas. Realice inspecciones de monitoreo, y reponga la cantidad de cebo necesario.

Este producto puede ser usado en forma conjunta con un insecticida no repelente o con un regulador del crecimiento permita que la aspersión seque antes de aplicar el cebo. Evite la aplicación del cebo en áreas que han sido asperjadas con un insecticida repelente y evite aplicar insecticida sobre cebos ya que esto puede reducir la aceptación al cebo.

Uso en Exteriores

Aplique pequeños puntos de cebado en áreas adyacentes a estructuras donde las cucarachas anidan o se reproducen, dentro de grietas y hendiduras, alrededor de las ventanas, puertas, cocheras, mallas, bardas y puntos de intersección, patios, basureros, escaleras, y otras áreas donde las cucarachas se alojan y se alimentan.

Uso en establecimientos en donde manejan, procesan y sirven alimentos.

Puede usarse para lugares donde se reciben, almacenan, empaquen (enlatan, embotellan, envuelven o meten en cajas) y preparan alimentos, en lugares donde se almacenan desechos alimenticios y en sistemas cerrados de procesamiento de alimentos (molinos, lecherías y aceiteras) y en la industria alimentaria. También puede usarse en áreas donde se sirven alimentos.

Aplique los puntos de cebado de manera estratégica en grietas y hendiduras con la jeringa dosificadora o utilizando pistola para cebos. Coloque la punta del aplicador dentro de la grieta y hendidura, agujeros y otras pequeñas aberturas donde las cucarachas pueden ser un problema y aplique pequeñas cantidades de cebo y también aplique entre los diferentes espacios de construcción, los equipos y el piso, espacios huecos en piso, paredes, techo, patas y bases de equipo alrededor de tubería de la plomería, puertas y ventanas. Atrás y por debajo refrigeradores, hornos microondas, gabinetes, closet, estufas, y otros equipos donde las cucarachas se esconden. Durante las visitas de seguimiento, inspecciones los cebos existentes y re aplique cuando sea necesario.

En caso de contaminación accidental de superficies en contacto con alimentos, retire el cebo y lave la superficie contaminada con un compuesto de limpieza autorizado para el área, luego enjuague con agua potable.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: en base a la inspección e índice de infestación, reponga los puntos de cebado. El monitoreo puede establecerse tan frecuente como sea necesario.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: inmediatamente debido a la técnica de aplicación: es un cebo que se coloca de manera focalizada en grietas y hendiduras.

CONTRAINDICACIONES: no mezcle el producto con sustancias de reacción alcalina, pueden degradarlo. No se asperjen los puntos de cebado con insecticidas repelentes pues disminuyen el consumo del cebo por cucarachas.

PRECAUCION

Banda toxicológica color verde

MARCO ANTONIO ARIAS VIDACA
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUTORIZACION DE PRODUCTOS
Y ESTABLECIMIENTOS

SECRETARÍA DE SALUD
COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN
CONSUMIDORES
SECRETARÍA DE AUTORIZACIÓN DE
ETIQUETA AUTORIZADA
REF EXP NO 103300603X0025
20/012/2010