

manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno), No coma, beba o fume, durante la preparación y aplicación del producto. No aplique cerca el viento. Después de un día de trabajo: Descontamine el equipo de protección, y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, bñese cuidadosamente y pongase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PROCUTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALMETICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTENGASE FUERA AL ALCANCE DE LOS NINOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.
- “LAVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASA HABITACION”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BAINASE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

EN CASO TE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Sacar al accidentado del lugar donde se intoxicó y colocarlo en un lugar fresco y ventilado. Quitar de inmediato la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo afectadas (sin embargo, debe mantenerse al paciente bien cobijado). Por ningún motivo dar al paciente aceite de ricino, huevos, mantequilla o bebidas alcohólicas ya que estos aumentan la absorción del producto. Si es necesario, aplicar respiración artificial.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Este producto pertenece al grupo de los **organofosforados**.

Signos y síntomas de intoxicación: **Leves:** Dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, mareo, náuseas, vómitos, calambres, opresión torácica.

En estado grave: Contracción de la pupila, salivación, sudoración, lagrimeo descarga acuosa nasal, debilidad severa, pérdida de conciencia, convulsiones, edema pulmonar, pérdida de control de esfínteres, asfixia por paro respiratorio.

Tratamiento: Antídoto Sulfato de Atropina.

En intoxicación leve: En adultos aplicar una ampolleta (1.0mg) en forma intramuscular o subcutánea cada 2-3 horas según respuesta. En el caso de niños 0.05mg de sulfato de atropina/kg de peso cada 2-3 horas según respuesta.

En caso de intoxicación de moderada a severa: Para adultos una ampolleta (1.0 mg) en forma intramuscular cada 10-15 minutos según respuesta, hasta secar mucosas orales. En niños 0.05 mg/kg de peso en forma intramuscular o subcutánea cada 10-15 minutos según respuesta, hasta secar mucosas orales.

Antídoto Toxogonin: Este antídoto se aplica en el caso de intoxicaciones severas en donde la aplicación del sulfato de atropina no es suficiente. Aplicar en forma intravenosa toxogonin 6-8 mg/kg de peso, diluido en 250 ml de solución fisiológica y pasarlo en 30-60 minutos cada 2-3 horas por cuatro dosis. En niños el médico deberá valorar su equilibrio hídrico y diluir de acuerdo a su peso corporal. Están contraindicados el uso de morfina, epinefrina. No administrar sulfato de atropina a una persona cianótica.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, lagunas, ríos, arroyos, presas, canales, o depósitos de agua no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o el Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).”

“En caso de caída accidental de producto se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas cercano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original y bien cerrado.

GARANTIA: TUCAGRO, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUI RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO” • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!

Sanaton 5 G, normalmente ofrece un buen control durante 7 a 12 días, deberá repetirse el tratamiento cuando el grado de infestación lo requiera.	
Gusano trozador <i>Agratis spp</i>	0.3 Kg / 100 m²
Hormigas <i>Monomorium spp</i> , <i>Solenopsis spp</i> , <i>Tetramorium caespitum</i> , <i>Iridomyrmex humilis</i>	0.3 – 1.0 Kg / 100 m²
Grillos <i>Acheta domestica</i> Chapulín <i>Melanoplus sp</i> Milpiés <i>Diploda</i> Tijereta <i>Forticula auricularia</i> Cara de niño <i>Stenopelmathus taipea</i> Arañas <i>Araneidae</i> Gallina ciega <i>Phyllophaga sp.</i> Cochinillas <i>Dactylopius coccus</i> Cucarachas <i>Periplaneta americana</i>	1 – 2 Kg / 100 m²

PERIODO DE REENTRADA: No permita la entrada a los lotes tratados hasta después de 24 hrs de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO: SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION

Sanaton 5 G es un insecticida organofosforado, que actúa por contacto e ingestión, para control de plagas rastreras, se aplica directamente al suelo en céspedes, jardines, arboles, frutales.

Sanaton 5 G. Se aplica en: Campos de Golf, Parques, **ÁREAS VERDES DE:** Casas, Restaurantes, Escuelas, Bodegas, Hospitales, Hoteles, Industria, Industria Procesadora de Alimentos.

FRECUENCIA DE APLICACION: Se recomiendan aplicaciones para mantenimiento cada 8 semanas.

TIEMPO DE REENTRADA: Se recomienda esperar 12 horas antes de entrar a las zonas que han sido tratadas con este producto.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

CONTRAINDICACIONES: No aplicar este producto sin el equipo de protección adecuado. Durante el uso y manejo de **Sanaton 5 G** siempre utilice su equipo de protección personal. **Sanaton 5 G** es un producto que viene listo para ser utilizado. Abra el seco en la parte superior y agregue en el equipo de aplicación (tolva o depósito) la dosis autorizada. Se recomienda utilizar equipos para aplicación de granulos. Para obtener aplicaciones uniformes, siempre calibre su equipo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES: Aplicar cuando el suelo esté húmedo. En caso de aplicar cuando el suelo esté seco, se deberá realizar un riego durante los 3 días posteriores a la aplicación del producto.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico, si se aplica en los cultivos y dosis recomendadas, según las instrucciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: Si se desea realizar mezclas, estas deberán hacerse con productos que cuenten con registro sanitario ante la autoridad competente, para la combinación cultivo-plaga. Este producto no ha presentado problemas de incompatibilidad sin embargo, es recomendable realizar una pre mezcla para asegurarse de la compatibilidad física de los productos.

MANEJO DE RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESINTOXICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

