

"LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO"
"APLICACIÓN URBANA"

Oscilaught
FASTCAP

Esfenvalerato y Piretrina
Insecticida Microencapsulado

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Ingredientes Activos	% En peso
Esfenvalerato: (S) - α -ciano-3-fenoxibencil (S) -2- (4-clorofenil) -3- metilbutirato	6.4%
(Equivalente a 64.70 g i.a./L a 20°C)	
Piretrina: (RS) -2-metil-4-oxo-3-prop-2-ilciclopent-2-enil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -2,2-dimetil-3- (2-metilprop-1-enil) ciclopropanocarboxilato	1.6%
(Equivalente a 16.18 g i.a./L a 20°C)	

Ingredientes inertes

Solventes, Surfactantes, Estabilizadores, Emulsificantes,
Sinergista, Espesante, Conservador y Encapsulante 92.00%
Total..... 100.00%

No. de Registro: RSCO-URB-MEZO-1185-X0008-085-8.00

Contenido Neto: 473 ml F2964-005MEX Rev. 0720

**NOCIVO EN CASO
DE INGESTIÓN**



**NOCIVO SI SE
INHALA.**

Número de Lote y fecha de fabricación: aa/mm/dd

Fecha de Caducidad: 2 años a partir de su fecha de elaboración

Titular del registro e Importador:

VALENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Avenida Vallarta 6503 Int. G8

Colonia Ciudad Granja CP. 45010,

Zapopan Jalisco, México

Tel. (33) 31 10 01 62

FABRICANTE:



McLaughlin Gormley King Company

8810 Tenth Avenue North

Minneapolis, MN 55427-4372 E.U.A.

Tel. (001)763-544-0341

"HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA"

"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"



PRECAUCIÓN

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

- Durante su uso y manejo, utilice el equipo de protección completo (gorra, guantes, lentes de protección o protector de cara con protección lateral, protección sobre nariz y boca, camisa de manga larga y botas).
- Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño.
- Utilícese solamente en las áreas descritas.
- No utilice este producto en o sobre equipos eléctricos debido a la posibilidad de descargas eléctricas.
- No deje el producto donde niños y mascotas puedan entrar en contacto con el mismo.
- Antes de rociar, retire las mascotas y aves y cubra los acuarios y alimentos.
- Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Lavar la ropa de trabajo con agua limpia y jabón de manera separada a la ropa de uso común y almacenar junto con el equipo de aplicación en un área fresca y bajo llave.
- El equipo utilizado deberá mantenerse limpio y almacenado en el área de trabajo.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"	
EN CASO DE INGESTIÓN:	• Solicite inmediatamente instrucciones de tratamiento llamando a un centro de información toxicológica o a un médico. • No deberá darse líquido alguno a la persona. • No induzca el vómito, a menos que así lo indique un centro de información toxicológica o un médico. • No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:	• Mantenga los ojos abiertos y lave lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. • Si usa lentes de contacto, quítese los lentes después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagándose los ojos. • Solicite instrucciones de tratamiento llamando a un centro de información toxicológica o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:	• Quítese la ropa contaminada. • Lávese de inmediato con abundante agua durante 15-20 minutos. • Solicite instrucciones de tratamiento llamando a un centro de información toxicológica o a un médico.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo químico: Piretroide (esfenvalerato) y piretroide sintético (praletrina).

Antídoto y Tratamiento: No existe antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte.

Signos y síntomas: VIA DÉRMICA: Este producto es moderadamente irritante a la piel, puede provocar enrojecimiento y/o reacciones alérgicas, irritación ocular y nasal y sensación de hormigueo. VIA ORAL: Si se ingiere puede provocar dolor abdominal, náuseas, vómito, estremecimiento y convulsiones. VIA INHALATORIA: puede ocasionar respiración irregular, estornudos, congestión nasal, dolor de cabeza, náuseas, vértigo y desorientación.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL

PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.
- “ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.
- “ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL:

Para el control de insectos, bajo techo y al aire libre, en áreas con y sin alimentos, tales como (pero no limitado a): hogares, escuelas, almacenes, edificios de oficinas, edificios de apartamentos, teatros, hoteles, edificios industriales, moteles, perreras, alojamientos de ganado, plantas de procesamiento de alimentos, establecimientos de servicios alimenticios, restaurantes, supermercados y tiendas de comestibles, equipos de transporte, remolques de camiones, vagones de ferrocarril y establecimientos de fabricación y de almacenamiento de alimentos. También para ser usado en patios traseros, céspedes, árboles, jardines ornamentales, áreas recreativas, parques y campos atléticos.

PLAGAS

Insectos Controlados:

Acaros (*Glycyphagus domesticus*), Antrénos (*Anthrenus verbasci*), Arañas (*Arachnida*), Bichos Bolita (*Armadillidae*), Bichos Kudzu (*Megacopta cribraria*), Cagachín (*Nematocera*), Chinche Marrón (*Haemaphysalis*), Chinchas (*Cimex lectularius*), Cochinita Harinosa (*Pseudococcidae*), Colémbolos (*Collembola*), Cucarachas (*Blattidae*), Enjambres de Termitas (*Isoptera*), Escamas (*Coccioidea*), Garrapatas (*Ixodidae*), Garrapatas de Perro (*Dermacentor variabilis*), Grillos (*Acheta domestica*), Hormiga Brava (*Solenopsis*), Hormigas (*Formicidae*), Insecto del Fuego (*Thermobia domestica*), Insectos del Arce (*Boisea trivittata*), Lepisma (*Lepisma saccharinum*), Mariquitas Asiáticas (*Harmonia axyridis*), Milpiés (*Diplopoda*), Piojos de los libros (*Psocoptera*), Pulgas (*Siphonaptera*), Pulgones (*Aphididae*), Tijereta Europea (*Forficula auricularia*).

Plagas de Productos Almacenados incluyendo:

Acaros Araña (*Tetranychidae*), Acaros de los Granos (*Acarus siro*), Barrenadores del Grano Menores (*Rhyzopertha dominica*), Cadelá (*Tenebroides mauritanicus*), Escarabajo Rojo de la Harina (*Tribolium castaneum*), Escarabajo Oxidado de Granos (*Cryptolestes ferrugineus*), Escarabajos Araña (*Ptiniidae*), Escarabajos de Farmacia (*Stegobium paniceum*), Escarabajos de Fruta Seca (*Carpophilus hemipterus*), Escarabajo Comerciante de Granos (*Oryzaephilus mercator*), Gorgojo Aplanado de los Granos (*Cryptolestes pusillus*), Gorgojo Confuso de la Harina (*Tribolium confusum*), Gorgojo de Cuello Cuadrado (*Cathartus quadricollis*), Gorgojo de los Cigarros (*Lasioderma serricorne*), Gorgojo de los Granos (*Sitophilus granarius*), Gorgojo del Arroz (*Sitophilus oryzae*), Gorgojos del Malz (*Sitophilus zeamais*), Gusanos Amarillos de Comida (*Tenebrio molitor*), Gusanos Oscuros de Comida (*Tenebrio obscurus*), Hespéridos (*Epiphyas tityrus*), Hormigas (*Formicidae*), Larvas de Polilla de la Comida (*Plodia interpunctella*), Moscas de la Fruta (*Drosophila spp.*), Palomilla Dorada del Malz (*Sitotroga cerealella*), Polilla de Tabaco (*Ephestia elutella*), Polilla India de la Comida (*Plodia interpunctella*), Polillas Mediterráneas de Harina (*Ephestia kuehniella*), Silvano del Malz (*Oryzaephilus surinamensis*).

(continuado)

PLAGAS (cont.)**Insectos Voladores incluyendo:**

Aradores (*Trombicula*), Jejenos (*Nematocera*), Mosca Azul de la Carne (*Calliphoridae*), Mosca Ciervo (*Chrysops*), Mosca de Otoño (*Musca autumnalis*), Mosca del Cuerno (*Haematobia irritans*), Mosca Doméstica (*Musca domestica*), Mosca Blanca (*Aleyrodidae*), Mosca de Fruta (*Drosophila melanogaster*), Mosca de Hongo (*Orfelia spp.*), Mosca de Racimo (*Pollenia*), Mosquitos (*Culicidae*), Pequeñas Polillas Voladoras (*Lepidoptera*), Polillas de la Ropa (*Tineola bisselliella*), Tipula de las Huertas (*Tipulidae*)

Plagas que pican:

Abejas (*Apoidea*), Aradores (*Trombicula*), Arañas (*Arachnida*), Avispa (*Polistes*), Avispa Amarilla (*Vespa* spp.), Avispónes (*Vespa*), Chinchas (*Cimex lectularius*), Escorpiones (*Dromopoda*), Garrapata del Venado (*Ixodes* spp.), Garrapatas (*Ixodidae*), Garrapatas de Perro (*Demacantor variabilis*), Hormiga Brava (*Solenopsis*), Jejenos (*Nematocera*), Mosca Ciervo (*Chrysops*), Mosca del Establo (*Diptera*), Mosquitos (*Culicidae*), Piojos Masticadores (*Mallophaga*), Pulgas (*Siphonaptera*)

Plagas que destruyen la madera incluyendo:

Abejas Carpinteras (*Xylocopa virginica*), Barrenadores de Casas Viejas (*Hyloterpes bajulus*), Capricornio Doméstico con Cabeza Redonda (*Cerambycidae*), Carcoma de Polvo de Salvadera (*Lyctoxylon dentatum*), Escarabajos de los Muebles (*Anobium punctatum*), Hormigas Carpinteras (*Camponotus*), Relojes de la Muerte (*Xestobium rufovillosum*), Termitas (*Isopora*)

(continuado)

PLAGAS (cont.)**Plagas de Plantas incluyendo:**

Acaros (*Glycyphagus domesticus*), Áfido (*Aphididae*), Polilla de la Alcachofa (*Platyptilia carduactylus*), Arañas (*Arachnida*), Arrollador de las Hojas (*Archips argyrospila*), Atador de las Hojas (*Udea rubigalis*), Babosas de nuez pacana (*Daktubapha vitifoliae*), Adélgidos lanudos de bálsamo (*Adelges piceae*), Barrenador de Melocotoneros (*Synanthedon exitiosa*), Barrenador de nuez pacana (*Clastoptera achatina*), Barrenador del fruto del pacana (*Acrobasis nuxvorella*), Barrenador del fruto del pepino (*Diaphania nitidalis*), Barrenador del Ruezno (*Cydia caryana*), Bicho Coreid de los pinos (*Euthochtha galeator*), Bichos Bolita (*Armadillidae*), Bichos Kudzu (*Megacopta cribraria*), Blanquita de la Col Importada (*Pteris rapae*), Chinchas (*Blissus leucopertus*), Chinchas (*Lygus lineolaris*), Chinchas de Encaje (*Corythucha* spp.), Chinchas hedionda (*Nomius pygmaeus*), Chinchas marrón (*Halymorpha halys*), Chinchas rápida del algodónero (*Creontiades rubrinervis*), Chinche opaca de las plantas (*Lygus hesperus*), Curculio de caupi (*Chalcodermus aeneus*), Escamas (*Coccidae*), Escarabajo de la savia (*Carpophilus* spp.), Escarabajo de los pinos (*Anomala dubia*), Escarabajo del Pepino (*Diabrotica undecimpunctata*), Escarabajo Japonés (*Popillia japonica*), Escarabajo Mexicano de los Frijoles (*Epilachna varivestis*), Galeruca del Olmo (*Monocletois coryli*), Gardama de la Remolacha (*Psychidae*), Gorgojo anual del bluegrass (*Listronotus maculicollis*), Gorgojo de la Fruta Arándano (*Anthonomus musculus*), Gorgojo de la pecana (*Curculio caryae*), Gorgojo de los Guisantes (*Bruchus pisorum*), Gorgojo de Pino Nórdico (*Pissodes nemorensis*), Gorgojo del Chile (*Magdalenella*), Gorgojo del Haba (*Spodoptera exigua*), Grillos topes (*Gryllotalpidae*), Gusano cortador de las habas del oeste (*Stratiocosta albicosta*), Gusano Cortadores (Negros *Agrotis ipsilon*), Gusano de Bolsa (*Hyphantria cunea*), Gusano de la Fruta Arándano (*Acrobasis vaccinii*), Gusano de la Fruta de Cerezas (*Grapholita packardii*), Gusano de la Manzana (*Cydia pomonella*), Gusano de la Manzana Menores (*Grapholita prunivora*), Gusano de la Mosca de Fruta (*Rhagoletis pomonella*), Gusano de la naranja ombligo (*Amyelois transitella*), Gusano de las agujas del pino europeo (*Neodiprion sertifer*), Gusano de las agujas del pino rojo (*Neodiprion lecontei*), Gusano de las Frutas Verdes (*Litophane antennata*), Gusano del Fuego de Rayos Rojos (*Aroga triabamaculella*), Gusano Ejército (*Mythimna unipuncta*), Gusano Medidor (*Trichoplusia ni*), Gusano peludo (*Estigmene acrea*). (cont.)

(continuado)

PLAGAS (cont.)**Plagas de Plantas incluyendo (cont.):**

Gusano Perforadores de Durazneros (*Anarsia lineatella*), Gusano Perforadores de Durazneros Menores (*Synanthedon pictipes*), Gusano telaraña del césped (*Crambus*), Palomilla dorso de diamante (*Plutella xylostella*), Lombrices de avellana (*Cydia latiferreana*), Lombrices de trébol (*Hypena scabra*), Barrenador estadounidense de la ciruela (*Euzophera semitumalis*), Minadores de Hojas (*Liriomyza* spp.), Moscas Blancas (*Aleyrodidae*), Moscas de la cascara de nogales (*Rhagoletis completa*), Moscas de la Fruta de Cerezas (*Rhagoletis cingulata*), Oruga de Alfalfa (*Colias eurytheme*), Oruga de carpa (*Malacosoma*), Oruga de la Mariposa dama Pintada (*Vanessa*), Oruga que se alimentan de hojas (*Lepidoptera*), Oruga terciopelo de habas (*Anticarsia gemmatilis*), Filoxera del tallo de la pacana (*Phylloxera vastatrix*), Picudo del Chile (*Anthonomus eugenii*), Picudo del ciruelo (*Conotrachelus nenuphar*), Picudos (*Sphenophorus* spp.), Polilla de Tabaco (*Ephestia elutella*), Polilla Gitana (*Lymantria dispar*), Polilla Mohuda de la manzana (*Platynota idaeusalis*), Polilla Orientales de la Fruta (*Grapholita molesta*), Babosa de la Pera (*Caliroa cerasi*), Pulguilla de pera (*Cacopsylla pyricola*), Pulguillas (*Chrysomelidae* spp.), Salivazo (*Clastoptera* spp.), Saltamontes de las Hojas (*Zelus renardii*), Saltamontes (*Orthoptera*), Polilla de arándano (*Speranza argillacea*), Trips (*Thripidae*).

DOSIS E INTERVALOS DE APLICACIÓN

Dosis de aplicación al aire libre para arañas, escorpiones y las plagas indicadas en ésta etiqueta:

Áreas a tratar	Tasa de dilución con agua	Método(s) de aplicación	Intervalo de aplicación
Tratamiento de paredes exteriores, cimientos y estructuras	15 ml a 30ml / 3.78 L (3.97 ml/L) o 15 ml a 30 ml en agua suficiente para cubrir 92.90 m ² (0.16 ml a 0.32 ml/m ²)	Aplicase como un rocío grueso y mojado * Tratamiento de grietas y hendiduras * Tratamiento localizado * Tratamiento con rocío al voleo ¹	Repita las aplicaciones según sea necesario, pero que no excedan más de una (1) aplicación cada 14 días.
Tratamiento de hormiga Brava	240 ml/ por cada 92.90 m ² (2.54 ml/ m ²)	Aplicación al voleo con el empaque de los montículos	Repetir los tratamientos a intervalos de 7-14 días.

(continuado)

DOSIS E INTERVALOS DE APLICACIÓN (cont.)

Áreas a tratar	Tasa de dilución con agua	Método(s) de aplicación	Intervalo de aplicación
Tratamiento de los nidos y áreas de refugio de insectos picadores	30 ml / 3.78 L (7.67 ml/L) o 30 ml en agua suficiente para cubrir 92.90 m ² (0.32 ml/m ²)	Aplicase como un rocío grueso y mojado * Tratamiento de nidos, áreas de refugio y alrededores en la tarde noche. * Tratamiento de grietas y hendiduras * Tratamiento localizado Este tratamiento no es un sustituto de un programa integral de control de termitas.	Repetir los tratamientos a intervalos de 7-14 días.

(continuado)

DOSIS E INTERVALOS DE APLICACIÓN (cont.)

Áreas a tratar	Tasa de dilución con agua	Método(s) de aplicación	Intervalo de aplicación
Para controlar enjambres de termitas y plagas destructoras de maderas.	30 ml / 3.78 L (7.67 ml/L) o 30 ml en agua suficiente para cubrir 92.90 m ² (0.32 ml/m ²)	Aplicase como un rocío grueso y mojado * Tratamiento de grietas y hendiduras * Tratamiento localizado	Repetir los tratamientos a intervalos de 7-14 días.
Control de pulgas y garrapatas al aire libre		Aplicase como rocío * Tratamiento a la vegetación maleza, ramas y áreas cercanas de la morada. -No lo aplique a pastizales o tierras de cultivo -No rocíe las mascotas con este producto	Repetir los tratamientos a intervalos de 7-14 días.

(continuado)

DOSIS E INTERVALOS DE APLICACIÓN (cont.)

Áreas a tratar	Tasa de dilución con agua	Método(s) de aplicación	Intervalo de aplicación
Tratamiento de árboles y jardines ornamentales ¹	3 ml a 30 ml / 3.78 L (0.793 ml a 7.93 ml/L) o 3 ml a 30 ml en agua suficiente para cubrir 92.90 m ² (0.032 ml a 0.32 ml/m ²)	Aplicase como rocío foliar de cobertura total, aplicado hasta el punto de goteo, pero no de escorrentía.	*Repita los tratamientos que sean necesarios para lograr el control, usando dosis de aplicación más altas en la medida que aumente la presión de la plaga y el área de follaje. *Repita la aplicación según sea necesario, pero no más de una vez cada siete (7) días.

(continúa)

DOSIS E INTERVALOS DE APLICACIÓN (cont.)

Áreas a tratar	Tasa de dilución con agua	Método(s) de aplicación	Intervalo de aplicación
Criaderos de mosquitos	15 ml / 3.78 L (3.97 ml/L) o 15 ml en agua suficiente para cubrir 92.90 m ² (0.16 ml/m ²)	Aplicase como un rocío grueso y mojado mientras el aire esté quieto * Tratamiento con rocío al voleo * Tratamiento con rocío foliar	Repetir los tratamientos a intervalos de 7-14 días.
Tratamiento de insectos en el césped ²	3 ml a 30 ml / 3.78 L (0.793 ml a 7.93 ml/L) o 3 ml a 30 ml en agua suficiente para cubrir 92.90 m ² (0.032 ml a 0.32 ml/m ²) o 127 ml a 1271 ml/ acre (127 ml a 1271 ml/ 4046.86 m ²)	Trátase con un equipo de aspersión o un rociador manual. Aplicase como un rocío grueso y mojado * Tratamiento con rocío al voleo	Repetir los tratamientos a intervalos de 7-14 días.

(continúa)

DOSIS E INTERVALOS DE APLICACIÓN (cont.)

Áreas a tratar	Tasa de dilución con agua	Método(s) de aplicación	Intervalo de aplicación
Grillos topo y chinche	30 ml por cada 92.09 m ²	Trátase con un equipo de aspersión o un rociador manual. Aplicase como un rocío grueso y mojado	Repetir los tratamientos a intervalos de 7-14 días.
Las aplicaciones realizadas a través del uso de un rocío grueso y de baja presión sólo a aquellas porciones de las superficies que están directamente encima de suelo desnudo, césped, mantillo u otra vegetación, como se indica en esta etiqueta, y no sobre una superficie impermeable, drenaje u otra condición que podría dar lugar a la escorrentía en los drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales con el fin de controlar los invasores ocasionales o plagas de agregación que figuran en esta etiqueta para las aplicaciones hechas cuando las plagas están activas, el aplicador debe usar el equipo de protección que sea necesario. Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: no permita que los animales o los niños regresen a las zonas tratadas hasta que el rocío se haya secado completamente			

¹Ciertas plantas podrían ser sensibles a la solución de rociado final. Se recomienda realizar una prueba a pequeña escala para verificar si es seguro usarlo en las plantas ornamentales. Rocíe y observe durante un (1) semana antes de la aplicación a una siembra entera.

² Para obtener los mejores resultados, debe cortarse el césped 1-2 días antes de rociarlo.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Usar el equipo de protección recomendado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO de esta etiqueta al preparar y aplicar el producto. Antes de diluir, agite el recipiente de ONSLAUGHT FASTCAP invirtiéndolo varias veces. Limpie el equipo de pulverización antes y después de usarse. Para la dilución, añada aproximadamente la mitad del agua requerida al tanque del pulverizador y luego añada la cantidad apropiada de ONSLAUGHT FASTCAP de acuerdo a las recomendaciones en esta etiqueta. Agítelo y añada lentamente el agua restante. Agite la mezcla a rociar antes de usarla, y también de vez en cuando durante el uso para asegurar su dispersión. Si se utilizan mallas filtrantes para el rociado, deben ser malla número 50 o más grandes. Utilice 15 ml de ONSLAUGHT FASTCAP en 3.78 litros de agua para las infestaciones ligeras o como una dosis para el control de mantenimiento. Utilice 30 ml por cada 3.78 litros de agua para infestaciones severas o como una dosis para la limpieza inicial. Aplique ráfagas de rociado de dos segundos de duración por 0.093 m² del área a tratar. Evite la aplicación excesiva. Humedezca las superficies, pero no hasta el punto de saturación o escurrimiento. ONSLAUGHT FASTCAP debe mezclarse sólo con agua y aplicarse con pulverizadores presurizados a mano o motorizados. Se pueden utilizar equipos de aplicación tipo inyectores que ofrecen tratamientos de bajo volumen para llevar a cabo inyecciones en grietas y hendiduras o tratamientos localizados y de superficie en general.

Onslaught FastCap puede rociarse sobre cualquier superficie que no contenga cantidades excesivas de agua, si le preocupa que el pesticida llegue a manchar o no se tiene seguridad de si es seguro aplicarle agua a la superficie, pruebe la superficie rociando una pequeña cantidad en un área oculta antes de realizar una aplicación amplia.

• Aplicación en establecimientos de procesamiento/manipulación de alimentos

Se permite la aplicación dentro de las áreas con y sin alimentos de los establecimientos de servicio y manipulación de alimentos (distintos a residencias privadas), entre ellos: restaurantes, plantas de procesamiento de carne, tiendas de abarrotes, panaderías, establecimientos de fabricación y procesamiento de alimentos y establecimientos de almacenamiento de alimentos. No trate establecimientos donde haya presente alimentos para animales de cría.

• Aplicaciones generales sobre superficies

No aplique ONSLAUGHT FASTCAP en zonas generales de la instalación donde haya alimentos cuando la instalación esté en operación o los alimentos estén expuestos. No lo aplique directamente a alimentos. Cubra o retire todos los alimentos y equipos de procesamiento de alimentos antes de la aplicación. Después de rociar en plantas empacadoras de carne, panaderías y otras plantas procesadoras de alimentos, lave con un compuesto de limpieza eficaz todos los equipos, bancos, estanterías, etc. donde se manipulará comida expuesta, y luego enjuáguelos con agua potable.

• Aplicaciones localizadas o de grietas y hendiduras

Se pueden realizar mientras el establecimiento está funcionando, siempre y cuando los alimentos expuestos sean cubiertos o retirados del área a tratar. No lo aplique directamente a alimentos o superficies de manipulación de alimentos. No aplique este rocío sobre superficies o utensilios que puedan entrar en contacto con alimentos. Utilice equipos de inyección para aplicaciones en espacios huecos profundos. Con respecto a la configuración y presiones de operación correctas,

siga las recomendaciones del fabricante del equipo de inyección, podría ser necesario taladrar uno o más agujeros de acceso. Inyecte el producto en el espacio hueco en ráfagas cortas. Evite aplicar hasta el punto de escurrimiento o goteo. Ventile a fondo el área tratada antes de volver a entrar en ella.

CONTRAINDICACIONES:

No aplique este producto en habitaciones de pacientes ni en ninguna habitación mientras esté ocupada por personas ancianas o enfermas. No lo aplique en aulas mientras estén en uso. No lo aplique en el área inmediata a instituciones (incluyendo bibliotecas, escuelas, instalaciones deportivas, etc.) donde se encuentren ocupantes. No mezcle ONSLAUGHT FASTCAP en el tanque con productos que contengan diclorvos (DDVP). Si realizan mezclas, éstas deben ser con productos con registro. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad.

GARANTÍA: VALENT DE MÉXICO S.A. DE C.V garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Por ningún motivo VALENT DE MÉXICO S.A. DE C.V asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños causados que ello pudiesen ocasionar.