

"APLICACIÓN URBANA"



Selontra®

colecalfiferol
Rodenticida / Cebo / esterol

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Ingredientes activos:

	% en peso
Colecalciferol: (3 β ,5Z,7E)-9,10-secocolesta-5,7,10(19)-trien-3-ol	0.075 %
(Equivalente a 0.75 g de i.a. / Kg)	

Ingredientes Inertes:

Saborizantes, solventes, conservador, antioxidantes, Colorante, amargante.....	99.925 %
Total:.....	100.00 %

REGISTRO SANITARIO No.: RSCO-RODE-517-X0004-04-0.075

CONTENIDO NETO: 10 Kg

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975, COL. CIUDAD DE LOS

DEPORTES

C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO

TEL: 01 (55) 5325-2600

"HECHO EN INGLATERRA"

Lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de Caducidad:

2 años después de su fabricación.

® Marca registrada de BASF

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

Precaución



81141553MAY2020



"ALTO, LEA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO".

Las personas que manejen el producto; debe usar equipo protector personal como camisa de manga larga y pantalón largo, goma, gafas protectoras, mascarilla, guantes y botas de nitrilo, butilo o neopreno, resistentes a productos químicos. Manténganse perfectamente limpios y bien ventiladas las áreas de trabajo, equipo limpio y en buen estado. Mientras se hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo. El equipo de protección personal debe lavarse y almacenarse en el sitio de trabajo antes de volver a usarse.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO".

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".

"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".

"NO DESTAPE LA ENVOLTURA CON LA BOCA".

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".

"NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA".

LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA) DE PROCCYT AL TEL 01 (55) 5596-6659 ó 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 00 928 00 las 24 horas del día.

"PRIMEROS AUXILIOS".

En caso de inhalación: Mantenga al paciente en calma, retírelo al aire fresco. Consiga atención médica.

En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos. Consiga atención médica.

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos.

En caso de ingestión: Si la persona afectada está consciente, enjuagar inmediatamente la boca e inducir al vómito.

Consiga atención médica. Nunca induzca el vómito si la víctima está inconsciente o tiene convulsiones. No provocar vómito. Si la persona afectada está en condiciones de deglutir, permítale tomar lentamente sorbos de agua.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO".

Grupo químico: El ingrediente activo de Selontra® es el dicalciferol que pertenece al grupo químico de los esteroides.

Signos y síntomas de intoxicación: En caso de contacto con la piel y ojos: irritación. En caso de ingestión: dolor abdominal. En caso de inhalación: no se reportan signos ni síntomas clínicos por el tipo de formulación.

Antídoto y tratamiento: El dicalciferol causa hipercalcemia. Tratar sintomáticamente. El tratamiento incluiría una dieta baja en calcio, una alta ingesta de sal y líquidos y evitar la exposición a la luz solar. La monitorización de los niveles séricos de calcio puede ayudar al tratamiento. La cortisona se ha utilizado con éxito en algunos casos.

"RECOMENDACIONES AL VETERINARIO".

En caso de intoxicación en organismos no blanco como mascotas, inducir al vómito usando agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) o administrando carbón activado. Si se desarrollan signos clínicos, se recomienda la diuresis salina combinada con el uso de furosemida, corticosteroides y alginatos de calcio.

La calcitonina o el pamidronato pueden ser necesarios para los animales que permanezcan hipercalcémicos a pesar de los tratamientos sintomáticos.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE".

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

Garantía.

Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o cualquier otra ley relacionada y validado por ensayos de campo se ha demostrado que este producto aplicándolo de acuerdo a nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados, por lo que BASF garantiza la composición porcentual de la etiqueta y se hace responsable solo respecto de la calidad constante del producto. Dado que el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, renunciamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del mal uso y almacenamiento.

"INSTRUCCIONES DE USO".

Selontra® es un rodenticida que solo puede utilizarse de acuerdo con las instrucciones y precauciones de uso que aparecen en esta etiqueta. El bloque **Selontra®** se presenta listo para usar y no debe disminuirse su concentración con algún otro material en lugares como edificios en general.

Puede aplicarse en interiores y exteriores de: alcantarillas, zoológicos, tiendas de mascotas, hoteles, restaurantes, plantas industriales, plantas procesadoras de alimentos, plantas farmacéuticas, empaques de productos agrícolas, parques recreativos, plantas destiladoras de alcohol, cavas, supermercados, escuelas, edificios, almacenes, hospitales, barcos, ferrocarriles y camiones.

Selontra® es un cebo blando de rodenticida de alto rendimiento basado en una formulación innovadora que ofrece un control rápido y efectivo de ratones (*Mus musculus / domesticus*), Ratones marrones (*Rattus norvegicus*) y ratas negras (*Rattus rattus*), incluyendo cepas resistentes a anticoagulantes y otros roedores difíciles de controlar. Con un modo de acción diferente a los anticoagulantes, proporciona una alternativa de alto rendimiento y solución de problemas.

Mecanismo de acción: **Selontra®** hace que los roedores pierdan el apetito después de comer, lo que significa que no volverán al punto de cebo para alimentarse. Esto permite que otros roedores menos dominantes salgan y se alimenten más rápidamente. Como resultado, hay grandes beneficios:

- alcanzar más roedores por estación de cebo;
- obtener el uso más económico del cebo;
- los roedores individuales serán controlados dentro de dos días después de que comiencen a alimentarse;
- control completo dentro de los 7 días después de que los roedores comiencen a alimentarse; y
- el control de la infestación con sólo dos aplicaciones del cebo.

Antes de colocar el cebo, inspeccionar la zona infestada para descubrir por dónde entran, anidan y se alimentan los roedores. Estos prefieren lugares protegidos y es importante explorar los rincones oscuros y las áreas donde se hayan acumulado basuras. Las ratas nadan muy bien, los desagües abiertos o dañados pueden ofrecer puentes entre edificios.

Recuerde que los cebos se deben colocar en lugares inaccesibles para niños, animales domésticos y aves. Los cebos deben cubrirse para evitar el acceso de animales que no sean roedores.

RATAS: (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*) Coloque de 5 a 7 bloques en una bandeja cubierta en cada punto de cebo en las entradas de las madrigueras, al lado de sus caminos o debajo de la basura, colocando la mayor cantidad de cebos en los lugares donde las ratas anidan y donde se alimentan.

Colocar los cebos a más o menos 5 metros de distancia cuando las infestaciones sean altas y a 10 metros cuando las infestaciones sean bajas.

RATONES: (*Mus musculus*) Los ratones generalmente recorren pequeñas distancias y no necesitan beber agua. Son roedores difíciles de controlar que las ratas, porque sus hábitos alimentarios son variables. Coloque de uno a dos bloques en una bandeja cubierta, cada uno o dos metros, en lugares donde sea evidente que hay ratones, especialmente donde se encuentren excrementos.

Inspección: Inspeccionar los puntos de cebo cada uno a dos días después de la primera colocación de cebo, reemplazando el cebo que haya sido consumido. Normalmente es necesario reponer cebo tres a cuatro veces en cada campaña de control de roedores. Al terminar la campaña, recoger todos los restos de cebo y quemarlos o enterrarlos en un lugar apropiado y seguro. Buscar, recoger y quemar los roedores muertos.

La muerte de roedores se producirá 2-5 días después de la ingestión de una cantidad letal de cebo. Buscar y eliminar a los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, al menos con la misma frecuencia que cuando se comprueban los cebos.

Usar guantes protectores. No colocar roedores muertos en botes de residuos o basureros.

Contraindicaciones.

No aplique **Selontra®** durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes.

El no respetar las recomendaciones de uso indicado en esta etiqueta, puede generar situaciones de ineffectividad del producto.

Este producto contiene BITREX (amargante) para ayudar a prevenir el consumo accidental en humanos.

8 114 1554 MX2020



Precaución

