"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado para manipular el producto durante la preparación de mezclas y la carga de equipos de aplicación: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores, gogles, guantes y botas de neopreno. Use los equipos de seguridad durante el uso o aplicación del producto. Otras medidas específicas para la prevención de daños a la salud y protección del usuario: llene los depósitos del equipo de aspersión y realice la aplicación siempre a favor del viento; mantenga limpio el equipo de aspersión después de usarlo; guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS".
"LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
"NO ALMACENE EN CASAS HABITACION".
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO".
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Las medidas inmediatas que deben tomarse en caso de sobre exposición al producto son: si hubo derramamiento sobre la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada. En afección a los ojos, lavar abundantemente con agua limpia durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. En caso de inconsciencia, asegúrese que pueda respirar sin dificultad no provoque el vómito y no introduzca nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Este producto es un insecticida botánico derivado de extractos vegetales. No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas en caso de alergia en personas susceptibles. En casos extremos, los signos y síntomas de intoxicación más comunes por vía oral, dérmica e inhalada son dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS".
"MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO".
"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION".

EEETET002-V6

USO AGRICOLA

BIO-DIE®

argemonina, berberina, ricinina y α-terthienil
INSECTICIDA y/o ACARICIDA BOTANICO / EXTRACTO ACUOSO

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
Ingredientes Activos.	
Argemonina: (6S,12S)2,3,8,9-tetrametoxi-13-metilazadibenzo[b,f] biciclo[3,3,1]nona-2,6-dieno. (Equivalente a 35.70 g de i.a./L a 25°C).	3.50
Berberina: 7,8,13,13a-Tertadehidro-9,10-dimetoxi-2,3-[metilenbis(oxi)]berbinio. (Equivalente a 22.20 g de i.a./L a 25°C).	2.20
Ricinina: 4-metoxi-1-metil-2-oxo-piridine-3-carbonitrilo. (Equivalente a 28.00 g de i.a./L a 25°C).	2.80
α-Terthienil: 2,5-di(tiofen-2-il)tiofeno. (Equivalente a 35.35 g de i.a./L a 25°C).	3.50
Ingrediente Inerte. Diluyente.	88.00
	Total: 100.00

No. Registro: RSCO-MEZC-1101E-301-406-012

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

Contenido Neto:
☑ 1 L
☐ 12 piezas de 1 L
☐ 20 L

No. de Lote:
Fecha de Fabricación:
(aa-mm-dd)

Fecha de caducidad:
1 año bajo las condiciones indicadas en esta etiqueta.

TITULAR DEL REGISTRO:
Ultraquimia Agrícola, S.A. de C.V.
Calle 56 Sur, No. 7 A (Esq. Andador 11),
Col. CIVAC, 62500, Jiutepec, Morelos.
Tel. (777) 3211477.

OMRI LISTED
Para producción orgánica - OMRI.org

HECHO EN MEXICO

DISTRIBUIDOR:
Promotora Técnica Industrial, S.A. de C.V.
Calle 56 Sur, Manzana 1, Lote 13,
Col. CIVAC, 62500, Jiutepec, Morelos.
Tel. (777) 3211475.

"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS"

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION

BIO-DIE® es un producto orgánico para su uso de acuerdo al siguiente cuadro de recomendaciones:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Aguacatero (SL)	Araña roja (*Oligonychus punicae*)	3.0 L/ha	Realizar 3 aspersiones, al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación es de 1500-2000 L/ha. Para asegurar un adecuado control, es necesario aplicar un coadyuvante no iónico.
Ajo, Cebolla , Cebollín, Espárrago (SL)	Trips (*Thrips tabaci*)	1.0 - 2.0 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 8 días, para asegurar un control adecuado es necesario agregar a la mezcla un coadyuvante a razón de 0.5 mL/L de agua; el volumen de agua es de 450 L/ha.
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora (SL)	Araña roja (*Tetranychus urticae*) Trips (*Frankliniella occidentalis*)	2.0 - 3.0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días. El volumen de aplicación es de 600 L de agua/ha.
	Mosca del vinagre de las alas manchadas (*Drosophila suzukii*)	2.0 - 3.0 L/200 L de agua	Realizar 3 aplicaciones dirigidas al follaje a intervalo de 7 días.
Berenjena, Chile, Chile habanero, Chile jalapeño, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Tabaco, Tomate de cáscara (SL)	Mosquita blanca (*Bemisia tabaci*)	1.5 - 2.0 L/ha	Aplicación al follaje.
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Tomate de cáscara (SL)	Trips oriental (*Thrips palmi*)	1.0 - 3.0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga, periodo de protección por al menos 21 días; volumen de aplicación sugerido 718-819 L de agua/ha.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor (SL)	Palomilla dorso de diamante (*Plutella xylostella*) Gusano falso medidor (*Trichoplusia ni*)	3.0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días; agregar a la mezcla un coadyuvente; el volumen de aplicación es de 450-550 L de agua/ha.
Lechuga (SL)	Pulgón (*Brevicoryne brassicae*)	1.0 - 2.0 L/100 L de agua	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días en etapa de floración cuando se detecten los primeros individuos, adecuar el agua a un pH de 6.5, utilizar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta.
Limа, Limonero, Limón mexicano, Limón persa, Mandarina, Naranja, Pomelo, Tangerina, Toronjo (SL)	Pulgón negro de los cítricos (*Toxoptera aurantii*)	2.0 L/ha	Realizar 3 aspersiones a intervalos de 21 días; volumen de aplicación 500 L/ha.
	Pulgón asiático (*Diaphorina citri*)	1.5 - 2.0 L/ha	
	Ácaro blanco (*Polyphagotarsonemus latus*) Piojo harinoso (*Planococcus citri*)	1.0 - 2.0 L/ha	
Manzano, Peral (SL)	Chinche hígus (*Lygus lineolaris*)	0.25 - 0.75 L/100 L de agua	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga, utilizar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación sugerido 571 - 871 L de agua/ha.
Nopal (SL)	Cochinilla (*Dactylopius coccus*)	3.0 L/ha	Realizar 3 aspersiones, al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación es de 1500-2000 L/ha. Para asegurar un adecuado control se recomienda agregar a la mezclar un coadyuvante no iónico.
Palma de coco (SL)	Ácaro rojo de las palmas (*Raoiella indica*)	10 - 15 mL/L de agua	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 500-600 L de agua/ha.
Papaya (SL)	Mosca blanca (*Bemisia tabaci*)	1.0 - 2.0 L/ha	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo, adicionar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación 250-350 L de agua/ha.
	Araña roja (*Tetranychus urticae*)	1.0 - 2.0 L/ha	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo, adicionar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación 250-350 L de agua/ha.
Calabacita, Calabaza, Chayota, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Trips (*Frankliniella occidentalis*)	1.5 - 2.0 L/ha	Realizar tres aplicaciones dirigidas al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 550 a 650 L de agua/ha.
	Trips oriental (*Thrips palmi*)	2.0 - 3.0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 171 - 271 L de agua/ha.

( ) Intervalo de seguridad, días entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite.
Tiempo de reentrada: Inmediatamente después de que seque el rocío de la aplicación.

Sus componentes naturales tienen acción insecticida y repelencia contra insectos. **BIO-DIE®** ejerce su acción insecticida a través de un grupo de componentes orgánicos con diferentes modos de acción, siendo difícil que los insectos logren eliminarlo de su cuerpo o escapen a su acción tóxica. **BIO-DIE®** traspasa la cutícula afectando el sistema nervioso central y periférico, ocasionando convulsiones, tetanización de músculos y muerte del insecto.

Método para preparar y aplicar el producto: agite el producto antes de usarlo. Para abrir el envase del producto, gire la tapa en sentido inverso a la dirección de las manecillas del reloj. Acondicione el pH del agua en el rango de 6.5 a 7.5. Vierta la cantidad necesaria de **BIO-DIE®** directamente con lo suficiente cantidad de agua siempre en primer orden de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Se recomienda realizar las aplicaciones al observar los primeros indicios de presencia de la plaga. Procure que el producto tenga contacto con los insectos inmaduros o adultos presentes; asimismo que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de los sitios donde se localizan los plagas. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. **BIO-DIE®** puede aplicarse durante la floración y durante la fructificación. **Contraindicaciones:** no use el producto de forma diferente a lo recomendado en esta etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva. **BIO-DIE®** no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. **Incompatibilidad:** no mezcle **BIO-DIE®** con fungicidas cúpricos, azufrados e hidróxido de calcio. Es compatible con aceites, jabones, extractos vegetales y productos microbianos, todos dentro del rango de pH 6.5 a 7.5. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar, los que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos indicados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA
"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL".

GARANTIA: Ultraquimia Agrícola, S.A. de C.V. garantiza el contenido neto y composición porcentual del producto indicado en esta etiqueta, no se hace responsable si los sellos de los envases han sido rotos o dañados, no otorga garantía alguna ni se hace responsable por el mal uso y manejo durante su almacenamiento, transporte o aplicación.

PRECAUCION