

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado (guantes).
No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Lávese las manos con agua y jabón después de manejar el producto.
“ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”
“NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS”
“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE”
“EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”
CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Mantenga el producto lejos del alcance de los niños, animales domésticos, alimentos o forrajes.
Transporte y almacene en un lugar seguro, ventilado y alejado del calor o fuego directo.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”.

PRIMEROS AUXILIOS

“ALEJE A LA PERSONA DEL AREA”
“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL, LAVASE CON ABUNDANTE AGUA”
En caso de inhalación: traslade a la persona contaminada al aire fresco. Si no respira, suminístrele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca.
En caso de ingestión: De inmediatamente uno o dos vasos con agua e induzca al vómito, tocando suavemente el fondo de la garganta con un dedo u otro objeto sin filo.
No induzca al vómito ni administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
Si ha habido contacto con la Piel: Lave con abundante agua y jabón
Si ha habido contacto con los Ojos: Enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 10 minutos.
Obtenga atención médica en todos los casos.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

GRUPO QUIMICO: Avermectinas (lactona macrocíclica) producto derivado de la fermentación natural del hongo Streptomyces avermiltis.
SINTOMAS Y EFECTOS DE INTOXICACIÓN: Los primeros síntomas de intoxicación que se presentan son la dilatación de las pupilas, falta de coordinación y convulsiones.
ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico. Use tratamiento sintomático.

Tratamiento: La intoxicación seguida por la ingestión del producto, puede ser minimizada induciendo el vómito dentro de los 30 primeros minutos después de la exposición. Si la toxicidad progresa hasta causar vómito severo, debe evaluarse el grado de desequilibrio electrolítico apropiado, junto con otras medidas de soporte (mantenimiento de la presión arterial), como lo indiquen los signos, síntomas y demás mediciones clínicas. En casos severos, se debe continuar observando al paciente por varios días, hasta que la condición clínica sea estable y normal. Debido a que la Abamectina aumenta la actividad del ácido gamma aminobutírico en animales, es prudente evitar drogas que aumenten la actividad de esta sustancia (barbitúricos, benzodiazepinas, ácido valprórico). En pacientes con una toxicidad potencial por exposición a la Abamectina.

“EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

GARANTÍA

ALLISTER DE MEXICO S.A. de C.V. garantiza que dicho producto esta compuesto por los ingredientes que se especifican. No acepta responsabilidad alguna por daños a personas o daños a la propiedad ajena que pudieran resultar de su uso si no se cumple de acuerdo a las instrucciones

INTRUCCIONES DE USO

INFORMACION GENERAL

Este producto se utiliza en aplicaciones únicas o bien como parte de un programa de control integral. El programa debe incluir medidas sanitarias, entre ellas la protección de las reservas alimenticias, eliminación adecuada de la basura y la reparación de daños estructurales como grietas y hendiduras para evitar que las plagas encuentren sitios de refugio.

Antes de iniciar con el tratamiento de Antex Gel®, se recomienda realizar una buena inspección previa al tratamiento para evaluar el grado de infección, si después de aplicar y realizar una evaluación el gel ha sido consumido en su totalidad, pero las cucarachas y hormigas están todavía presentes habrá que reemplazar los cebos y si el gel está presente sin haber sido consumido la infestación está eliminada o bien es necesario elegir nuevos sitios de cebado.

Antex Gel® es fácil de manejar. No requiere de preparación previa ni uso de aspersores. Para la aplicación es necesario retirar el tapón que cubre la boquilla de la jeringa, presione ligeramente el embolo depositando pequeñas porciones o tiras en los lugares de refugio y fuentes de alimentación de estas.

No es necesario esperar para entrar a los lugares tratados ya que la aplicación de Antex Gel® se realiza en forma selectiva, sin preparación previa ni uso de aspersores evitando el desprendimiento de olores y vapores.

COMPOSICION PORCENTUAL		
Ingrediente Activo:		% en peso
Abamectina: (Avermectina)		
Mezcla de avermectinas B1 conteniendo no menos del 80% de avermectina B1a y no más del 20% de avermectina B1b		
CONTENIDO NOMINAL		0.05 %
(Ecuivalente a 0.5 g de i.a./kg de formulación a 20°C)		
Ingredientes Inertes:		
Diluyentes y Dispersantes.....		99.95 %
TOTAL :		100.00%
No. de registro: RSCO-DOM-INAC-174-301-092-0-050		
Formulado (por maquila) y Distribuido por:		
Allister de México S.A de C.V		
Circunvalación Sur No.5 C.P-45070		
Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco		
Tel. (33)31 33 98 00		

PLAGAS	DOSIS	LUGARES DE APLICACION
Hormigas:		
Faraona (<i>Monomorium pharaonis</i>)		
Argentina (<i>Iridomyrmex humilis</i>)		
Pequeña negra (<i>Monomorium minimum</i>)		
Carpintera (<i>Crematogaster</i> sp)		
Domestica olorosa (<i>Tapinoma sessile</i>)		
	Gotas de 1.0 -1.5 cm de diámetro colocados en forma horizontal donde transitan las hormigas.	En casas habitación, debajo y detrás de equipos eléctricos tales como refrigeradores, motores, hornos y alacenas, cuidando que estén FUERA DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel

PRECAUCION

HECHO EN MEXICO

ALLISTER



7 503007 072382



Control total de la colonia



HORMIGUICIDA
antex[®]gel



antex[®]gel
HORMIGUICIDA

INSECTICIDA GEL
“USO DOMESTICO”
Cont. 30g
Neto

“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PARA COLOCAR EL GEL
INCLUYE 9 ESTACIONES

Controla Asquelines



Control total de la colonia
antex[®]gel
HORMIGUICIDA

antex[®]gel
HORMIGUICIDA



HORMIGUICIDA
antex[®]gel

"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

antex[®]gel

HORMIGUICIDA

Abamectina
Insecticida gel
"USO DOMÉSTICO"

COMPOSICION PORCENTUAL

Ingrediente Activo:	% en peso
Abamectina: (Avermectina)	
Mezcla de avermectinas B1 conteniendo no menos del 80% de avermectina B1a y no más del 20% de avermectina B1b	
CONTENIDO NOMINAL.....	0.05 %
(Ecuivalente a 0.5 g de i.a./kg de formulación a 20°C)	
Ingredientes inertes:	
Diluyentes y Dispersantes.....	99.95 %
TOTAL :	100.00%

No. de registro: RSCO-DOM-INAC-174-301-092-0-050

No. de lote:

Formulado (por maquila) y Distribuido por:
Allister de México S.A de C.V
Circunvalación Sur No.5 C.P.45070
Col. Las fuentes; Zapopan, Jalisco
Tel. (33)31 33 98 00

Fecha de Caducidad:

2 años a partir de su elaboración.

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
PRECAUCION

HECHO EN MÉXICO

P R E C A U C I O N

