

DE - RATIMOR BRODIFACOUM FRESH BAIT

Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen.

GEBRUCHSANWEISUNG:

Innenbereich (Hausmaus (*Mus musculus*), Wanderratte (*Rattus norvegicus*), Haus- oder Dachratte (*Rattus rattus*)):

Mäuse: Für Mäuse, bis zu 20g Köder pro Köderstation. Stellen die Köderstationen in einem Abstand von 5m auf und reduzieren bei starker Befall auf 2m. Pulsbeköderung: Für Mäuse, bis zu 20g Köder pro Köderstation. Stellen die Köderstationen in einem Abstand von 5m auf und reduzieren bei starker Befall auf 2m.

Die Köderstationen zu Beginn der Behandlung mindestens alle 2 bis 3 Tage und danach mindestens wöchentlich kontrollieren, um zu überprüfen, ob der Köder angenommen wird und die Köderstationen intakt sind, und um die toten Nagetiere im Anwendungsbereich zu entfernen. Bei Bedarf Köder nachfüllen.

Ratten: Für Ratten, bis zu 60g Köder pro Köderstation. Stellen die Köderstationen in einem Abstand von 10m auf und reduzieren bei starker Befall auf 5m. Pulsbeköderung: Für Ratten, bis zu 60g Köder pro Köderstation. Stellen die Köderstationen in einem Abstand von 10m auf und reduzieren bei starker Befall auf 5m.

Die Köderstationen zu Beginn der Behandlung mindestens alle 5 bis 7 Tage und danach mindestens wöchentlich kontrollieren, um zu überprüfen, ob der Köder angenommen wird und die Köderstationen intakt sind, und um die toten Nagetiere im Anwendungsbereich zu entfernen. Bei Bedarf Köder nachfüllen.

Anwendungsmethode: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind.

FR - RATIMOR BRODIFACOUM FRESH BAIT

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

MODE D'EMPLOI :

Intérieur (souris domestique (*Mus musculus*), rat brun (*Rattus norvegicus*), rat noir ou rat des greniers (*Rattus rattus*)) :

Souris : Pour les infestations de souris, utiliser jusqu'à 20g d'appât par postes d'appâtage. Placer les postes d'appâtage à 5m l'un de l'autre et réduire à 2m dans le cas d'infestation élevée. Pour l'appâtage pulsé : Pour les infestations de souris, utiliser jusqu'à 20g d'appât par postes d'appâtage. Placer les postes d'appâtage à 5m l'un de l'autre et réduire à 2m dans le cas d'infestation élevée.

Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Rats : Pour les infestations de rats, utiliser jusqu'à 60g d'appât par postes d'appâtage. Placer les postes d'appâtage à 10m l'un de l'autre et réduire à 5m dans le cas d'infestation élevée. Pour l'appâtage pulsé : Pour les infestations de rats, utiliser jusqu'à 60g d'appât par postes d'appâtage. Placer les postes d'appâtage à 10m l'un de l'autre et réduire à 5m dans le cas d'infestation élevée.

Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 5 à 7 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Méthode d'application : Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Points d'appâts couverts et protégés.

Hersteller und Zulassungsinhaber /
Fabrikant en vergunninghouder /
Fabricant et titulaire de l'autorisation :
UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika,
Slovenien / Slovenije / Slovenie,
+386 175 58 152, unichem@unichem.si,
www.unichem.si

Händler /
Distributeur /
Distributeur :
KILLGERM BENELUX N.V.
Koeybleuken 12, 2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14 442272, Fax: +32 (0)14 479348
www.killgerm.com

RATIMOR®

BRODIFACOUM

0,029 g/kg

Fresh bait
10 g

ENTHÄLT
EINEN
SPEZIELLEN
AROMASTOFF



5 kg

NL - RATIMOR BRODIFACOUM FRESH BAIT

Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

GEbruiksaanwijzing:

Binnen (Huismuus (*Mus musculus*), Bruine rat (*Rattus norvegicus*), Zwarte of dakrat (*Rattus rattus*)):

Muizen: Voor bestrijding van muizen gebruik lokaasdozen tot 20g. Plaats lokaasdozen 5m uit elkaar, verminderen tot 2m bij grote plaag.

Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokaasdozen intact zijn en om oude knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.

Ratten: Voor bestrijding van ratten gebruik lokaasdozen tot 60g. Plaats lokaasdozen 10m uit elkaar, verminderen tot 5m bij grote plaag.

Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 5 tot 7 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokaasdozen intact zijn en om oude knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.

Toepassingsmethode: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipuleerbare lokaaskisten. Kant-en-klaar lokaas voor gebruik in overdekte en beschermde aaspunten.

DE - Anwendung nur durch berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz.

Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den geltenden nationalen/regionalen Vorschriften entsorgen zuführen.

Enthält den Wirkstoff: Brodifacoum 0,029 % (CAS Nr.: 56073-10-0)

Registernummer: BE2019-0061

Enthält: 5 kg

Herstellungsdatum, Ablaufdatum und Seriennummer: Auf der Packung aufgedruckt.

FR - À l'usage des professionnels ayant des compétences avancées démontrées.

Risque présumé d'effets graves pour les organes (le sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Consulter un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations nationales/régionales applicables.

Contient le principe actif : Brodifacoum 0,029 % (N° CAS : 56073-10-0)

Numéro d'enregistrement : BE2019-0061

Contient : 5 kg

Date de production, date d'expiration et numéro de série : Imprimé sur l'emballage.

NL - Enkel voor professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid.

Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijn de nationale/regionale voorschriften.

Bevat de werkzame stof: Brodifacoum 0,029 % (CAS no.: 56073-10-0)

Registratienummer: BE2019-0061

Bevat: 5 kg

Productiedatum, geldigheidsdatum en

serienummer: Afgedrukt op de verpakking.

ACHTUNG
WAARSCHUWING
ATTENTION



33843

