

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto"
- "No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes"
- "Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos"
- "Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos"
- "No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado"
- "No almacenar en casas habitación"
- "No destape las boquillas con la boca"
- "Los menores de 18 años no deben manejar este producto"
- "No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado"
- "Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia"
- "No se frote, inhale y evite el contacto con los ojos"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgalo abrigado. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona esta consciente, no provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca, llame al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: ORGANOFSFORADO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Leves: dolor de cabeza, náuseas, visión borrosa y debilidad. Agudos: Dificultad respiratoria, calambres abdominales, vómito, diarrea y temblores.

TRATAMIENTO: En adultos suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg de atropina. La terapia en niños debe supervisarla un médico. En casos severos administrar 1-5 mg de atropina vía IV cada 5 a 15 min hasta alcanzar atropinización. No hay antídoto específico, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anti-convulsivos o los del grupo del Diazepam. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- "Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos"
- "Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARAT"
- "El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (Arenosos)."
- "En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (Por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas cercano"
- "Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla de aplicación"

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).



**Insecticida organofosforado
SUSPENSIÓN ACIOSA CON MICROCAPSULAS
Composición Porcentual**

Ingrediente activo:
Clorpirifos etil: 0,0-dietil 0-(3,5,6-tricloro-2-piridinil)fosforotato
(Equivalente a 250 g de i.a. / L a 25°C)

P/P
No menos de:.....22.70 %

Ingredientes inertes:
Co-solventes, estabilizador de luz ultravioleta, cubierta de capsula, agentes humectante y de suspensión y solvente.

No más de:.....77.30 %

Total:..... 100.00%

RSC0-URB-INAC-115-301-368-23

Contenido Neto: 1 L



HECHO EN MÉXICO

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:
QUIMIX, S.A. DE C.V.

Av. Central 206 2ºiso,
Col. San Pedro de los Pinos
México D.F. C.P. 01180
Tel.: (0155) 5278 4680

MANUFACTURADO EN MÉXICO, S.A. DE C.V.
Paseo de la Reforma 100, 1º Piso, Industrial
Ciudad de México, Tel. 5278 4680



Lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CLORCAP 25 CS: Es un producto para el control de plagas, que emplea la tecnología más novedosa y avanzada de microencapsulado que contiene el ingrediente activo clorpirifos. Se usa para el control de insectos domésticos y de salud pública, en oficinas, hoteles, restaurantes y zonas colindantes a los mismos. Como suspensión de microcapsulas de tamaño uniforme, poseen una estructura exacta de la cobertura en cuanto a grosor y flexibilidad, lo que permite una liberación continua y prolongada del ingrediente activo. Las microcapsulas penetran en lugares de difícil acceso, donde residen los insectos proporcionando un buen control y evitando la necesidad de nuevos tratamientos. Es inodoro y no mancha el suelo, los muebles o el tapizado.

Plaga	Dosis	Forma de Aplicación y Frecuencia
Cucaracha alemana (Blattella germanica) Cucaracha oriental (Blattella orientalis) Cucaracha americana (Periplaneta americana)	10 ml de CLORCAP 25 SC en 1 L de agua	Tratamiento localizado. El número de aplicaciones depende del grado de infestación. Se recomienda hacer una nueva aplicación preventiva en 6 meses.
Formigas (Lasius niger, Solenopsis spp., Monomorium pharaonis)	10 ml de CLORCAP 25 SC en 1 L de agua	Tratamiento localizado. El número de aplicaciones depende del grado de infestación. Se recomienda hacer una segunda aplicación en 2 semanas.
Pulga de la Peste (Xenopsylla cheopis) Piolo de la cabeza (Pediculus humanus capitis)	10 ml de CLORCAP 25 SC en 1 L de agua	Tratamiento localizado. El número de aplicaciones depende del grado de infestación. Se recomienda hacer una segunda aplicación en 2 semanas.
Chinche de la cama (Cimex spp)	1 L de CLORCAP 25 SC en 50 L de agua	Tratamiento localizado. El número de aplicaciones depende del grado de infestación. Se recomienda hacer una segunda aplicación preventiva en 1 año.
Termita subterránea (Reticulitermes spp., Zootermopsis spp., Heterotermopsis spp., Capritermes spp)	10 ml de CLORCAP 25 SC en 1 L de agua	Tratamiento localizado y en las inmediaciones. El número de aplicaciones depende del grado de infestación. Se recomienda hacer una segunda aplicación preventiva en 2 semanas.
Grillo (Acheta domestica), Mosquito del Paludismo (Anopheles spp), Mosquito del dengue (Aedes spp), Mosquito común (Culex spp), Arañas (Latrodectus spp)		

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Adicione la mitad del total de agua que se utilizará en la elaboración de la mezcla al tanque del equipo, agregue la cantidad indicada de CLORCAP 25 CS e inmediatamente cierre el tanque y agite vigorosamente durante 5 - 10 segundos, después adicione lentamente la otra mitad de agua. No se use equipo de aplicación que formen nubes de aspersión.

TIEMPO DE REENTRADA: Una de las ventajas de este producto es que no contiene solventes volátiles, por lo que el tiempo de reentrada después de la aplicación en todos los casos es una hora a partir de aplicado el producto.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Tratamiento localizado. El número de aplicaciones depende del grado de infestación. Se recomienda hacer una nueva aplicación preventiva en 6 meses para cucarachas, en 2 semanas para hormigas, pulgas, piojos, chinches, grillos, mosquitos y arañas, y en 1 año para termitas y escarabajos de la madera.

CONTRAINDICACIONES: No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales.



PELIGRO

