“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado para el uso de insecticidas al momento de la aplicación: Mascarilla contra polvos, lentes industriales, anteojos de seguridad, guantes impermeables, overol de mangas largas, botas de hule, y gorra o sombrero. La ropa y calzado deberán destinarse a este único fin. No permita que el líquido concentrado caiga sobre la piel. Si observa malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Descontamine el equipo de envasado o formulación lavándola con detergente o una solución alcalina. Evite contaminación de alimentos y piensos. Retire a sus mascotas y aves y cubra sus peceras antes de realizar la aplicación. El producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel. Para aplicaciones en interiores en ULV o en Termonebulizacion, se recomienda cerrar la instalación, objeto del tratamiento; tapa o retirar utensilios y producto en proceso, en el momento de la aplicación. Es necesario cubicar el espacio a tratar y calibrar el equipo, con el objeto de asegurar la dosis recomendada. Cubra o retire los alimentos y las superficies de contacto de los alimentos antes de volver a usarlas. Después de tratar panaderías, plantas empacadoras de carnes, plantas de procesado de alimentos, etc. Todos los bancos, estanterías, equipos, etc. que entre en contacto con la comida deben ser lavados con un producto limpiador efectivo seguido de un enjuague con agua potable.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“No coma beba o fume cuando esté utilizando este producto”
“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”
“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”
“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”
“No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado”
“No almacenar en casas habitación”
“No destape las boquillas con la boca”
“Los menores de 18 años no deben manejar este producto”
“No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes un trozo de madera u otro material apropiado”
“Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”
“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos”
“No se aplica contra el viento.
“Cámbiese la ropa y procédase a su lavado antes de emplearla nuevamente.
“Lave bien todas las superficies de proceso antes de reusarlas.
“Saque mascotas, pájaros y cubra peceras antes del tratamiento.
“Evítese su aplicación cerca de flamas abiertas, superficies calientes o equipos eléctricos no protegidos.
“No se use en equipo eléctrico conectado.”
“No reutilice este envase, destrúyase”.

“EN CASO DE CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta al médico. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos durante 15 minutos con agua limpia. Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada. Si se ingiere el producto y la persona esta consiente no provoque el vómito a menos que se lo indique el médico esto para evitar neumonía respiratoria. Si la persona esta inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de inhalación traslade a la persona a un sitio con aire fresco. Si la persona no respira, llame al médico posteriormente administre respiración artificial y si es posible preferiblemente boca a boca llame a un médico para obtener asesoramiento médico adicional.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Grupo químico de la Pirenona 1-23 N: Piretrinas (Pyrethrum). La cantidad máxima para exposición recomendada de la Pirenona 1-23 N es de 2 a 3 g/m3. El producto contiene destilado del petróleo. No hay antídoto específico conocido. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. Los antihistamínicos son muy útiles. Si hay alteraciones nerviosas se recomienda usar fenobarbital. Para efectos en la piel, un agente muy eficiente terapéutico para expuestos a piretrinas es una aplicación tópica de tocoferol acetato (Vitamina E). El vómito puede causar neumonía por aspiración. Síntomas de intoxicación: irritación estomacal, náuseas, calambres y vómito. La ingestión de grandes cantidades puede causar desordenes del sistema nervioso tales como la fatiga, mareos, dolor de cabeza, falta de concentración fasciculaciones e inconsciencia. En contacto con los ojos puede causar irritación temporal, lagrimeo y visión borrosa. En contacto con la piel puede causar sensación de quemazón sobre las zonas más sensibles como la cara, ojos y boca. Una

piel, por inhalación puede causar irritación nasal y respiratoria.

MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas registrado ante la SEMARNAT”. El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea el agua subterránea, evite manejarlo cerca de los pozos de agua y no aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos) En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), colectar los deshechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano” Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces e invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares). Este producto es altamente toxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas estén en flor y cuando las abejas se encuentran libando.SIGNOS Y SINTOMAS DE INTOXICACION: Por inhalación prolongada puede provocar irritación en las vías respiratorias. Por ingestión puede provocar malestar estomacal.
En contacto con la piel y ojos puede provocar una leve irritación

GARANTIA DEL PRODUCTO FABRICANTE

Trebol Comercio Internacional, S.A. de C. V. Garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable, expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo, transporte, almacenamiento y uso de este producto está fuera de nuestro control.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar la Pirenona 1-23 N directamente sobre alimentos o bebidas. No aplique este producto mientras se esté procesando alimentos o en presencia de éstos.

Sólo personas capacitadas o debidamente entrenadas específicamente para el manejo de este producto deberán manejarlo; para poder garantizar la protección adecuada a la población.

“APLICACIÓN URBANA”

PIRENONA 1-23 N

piretrinas al 1 %
Insecticida líquido-ULV

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	**% en peso**
Ingrediente activo:	
Piretrinas: (Z)-(S)-2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil) ciclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropancarboxilato (Equivalente 8.12 g / l a 20°C).....	1.00%
Ingredientes inertes:	
Coadyuvantes, Sinergistas y Solvente.....	99.00%
	Total 100.00%

Registro Sanitario No. RSCO-URB-INAC-185-321-304-01

Contenido neto: 1Lt.☐

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

Titular del Registro:
TREBOL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Sonora No. 55, Col. Héroes de Padierna,
Delegación M. Contreras 10700, Ciudad de México
Tel: (55) 5652-3878
www.tcimexico.com.mx

Número de lote:

Fecha de fabricación: (aa/mm/dd):

Fecha de caducidad:
2 años a partir de su fabricación.

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Este producto ha sido diseñado para utilizarse directamente tal y como viene, sin dilución alguna, en equipo de nociados mecánicos capaces de producir partículas de aerosol finas. Pirenona 1-23 N también puede ser diluida en keroseno y aplicado con equipos de nebulización que produzcan partículas mayores que el aerosol. También diluido, puede ser utilizado como insecticida de contacto para tratar insectos rastreros en superficies tal y como se explica más adelante en esta etiqueta.

APLICACIÓN: Mantenga el lugar tratado cerrado el tiempo necesario y después ventile perfectamente antes de volver a entrar.

APLICACIÓN EN LAS PLAGAS A CONTROLAR Y MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO:

EN INTERIORES – SIN DILUIR

PARA USO EN HOGARES, RESTAURANTES, PLANTAS DE PROCESADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS ÁREAS

Ultra bajo volumen y spray de superficies: Usar Pirenona 1-23 N en generadores de aerosol para el control de diversas etapas de desarrollo visibles y expuestas de: moscas (Diptera), incluyendo la mosca de la fruta (Drosophila spp.), escarabajo confuso de la harina (Tribolium confusum), escarabajo rojo de la harina (Tribolium castaneum), escarabajo de tabaco (Lasioderma sericorne), escarabajo de dientes serrado del grano (Oryzaephilus surinamensis): Retire o cubra los alimentos expuestos o las superficies donde se manipulen alimentos. Cierre la habitación y apague el aire acondicionado o equipo de ventilación. Aplique a un radio de 15 ml fluida de Pirenona 1-23 N por cada 28 metros cúbicos (0.52-1.04 ml/m3) de espacio. Dirija la aplicación hacia el techo y las esquinas superiores del área y detrás de los objetos presentes. Desaloje al personal y mantenga el área cerrada durante un lapso mínimo de 30 minutos después del tratamiento. Ventile el área de permitir el paso del personal. Repita el tratamiento si es necesario. No aplique este producto sin dilución en plantas operadas bajo la USDA de came, aves de corral y huevos.

ROCIO DE SUPERFICIES: Para eliminar cucarachas (Blattaria), escarabajos (Coleoptera), tijeras (Dermaptera), pescadito de plata (Lepisma), Hormigas (Formicidae), grillos (Gryllidae), arañas (Araneae), utilice un generador de niebla mecánico o un equipo de nebulización. Dirija el rocío primero a las grietas y hendiduras, detrás de los equipos, armarios, paredes, suelos, debajo de los fregaderos, para obtener máxima penetración e impregnación de insectos. Contactando tantos insectos como le sea posible con la solución, No permita que el rocío entre en contacto con la comida almacenada. A continuación, use como rocío de espacios. Aplique a un radio de 89 ml fluidas de Pirenona 1-23 N por cada 28 metros cúbicos (3.12ml/m3). Desaloje el área tratada y deje la habitación cerrada por 30 minutos. Ventilar bien antes de reingresar en la habitación. No aplique este producto sin dilución en plantas operadas bajo USDA de came, aves de corral y huevos.
Nota: En caso de que sea necesario tratar áreas como conductos, motores eléctricos, juntas y cajas eléctricas, apague los equipos eléctricos antes de la aplicación. Tras la aplicación, deje pasar un tiempo para que el aceite se disipe antes de prender el motor o llevar el interruptor a la posición de encendido (“ON”).

TRATAMIENTO DE SITIOS DE ALMACENAMIENTO: En zonas de almacén de alimentos empacados en sacos de múltiples paredes, sacos de tela u otro tipo de empacado, para el control de insectos como las hormigas (Formicidae), escarabajo grande de los granos (Prostephanus truncatus), escarabajos de tabaco (Lasioderma sericorne), gorgojo americano de la harina (Tribolium Confusum), ácaros, escarabajo del pan (Stegobium paniceum), escarabajo grano plano (Cryptolesteles pusillus), gorgojo de los granos (Sitophilus granarius), gusano barrenador menor de los granos (Rhyzopertha dominica), gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), escarabajo comerciante del grano (Oryzaephilus mercator), gorgojo de la harina (Tribolium Castaneum), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), escarabajos rojizos de granos (Cryptolestes ferrugineus), gorgojo de cuello cuadrado (Cathartus quadricollis). Los productos almacenados infestados deben ser destruidos, fumigados o tratados mediante otros métodos efectivos usando un producto aprobado para estos fines. Dirija el rocío primero a las grietas y hendiduras, las esquinas, pallets, y alrededor de las pilas de sacos contactando tantos insectos como le sea posible con la solución. No permita que el rocío entre en contacto con la comida almacenada. A continuación, use como rocío de espacios. Aplique a un radio de 45 ml fluida de Pirenona 1-23 N por cada 28 metros cúbicos (1.56ml/m3). Desaloje el área tratada y deje la habitación cerrada por 30 minutos. Ventilar bien antes de reingresar en la habitación.

CONTROL DE PLAGAS EN PRODUCTOS ALMACENADOS: Para el control de plagas de productos almacenados, como la palomilla de almacén (Ephestia elutella), palomilla de los cereales (Sitotroga cerealella), ácaros, hormigas (Formicidae), escarabajo grande de los granos (Prostephanus truncatus), escarabajo del tabaco (Lasioderma sericorne), gorgojo americano de la harina (Tribolium Confusum) escarabajo del pan (Stegobium paniceum), escarabajo grano plano (Cryptolesteles pusillus), gorgojo de los granos (Sitophili us granarius), gusano barrenador menor de los granos (Rhyzopertha dominica), gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), palomilla de la madera (Hylotrupes bajulus), escarabajo comerciante del grano (Oryzaephilus mercator), gorgojo de la harina (Tribolium Castaneum), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), escarabajo rojizos de granos (Cryptolestes ferrugineus), gorgojo de cuello cuadrado (Cathartus quadricollis), aplique Pirenona 1-23 N por atomización difusa sobre la capa superficial del producto almacenado o empacado. Trate también paredes, suelo y otras superficies, zonas de almacenamiento y manipulación, prestando especial atención en tratar huecos, hendiduras y lugares similares donde los insectos puedan esconderse. A continuación use como rocío de espacios. Aplique a un radio de 45 ml fluidas de Pirenona 1-23 N por cada 28 metros cúbicos (1.56ml/m3. Desaloje el área tratada y deje la habitación cerrada por 30 minutos. Ventilar bien antes de reingresar en la habitación.

ROCÍO DE CONTACTO Y ROCÍO DE SUPERFICIE – SIN DILUIR – Para matar cucarachas: Utilizando un equipo de ultra bajo volumen adecuado, inyecte el rocío directamente en huecos y hendiduras hasta llenar las paredes por completo, equipos y otras pequeñas estructuras huecas. Mantenga la ventilación o el equipo de aire acondicionado encendidos durante la aplicación. Con excepción de hospitales, puede regresar a la habitación inmediatamente después de la aplicación.

EN DILUCIÓN: Use un aceite mineral que cumpla con la regulación 21 CFR 178.3620 (b) o un hidrocarburo del petróleo ligero desodorizado que cumpla con la regulación 21 CFR172.882 o 40 CFR 180.100 (c) y (c) y aplicarlo con equipos de nebulización que produzcan partículas mayores que el aerosol. También puede ser diluido en keroseno para ser utilizado como insecticida de contacto para tratar insectos rastreros en superficies tal como se explica más adelante en esta etiqueta.

% Activo deseado	Proporción de la mezcla		Dosis de aplicación 28 m^3	Dosis de aplicación m^3
	Concentrado	Solvente		
0,50	1 parte	2 parte	30 ml	56 m^3
0.30	1 parte	2 parte	30-60 ml	84 m^3
0.10	1 parte	2 parte	30-60 ml	280 m^3

ROCÍO DE ESPACIO: Para uso en máquinas de nebulización en frío, Termonebulizadoras, o equipos de aspersión, para el control de diversas etapas de desarrollo visibles y expuestas de: hormigas (Formicidae), ácaros, escarabajo grande de los granos (Prostephanus truncatus), escarabajo del tabaco (Lasioderma sericorne), gorgojo americano de la harina (Tribolium confusum), escarabajo del pan (Stegobium paniceum), escarabajo de granos plano (Cryptolestes pusillus), gorgojo de los granos(Sitophilus granarius), gusano barrenador menor de los granos (Rhyzopertha dominica), gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), escarabajo rojizos de granos (Cryptolestes ferrugineus), gorgojo de la harina (Tribolium Castaneum), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), escarabajos rojizos de granos (Cryptolestes ferrugineus), gorgojo de cuello cuadrado (Cathartus quadricollis), escarabajo confuso de la harina(Tribolium confusum), escarabajo rojo de la harina (Tribolium castaneum), escarabajo del tabaco (Lasioderma sericorne), escarabajo de dientes serrado del grano(Oryzaephilus surinamensis), moscas (Diptera) moscas de fruta (Drosophila spp.), mosquitos (Culicidae), Gnats (Nematocera) (Versión de mosquito en inglés), Psocidos. Retire o cubra los alimentos expuestos o las superficies donde se manipulen alimentos. Cierre la habitación y apague el aire acondicionado o equipo de ventilación. Diluya la Pirenona 1-23 N con un aceite mineral blanco adecuado o un hidrocarburo de petróleo ligero inodoro a un radio de 1 parte de Pirenona 1-23 N por cada 9 partes de aceite y mezcle bien. Aplicar la solución resultante a un radio de 60 ml por cada 28 metros cúbicos de espacio, llenando la habitación con niebla. Desaloje el área tratada y ventile bien antes de reingresar.

ROCIO DE CONTACTO Diluido para uso en equipos que generan partículas suficientemente grandes para mojar cucarachas y otros estados accesibles de Insectos de granos: Cubra o retire los alimentos expuestos y cierre la habitación como fue descrito anteriormente. Diluya Pirenona 1-23 N en aceite a un ratio de 1 parte de concentrado por cada 9 partes de aceite. Rocíe el exterior de las bandejas de granos, los suelos, paredes, detrás de armarios y estanterías, alrededor de tuberías y otros lugares donde puedan refugiarse los insectos usando 1 Lt por cada 25 metros cuadrados. Dirija el rocío a todas las grietas y hendiduras.

ALMACENES: Para uso en sacos de múltiples paredes o sacos de tela) en molinos de harina, elevadores de granos, almacenes de grano, para el control de palomilla de los granos (Sitotroga cerealella), cadelles (ESCARABAJO: Tenebroides mauritanicus), acaro del queso (Tyrolichus casei), escarabajo del tabaco(Lasioderma sericorne), escarabajo confuso de la harina (Tribolium confusum), gusano oscuro de los alimentos [Tenebrio obscurus), ácaro del grano (Acarus siro), palomilla india de los alimentos (Plodia interpunctella), escarabajo rojo de la harina (Tribolium Casteneum), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), escarabajo de dientes serrados el grano (Oryzaephilus surinamensis), gusano amarillo de los alimentos (Tenebrio molitor) Retire y destruya productos infestados. Retire y destruya los productos infestados. Diluya Pirenona 1-23 N en aceite a un ratio de 1 parte de concentrado por cada 9 partes de aceite. Aplique el producto dirigiendo el rocío hacia las esquinas, debajo de los pallets y alrededor de las pilas de alimentos empacados tratando de contactar tantos insectos como le sea posible y a continuación use como rocío de espacio. Los productos almacenados infestados deben ser tratados mediante otros métodos efectivos usando un producto aprobado para tales fines. Use una dosis de 30 ml por cada 28 metros cúbicos de espacio. No permanezca en las áreas tratadas y ventile el área antes de reingresar. Barrer y deshacerse de los insectos muertos.

PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS: Diluya una parte de Pirenona 1-23 N por cada parte de aceite (keroseno refinado) y use con un equipo de rociado de ultra bajo volumen a un ratio de 100 ml por cada 28 metros cúbicos de espacio. Aplique el rocío en todas las grietas y hendiduras en madera, paredes, suelos, debajo de los fregaderos, detrás de tuberías y en todos los lugares que puedan servir de cobijo para los insectos. Contacte tantos insectos como le sea posible con la solución. Repita como sea necesario para el control de estados accesibles de hormigas (Formicidae), tijeretas (Dermaptera), moscas (Diptera), mosca de la fruta (Drosophila spp.), gnats (Nematocera) (Versión de mosquito en inglés), mosquitos (Culicidae), pescadito de la plata (Lepisma), palomitas, arañas (Araneae) y bicho del agua (Heteroptera). Antes de rociar, retire o cubra los alimentos almacenados expuestos y los materiales de empacado. Una vez realizada la aplicación, los equipos y utensilios deben ser lavados con un producto limpiador efectivo y enjuagado con agua potable antes de usar las instalaciones. Use como un rocío de espacio únicamente cuando la planta no se encuentre en funcionamiento.

USO EN EXTERIORES

NEBULIZACIÓN EN EQUIPOS EN TIERRA: Use este método de aplicación para matar moscas (Diptera), mosquitos (Drosophila spp.) y gnats (Nematocera) (Versión de mosquito en inglés) en espacios abiertos cerca de edificaciones y en zonas de acampada. Realice la aplicación preferentemente en horas cuando la temperatura sea fresca (24°C o menor) y la velocidad del viento es menor de 9 Km/Hr.

NEBULIZACIÓN EN EQUIPOS PORTABLES DE MANO: Aplique a un ratio de 292.3 mililitros por hectárea. Observe el recorrido de la aplicación y trate de conseguir una franja de aplicación de unos 15 metros de ancho. Permita que el rocío penetre en follajes espesos. Repita la aplicación en función de las necesidades para el control.

EQUIPOS DE APLICACIÓN EN CAMIONES: Rocíe a un ratio de 444 mililitro por minuto desde una posición a contraviento en relación al área a tratar. Mantenga la velocidad del vehículo a 8 Km/Hr aproximadamente. Observe el recorrido de la aplicación y trate de conseguir una franja de aplicación de unos 91 metros de ancho.

USOS

VOLADORES: Para control de sitios expuestos y accesibles de moscas, mosquitos de fruta, mosquitos, avispas, pequeñas mariposas , aplique el producto como tal y deje el cuarto cerrado durante media hora.

RASTREROS: Para matar hormigas, grillos, arañas, pescaditos de plata y tijerillas en construcciones aplique el producto en todas las rajaduras, grietas, en madera, paredes, pisos, bajo los lavabos y detrás de la tubería y en cualquier parte que pueda servir de resguardo a los insectos.
Las Pirenonas están diseñadas específicamente para el control de insectos en áreas críticas en las siguientes

INDUSTRIAS: ALIMENTICIA, HOTELERA, RESTAURANTERA, HOSPITALARIA Y ESCUELAS.

Para alimentos almacenados o en proceso, en molinos, elevadores de granos, graneros, cuartos de almacenaje y bodegas. Remueva y destruya los productos infestados, diluya las aplicaciones a las esquinas bajo las tarimas y alrededor de las estibas de los productos.

PRECAUCIÓN