

Brucharten

Es gibt verschiedene Arten von Brüchen, die je nach Zähler und Nenner unterschiedlich bezeichnet werden.

1. Echter Bruch:

- Ein Bruch, bei dem der Zähler kleiner als der Nenner ist.
- Beispiel: $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$
- Wert ist kleiner als 1.

2. Unechter Bruch:

- Ein Bruch, bei dem der Zähler größer oder gleich dem Nenner ist.
- Beispiel: $\frac{5}{4}$ $\frac{7}{3}$
- Wert ist größer oder gleich 1.

3. Gemischte Zahl:

- Besteht aus einer ganzen Zahl und einem echten Bruch.
- Beispiel: $1\frac{1}{2}$ (sprich: "eins einhalb"), $3\frac{2}{3}$

4. Stammbruch:

- Ein Bruch, bei dem der Zähler 1 ist.
- Beispiel: $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$
- Wird auch als "Einheitsbruch" bezeichnet.

5. Dezimalbruch:

- Ein Bruch, der in Dezimalform geschrieben ist.
- Beispiel: 0,5 (entspricht $\frac{1}{2}$), 0,75 (entspricht $\frac{3}{4}$)

Warum verschiedene Brucharten?

Die unterschiedlichen Brucharten helfen dabei, Brüche je nach ihrem Wert und ihrer Darstellung besser zu verstehen und einzuteilen.