
Movecia



WORKBOOK · POSTNATAL · EINHEIT 2

Den Beckenboden neu spüren

Wie sich dein Beckenboden erholt und wie du ihn im Alltag schützt.

DAS NIMMST DU MIT

- Der Beckenboden braucht nach jeder Geburt Zeit und Training, auch nach einem Kaiserschnitt.
- Der Knack: vor Husten, Niesen und Heben den Beckenboden anspannen.
- Urinverlust, Druckgefühl oder Schmerzen nach einigen Wochen: Beckenboden-Physiotherapie.

für .....

IMPULS

Worum es heute ging

Bei der Geburt hat sich dein Beckenboden um ein Vielfaches gedehnt. Danach braucht er Zeit und gezieltes Training, um wieder kräftig zu werden. Das gilt übrigens auch nach einem Kaiserschnitt, denn auch die Schwangerschaft selbst hat ihn neun Monate lang belastet.

Im Alltag kannst du ihn mit ein paar einfachen Gewohnheiten schützen. Du stehst über die Seite auf. Bevor du hustest oder niest, spannst du ihn kurz an, das nennt man den Knack. Und wenn du etwas hebst, dein Baby, die Babyschale oder den Wäschekorb, atmest du aus und hebst erst dann.

Wenn du nach einigen Wochen noch Urin verlierst, Druck nach unten spürst oder Schmerzen beim Sex hast, dann lass dich bitte von einer Beckenboden-Physiotherapeutin untersuchen. Das ist keine Kleinigkeit, und es lässt sich sehr gut behandeln.

Meine Gedanken dazu

DEINE ÜBUNGSABFOLGE

So bewegen wir uns

1

Schnelle Aktivierungen

10 Wiederholungen

Setz dich aufrecht hin. Spann deinen Beckenboden schnell und kräftig an, eine Sekunde lang, und lass dann für zwei Sekunden ganz los. Diese schnellen Fasern brauchst du, wenn du hustest, niest oder lachst.

Das Loslassen ist genauso wichtig wie das Anspannen.

2

Lange Aktivierungen

5 × 5–10 Sekunden

Spann jetzt deinen Beckenboden langsam an, nach innen und oben, und halte die Spannung, während du ruhig weiteratmest. Zähl bis fünf, wenn es geht bis zehn. Dann lass ganz langsam los und ruh dich genauso lange aus.

Nicht die Luft anhalten, ruhig weiteratmen.

3

Schulterbrücke (Glute Bridge)

2 × 10

Leg dich auf den Rücken, die Füße hüftbreit aufgestellt. Mit dem Ausatmen hebst du zuerst den Beckenboden, dann rollst du Wirbel für Wirbel das Becken nach oben. Mit dem Einatmen rollst du wieder ab und lässt den Beckenboden los.

Kräftigt Po, Beckenboden und hintere Beinmuskeln.

4

Clamshell

2 × 12 je Seite

Leg dich auf die Seite, die Knie angewinkelt. Mit dem Ausatmen hebst du den Beckenboden und öffnest das obere Knie, die Füße bleiben zusammen. Mit dem Einatmen schließt du langsam.

Das Becken bleibt dabei ruhig.

Geschafft? ein Kreis pro Durchgang

BREATHWORK

Der Knack



BREATHWORK

Atme mit dem Kreis: ein, wenn er wächst, aus, wenn er sanft kleiner wird.

Wir üben jetzt die wichtigste Gewohnheit für deinen Alltag. Atme ein. Atme aus, spann deinen Beckenboden an und huste dann kurz. Spür, wie der Beckenboden dich hält.

Jetzt das Gleiche mit Heben: Atme ein, atme aus, spann an und heb dabei einen Gegenstand neben dir hoch, zum Beispiel ein Kissen. Zuerst die Spannung, dann die Bewegung. Fünf Mal üben, bis es sich natürlich anfühlt.

MEDITATION

Mitgefühl mit dem eigenen Körper

Leg dich hin und leg eine Hand auf deinen Unterbauch.

Vielleicht bist du gerade ungeduldig mit deinem Körper, vielleicht fühlt er sich fremd an. Das ist in Ordnung. Stell dir vor, deine beste Freundin hätte gerade ein Baby bekommen. Wie würdest du mit ihr sprechen? Genau so freundlich darfst du jetzt mit dir selbst sprechen.

Sag dir in Gedanken: Ich gebe dir Zeit. Ich bin geduldig mit dir. Du machst das gut.

Nimm dir danach einen Moment, bevor du aufstehst.

GUT ZU WISSEN

Gut zu wissen: Dein Beckenboden im Alltag

Dein Beckenboden erholt sich auch außerhalb der Übungsminuten, bei jedem Heben, bei jedem Toilettengang und in jeder Nacht. Hier findest du alles, was ihn im Alltag unterstützt.

Nach der Geburt fühlt sich der Beckenboden für viele Frauen zunächst taub, schwer oder kaum spürbar an. Das ist normal, denn Muskeln, Bindegewebe und Nerven wurden stark gedehnt und brauchen Zeit, um sich zu erholen. Bei den meisten Frauen kommt das Gefühl über die ersten Wochen nach und nach zurück. Mit gezieltem Training und ein paar Gewohnheiten im Alltag unterstützt du diesen Prozess enorm.

GUT ZU WISSEN

Stillen, Hormone und Schleimhäute

Während du stillst, ist dein Östrogenspiegel niedrig. Das kann die Schleimhäute in der Scheide trockener und empfindlicher machen und das Bindegewebe etwas weniger straff. Manche Frauen bemerken deshalb in der Stillzeit leichter Druck nach unten oder Beschwerden beim Sex. Das bessert sich meist, wenn sich der Zyklus wieder einstellt. Ein gutes Gleitgel hilft vielen, und wenn die Trockenheit dich stark stört, kann deine Gynäkologin mit dir über eine lokale Behandlung sprechen.

GUT ZU WISSEN

Druck nach unten am Abend

Viele Frauen spüren in den ersten Monaten abends ein Schweregefühl im Becken, besonders nach einem langen Tag auf den Beinen. Der Beckenboden ist dann einfach müde. Leg dich zwischendurch hin, gern mit einem Kissen unter dem Becken, und verteil schwere Aufgaben über den Tag. Wenn das Gefühl stärker wird, du etwas in der Scheide tasten kannst oder es nach einigen Wochen nicht besser wird, lass dich bitte von einer Beckenboden-Physiotherapeutin untersuchen. Eine Senkung lässt sich gut behandeln, vor allem wenn man früh beginnt.

Gewohnheiten, die deinen Beckenboden schützen

- Geh zur Toilette, wenn du musst, aber nicht ständig vorsorglich. Häufiges Gehen ohne echten Drang gewöhnt die Blase an kleine Mengen.
- Setz dich zum Wasserlassen ganz hin, statt über der Brille zu schweben. Nur im Sitzen kann der Beckenboden völlig loslassen.
- Stell die Füße beim Stuhlgang auf einen kleinen Hocker und atme lang aus, statt zu pressen.
- Trink über den Tag verteilt genug, in der Stillzeit oft etwas mehr als sonst. Zu wenig Flüssigkeit macht den Urin konzentriert und reizt die Blase.
- Spann deinen Beckenboden an, bevor du hustest, niest, die Babyschale hebst oder den Kinderwagen ins Auto lädst.

- Trag dein Baby nah am Körper und wechsle die Seite.

Mein Tipp für dich

Kleb dir einen kleinen farbigen Punkt an Orte, an denen du oft vorbeikommst, an den Wickeltisch, an den Kühlschrank oder ans Lenkrad. Jedes Mal, wenn du ihn siehst, machst du ein paar schnelle Aktivierungen. Nach ein paar Wochen ist das ganz selbstverständlich.

GUT ZU WISSEN

Sex nach der Geburt

Es gibt keinen festen Zeitpunkt, ab dem du wieder Sex haben solltest. Viele Ärztinnen raten, zu warten, bis der Wochenfluss versiegt ist und Geburtsverletzungen verheilt sind. Danach zählt vor allem, ob du dich bereit fühlst. Müdigkeit, ein verändertes Körpergefühl und das viele Körperliche mit dem Baby machen Lust für viele Frauen erst einmal zu einem Randthema, und das ist in Ordnung. Wenn Sex schmerzt, ist das kein Zustand, den du hinnehmen musst. Eine Beckenboden-Physiotherapeutin oder deine Gynäkologin kann dir helfen. Und denk daran, dass du schon vor der ersten Regelblutung wieder schwanger werden kannst.

GUT ZU WISSEN

So findest du eine Beckenboden-Physiotherapeutin

In Österreich bekommst du Physiotherapie mit einer ärztlichen Verordnung, zum Beispiel von deiner Gynäkologin oder Hausärztin. Frag gezielt nach einer Therapeutin mit Weiterbildung im Bereich Beckenboden oder Urogynäkologie. Viele arbeiten als Wahltherapeutinnen, dann bekommst du nach dem Einreichen einen Teil der Kosten von deiner Krankenkasse zurück. Eine gute Beckenboden-Physiotherapeutin untersucht dich behutsam, erklärt dir genau, was sie findet, und stimmt das Training ganz auf dich ab.

Mit diesen Beschwerden lohnt sich eine Beckenboden-Physiotherapie

- [ ] Urinverlust beim Husten, Niesen, Lachen, Heben oder Hüpfen
- [ ] plötzlicher, sehr starker Harndrang, bei dem du es kaum zur Toilette schaffst
- [ ] Schwierigkeiten, Winde oder Stuhl zu halten
- [ ] Druck- oder Fremdkörpergefühl in der Scheide
- [ ] Schmerzen beim Sex, beim Sitzen oder an der Narbe
- [ ] das Gefühl, den Beckenboden gar nicht zu spüren oder nicht loslassen zu können
- [ ] eine Rektusdiastase, die sich nach einigen Monaten nicht verändert

Mein Beckenboden-Tracker

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
10 schnelle Aktivierungen, dreimal am Tag	○	○	○	○	○	○	○
5 lange Aktivierungen, dreimal am Tag	○	○	○	○	○	○	○
Knack vor dem Heben, Husten, Niesen	○	○	○	○	○	○	○
Toilettenhaltung mit Hocker	○	○	○	○	○	○	○
genug getrunken	○	○	○	○	○	○	○
mich einmal am Tag hingelegt	○	○	○	○	○	○	○

Mein Beschwerde-Protokoll

Datum	Situation	Was ist passiert (Tropfen, Druck, Schmerz)	Wie stark 1–10

Mein Tipp für dich

Bring dieses Protokoll zur Beckenboden-Physiotherapie mit. Je genauer du beschreiben kannst, wann etwas auftritt, desto gezielter kann sie mit dir arbeiten.

Mein Beckenboden und ich werden jeden Tag mehr ein Team.

FÜR DICH

Für zu Hause

Dreimal täglich zehn kurze und fünf lange Aktivierungen, zum Beispiel beim Stillen oder an der Ampel.

Meine Woche

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Morgens	○	○	○	○	○	○	○
Mittags	○	○	○	○	○	○	○
Abends	○	○	○	○	○	○	○

Wie geht es mir heute?

Dein Journal

Wann vergesse ich, auf meinen Beckenboden zu achten?

Mit welcher Alltagssituation verbinde ich meine Übungen?

Wie spreche ich gerade mit mir selbst?



Dein Beckenboden ist ein Muskel wie jeder andere. Mit ein paar Minuten am Tag wird er wieder kräftig.

♡ Vivien