Movecia

WORKBOOK · POSTNATAL · EINHEIT 3

Tiefe Bauchmuskeln und Rektusdiastase

Was eine Rektusdiastase ist und wie du deine Bauchmitte sanft wieder schließt.

DAS NIMMST DU MIT

- ☆ Eine Rektusdiastase ist nach der Schwangerschaft normal.
- ☆ Die Spannung in der Tiefe ist wichtiger als die Breite in Fingern.
- ☆ Wölbt sich der Bauch zeltartig (Coning): Übung kleiner machen. Vorerst keine Crunches.

für .....

IMPULS

Worum es heute ging

In der Schwangerschaft weichen die beiden geraden Bauchmuskeln auseinander, um Platz für dein Baby zu machen. Das nennt man Rektusdiastase, und sie ist am Ende der Schwangerschaft bei fast allen Frauen da. Bei vielen schließt sie sich nach der Geburt von selbst, bei manchen braucht sie Training.

Wichtiger als die Breite in Fingern ist die Spannung in der Tiefe. Wenn sich die Bauchmitte fest anfühlt, kann sie Kraft übertragen, auch wenn noch zwei Finger dazwischen passen. Unser Ziel ist deshalb nicht nur, den Spalt zu schließen, sondern die Bauchmitte wieder belastbar zu machen.

Achte bei allen Übungen auf ein Zeichen: Wenn sich deine Bauchmitte wie ein kleines Zelt oder ein Kamm nach oben wölbt, das nennt man Coning, dann ist die Übung im Moment noch zu schwer. Mach sie dann kleiner. Klassische Sit-ups und Crunches lassen wir vorerst weg.

Meine Gedanken dazu

DEINE ÜBUNGSABFOLGE

So bewegen wir uns

1

Transversus-Aktivierung (querer Bauchmuskel)

10 Wiederholungen

Leg dich auf den Rücken, die Beine aufgestellt. Atme ein und lass den Bauch weich werden. Atme aus und zieh den Bauchnabel sanft Richtung Wirbelsäule, als würdest du einen Gürtel ein Loch enger schnallen. Der Beckenboden hebt sich mit. Halte kurz und lass wieder los.

Der Rücken bleibt ruhig auf der Matte.

2

Heel Slides

2 × 10 je Seite

Bleib in Rückenlage. Mit dem Ausatmen aktivierst du die Bauchmitte und schiebst eine Ferse langsam über den Boden, bis das Bein fast gestreckt ist. Mit dem Einatmen ziehst du es wieder heran. Dann die andere Seite.

Mit Socken auf glattem Boden geht es leichter.

3

Toe Taps

2 × 10 je Seite

Heb in Rückenlage beide Beine nacheinander in die Tischposition, die Knie über den Hüften. Mit dem Ausatmen senkst du einen Fuß und tippst mit den Zehen auf den Boden. Mit dem Einatmen kommst du zurück. Der untere Rücken bleibt ruhig.

Zu schwer? Ein Bein bleibt aufgestellt.

4

Dead Bug (vereinfacht)

2 × 6 je Seite

Bleib in der Tischposition und streck die Arme zur Decke. Mit dem Ausatmen bewegst du den rechten Arm nach hinten und das linke Bein nach vorn, nur so weit, wie dein Bauch flach bleibt. Mit dem Einatmen zurück, dann die andere Seite.

Achte auf Coning. Zeigt es sich, verkleinerst du den Bewegungsweg.



5

Vierfüßler mit Atem

8 Atemzüge

Komm in den Vierfüßlerstand. Atme ein und lass den Bauch Richtung Boden hängen. Atme aus und zieh ihn sanft nach innen und oben, ohne den Rücken zu runden.

Die Schwerkraft macht die Übung hier etwas anspruchsvoller.

Geschafft? ○ ○ ○ *ein Kreis pro Durchgang*

BREATHWORK

Reißverschluss-Atmung



BREATHWORK

Atme mit dem Kreis: ein, wenn er wächst, aus, wenn er sanft kleiner wird.

Leg dich auf den Rücken, die Hände auf deinem Bauch. Atme ein und lass den Bauch weit werden. Atme langsam aus und stell dir einen Reißverschluss vor, der vom Schambein bis zum Brustbein langsam zugezogen wird. Zuerst hebt sich der Beckenboden, dann wird der Unterbauch flach, dann schließt sich die Bauchmitte bis zu den Rippen.

Mit dem Einatmen öffnest du den Reißverschluss wieder. Zehn Atemzüge.

MEDITATION

Entspannung in Rückenlage

Leg ein Kissen unter deine Knie und lass deine Beine ganz schwer werden. Deine Arme liegen locker neben dir, die Handflächen zeigen nach oben.

Spür deinen Bauch, der sich mit jedem Atemzug hebt und senkt. Er hat dein Baby getragen und darf jetzt in Ruhe heilen. Mit jedem Ausatmen sinkt dein Körper ein wenig tiefer in den Boden. Bleib so liegen, solange du magst.

Nimm dir danach einen Moment, bevor du aufstehst.

GUT ZU WISSEN

Gut zu wissen: Deine Bauchmitte verstehen

Was genau bei einer Rektusdiastase passiert, wie du deine Bauchmitte im Alltag schonst und wann es sinnvoll ist, genauer hinschauen zu lassen.

Zwischen deinen beiden geraden Bauchmuskeln verläuft eine Bindegewebsnaht, die Linea alba. Sie ist eine Art festes Band aus Bindegewebe, in das die seitlichen Bauchmuskeln einstrahlen. In der Schwangerschaft wird dieses Band durch die Hormone weicher und durch den wachsenden Bauch gedehnt. So entsteht die Rektusdiastase. Sie ist eine sinnvolle Anpassung deines Körpers und kein Schaden.

GUT ZU WISSEN

Was in den ersten Monaten passiert

Die größte Veränderung geschieht in den ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt, wenn sich Gewebe und Muskeln von selbst wieder annähern. Danach geht es langsamer weiter. Viele Frauen sehen bis etwa sechs Monate nach der Geburt noch deutliche Fortschritte, manche auch darüber hinaus. Training kann diesen Prozess unterstützen, vor allem indem es die Spannung der tiefen Bauchmuskeln und damit die Belastbarkeit der Linea alba verbessert.

GUT ZU WISSEN

Breite ist nicht alles

Lange galt der Abstand in Fingern als das wichtigste Maß. Heute wissen wir, dass die Spannung des Bindegewebes mindestens genauso viel aussagt. Eine Bauchmitte, die mit zwei Fingern Abstand fest und gut gespannt ist, kann gut funktionieren. Eine schmalere, aber sehr weiche Bauchmitte braucht vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Deshalb notieren wir beides.

Coning im Alltag erkennen

Das Zelt oder den Kamm, den wir Coning nennen, siehst du nicht nur bei Übungen. Auch im Alltag gibt es Bewegungen, bei denen sich deine Bauchmitte vorwölben kann. Schau dir in den nächsten Tagen einmal bewusst zu und notiere, wo es passiert. Meist reicht eine kleine Veränderung, damit die Bauchmitte ruhig bleibt.

Mein Alltags-Check für die Bauchmitte

Bewegung	Wölbt sich etwas?	So mache ich es leichter
Aus der Rückenlage aufsetzen		über die Seite aufstehen
Baby aus dem Bett oder vom Boden heben		erst ausatmen, Beckenboden heben, dann aus den Knien heben
Babyschale tragen		nah am Körper oder in der Armbeuge, Seiten wechseln
Kinderwagen ins Auto laden		in Teile zerlegen, Hilfe annehmen
Husten oder Niesen		Knack, eventuell eine Hand auf den Bauch legen
Stuhlgang		Hocker unter die Füße, lang ausatmen

GUT ZU WISSEN

Bauchgurt und Tapes

Manche Frauen empfinden einen Bauchgurt oder ein Kinesio-Tape in den ersten Wochen als angenehm, weil es ihnen ein Gefühl von Halt gibt, besonders nach einem Kaiserschnitt. Das kann eine sinnvolle Unterstützung sein. Ein Gurt nimmt der Bauchmitte aber nicht die Arbeit ab, die sie selbst lernen darf. Trage ihn nicht dauerhaft und nicht zu eng, damit er keinen zusätzlichen Druck nach unten auf den Beckenboden ausübt. Ob er für dich passt, besprichst du am besten mit deiner Hebamme oder Physiotherapeutin.

GUT ZU WISSEN

Deine Kaiserschnittnarbe

Wenn die Narbe gut verheilt ist und deine Ärztin oder Hebamme einverstanden ist, kannst du beginnen, sie sanft zu berühren und zu mobilisieren. Viele Frauen empfinden die Narbe anfangs als fremd, manche mögen sie gar nicht ansehen. Fang ganz behutsam an, vielleicht zuerst nur mit der flachen Hand über der Kleidung. Eine Narbe, die gut verschieblich ist, kann sich positiv auf das Körpergefühl, die Beweglichkeit und manchmal auch auf Rückenbeschwerden auswirken. Eine Physiotherapeutin kann dir die passenden Griffe zeigen.

Mein Tipp für dich

Ein Gedanke, der vielen Frauen hilft: Dein Bauch muss nicht wieder so aussehen wie vorher, damit er gut funktioniert. Weiche Haut, Dehnungsstreifen und eine kleine Wölbung sind Spuren von etwas Großartigem. Unser Ziel ist eine Bauchmitte, die dich gut durch deinen Alltag trägt.

Lass deine Bauchmitte bitte ärztlich oder physiotherapeutisch anschauen, wenn

- [ ] du am Nabel oder entlang der Bauchmitte eine Vorwölbung bemerkst, die auch im Liegen bleibt
- [ ] die Vorwölbung schmerzt, hart wird oder sich nicht mehr zurückdrücken lässt (dann bitte sofort)
- [ ] du Schmerzen in der Bauchmitte oder im Rücken hast, die nicht besser werden
- [ ] sich nach etwa drei Monaten trotz Training kaum etwas verändert
- [ ] du gleichzeitig Probleme mit dem Beckenboden hast, etwa Urinverlust oder Druck nach unten

Mein Bauchmitte-Tracker

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Reißverschluss-Atmung, 10 Atemzüge	○	○	○	○	○	○	○
Heel Slides und Toe Taps	○	○	○	○	○	○	○
über die Seite aufgestanden	○	○	○	○	○	○	○
beim Heben ausgeatmet	○	○	○	○	○	○	○
kein Coning bemerkt	○	○	○	○	○	○	○

Mein Bauch hat Leben getragen. Ich begegne ihm mit Respekt und Geduld.

FÜR DICH

Für zu Hause

Heel Slides und Toe Taps, je zweimal zehn Wiederholungen, an vier Tagen pro Woche.

Meine Woche

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Morgens	○	○	○	○	○	○	○
Mittags	○	○	○	○	○	○	○
Abends	○	○	○	○	○	○	○

Wie geht es mir heute?

Dein Journal

Mein Selbsttest heute: wie viele Finger, wie fest?

Bei welchen Bewegungen im Alltag spüre ich meine Bauchmitte?

Wie fühle ich mich in meinem Bauch gerade?



Deine Bauchmitte braucht Geduld, nicht Härte.
Jede ruhige Wiederholung bringt dich weiter.

♡ Vivien