

# Vorlesung 16.4

## 1 Kapitel 1.3

Satz 1.3.2, mit Beweis von (v) . Informelle Erläuterung warum man von "Stetigkeit" spricht:  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ist stetig in  $x \in \mathbb{R}$ , wenn für jede Folge  $(x_n, n \geq 1)$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  gilt  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$  . Das erinnert an die Aussagen von (v),(vi), wobei in (v) der Limes von "unten", in (vi) der von "oben" genommen wird.

## 2 Kapitel 1.4: Erzeugte $\sigma$ - Algebren

Sei  $\Omega = [0, 1]$ . Es soll modelliert werden, zufällig eine Zahl aus  $\Omega$  zu ziehen, und jede Zahl soll dieselbe Wahrscheinlichkeit  $p$  haben, gezogen zu werden. Sei  $\mathcal{E}$  eine  $\sigma$ -Algebra auf  $\Omega$  derart, dass  $\{\omega\} \in \mathcal{E}$  für alle  $\omega \in \Omega$ . Wir suchen also ein Wahrscheinlichkeitsmaß  $\mathbb{P}$  auf  $\mathcal{E}$  mit  $\mathbb{P}(\{\omega\}) = p$  für alle  $\omega \in \Omega$ . Sei  $A = \mathbb{Q} \cap \Omega$ . Dann ist  $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} n * p$ , und dieser Limes ist 0 für  $p = 0$ , ansonsten  $+\infty$ . Da aber  $\mathbb{P}(A) \leq 1$  gelten muss, muss also  $p = 0$  sein: Jeder einzelne Punkt - und jede höchstens abzählbar unendliche Menge - muss also Wahrscheinlichkeit 0 haben.

Als Ausweg kann man statt  $\mathbb{P}(\{\omega\}) = p$  verlangen, dass für  $[a, b] \subseteq [0, 1]$  nun  $\mathbb{P}([a, b]) = b - a$  gelten soll. Die Frage ist nun, wie wir die  $\sigma$  - Algebra  $\mathcal{E}$  wählen können: Natürlich möchten wir  $\mathcal{E} = \mathcal{P}(\Omega)$  haben, d.h. wir wollen einfach jeder Teilmenge von  $\Omega$  eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Das geht aber leider - beweisbar - nicht! Dies ist der Inhalt des folgenden Satzes, genauere Hintergründe erfahren Sie in Kapitel 1.7 im Lehrbuch.

**Satz 1.** *Es gibt **kein** Wahrscheinlichkeitsmaß  $\mathbb{P}$  auf der Potenzmenge von  $[0, 1]$ , derart, dass  $\mathbb{P}([a, b]) = b - a$  für alle  $[a, b] \subseteq [0, 1]$  gilt.*

Daher müssen wir uns mit einer kleineren  $\sigma$  - Algebra begnügen. Dies ist die  $\sigma$  - Algebra der Borelmengen. Diese sind ein Beispiel einer erzeugten  $\sigma$  - Algebra. Anschließend wurde Satz 1.4.1 erläutert, man wählt  $\mathcal{A}$  als Schnitt über alle  $\sigma$  - Algebra, die  $\mathcal{M}$  enthalten, es wurde nicht bewiesen, dass das eine  $\sigma$  - Algebra gibt. Beispiel 2 auf Seite 17 wurde behandelt.

### 3 Kapitel 1.5 Borelmengen

Definition der Borelmengen, Satz 1.5.2 ohne Beweis. Beweis  $\mathbb{Q}$  ist eine Borelmenge: Für jedes  $x \in \mathbb{R}$  ist  $\{x\}$  eine Borelmenge, da

$$\{x\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [x - 1/n, x + 1/n]$$

(abzählbar unendliche Durchschnitte führen nicht aus einer  $\sigma$ -Algebra heraus). Damit ist dann aber auch  $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$  als abzählbare Vereinigung von Borelmengen eine Borelmenge.