

# 线性代数第九讲

吴民

南开大学 计控学院

# 线性空间

数学中的空间说的是集合，或者说是全集。

# 线性空间

数学中的空间说的是集合，或者说是全集。

线性空间就是给满足一定条件的集合起个名字叫线性空间。除线性空间外，还有度量空间、拓扑空间等名词。

# 线性空间

数学中的空间说的是集合，或者说是全集。

线性空间就是给满足一定条件的集合起个名字叫线性空间。除线性空间外，还有度量空间、拓扑空间等名词。

我们不是要构造一个具体的空间，把它起名字叫线性空间。像构造向量就是具体的构造。

# 线性空间

数学中的空间说的是集合，或者说是全集。

线性空间就是给满足一定条件的集合起个名字叫线性空间。除线性空间外，还有度量空间、拓扑空间等名词。

我们不是要构造一个具体的空间，把它起名字叫线性空间。像构造向量就是具体的构造。

而是把任何满足“线性空间”所要求的条件的任何集合都称为线性空间。

# 线性空间

数学中的空间说的是集合，或者说是全集。

线性空间就是给满足一定条件的集合起个名字叫线性空间。除线性空间外，还有度量空间、拓扑空间等名词。

我们不是要构造一个具体的空间，把它起名字叫线性空间。像构造向量就是具体的构造。

而是把任何满足“线性空间”所要求的条件的任何集合都称为线性空间。

线性空间是个抽象的概念。

# 线性空间的定义

设  $V$  是一个非空集合（它将被称为线性空间）。

# 线性空间的定义

设  $V$  是一个非空集合（它将被称为线性空间）。

$F$  是一个数域（线性空间的全称为数域  $F$  上的线性空间  $V$ ）。



# 线性空间的定义

设  $V$  是一个非空集合（它将被称为线性空间）。

$F$  是一个数域（线性空间的全称为数域  $F$  上的线性空间  $V$ ）。

集合  $V$  中定义了一个加法运算。对任意  $\alpha, \beta \in V$ ,  $\alpha + \beta$  有意义,  $\alpha + \beta \in V$ 。称为  $\alpha$  与  $\beta$  的和。

# 线性空间的定义

设  $V$  是一个非空集合（它将被称为线性空间）。

$F$  是一个数域（线性空间的全称为数域  $F$  上的线性空间  $V$ ）。

集合  $V$  中定义了一个加法运算。对任意  $\alpha, \beta \in V$ ,  $\alpha + \beta$  有意义,  $\alpha + \beta \in V$ 。称为  $\alpha$  与  $\beta$  的和。

在集合  $V$  中的元与数域  $F$  中的数之间定义了一个数乘运算。对任意  $\alpha \in V$ ,  $\lambda \in F$ ,  $\lambda\alpha$  有意义,  $\lambda\alpha \in V$ 。称为  $\lambda$  与  $\alpha$  的乘积。

# 线性空间的定义

设  $V$  是一个非空集合（它将被称为线性空间）。

$F$  是一个数域（线性空间的全称为数域  $F$  上的线性空间  $V$ ）。

集合  $V$  中定义了一个加法运算。对任意  $\alpha, \beta \in V$ ,  $\alpha + \beta$  有意义,  $\alpha + \beta \in V$ 。称为  $\alpha$  与  $\beta$  的和。

在集合  $V$  中的元与数域  $F$  中的数之间定义了一个数乘运算。对任意  $\alpha \in V$ ,  $\lambda \in F$ ,  $\lambda\alpha$  有意义,  $\lambda\alpha \in V$ 。称为  $\lambda$  与  $\alpha$  的乘积。  
加法运算与数乘运算满足：

# 线性空间的定义

- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 。

# 线性空间的定义

- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 。
- $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ 。

# 线性空间的定义

- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 。
- $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ 。
- 存在零元素  $0$ ，即对任意  $\alpha \in V$ ，都有  $0 + \alpha = \alpha$ 。

# 线性空间的定义

- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 。
- $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ 。
- 存在零元素  $0$ ，即对任意  $\alpha \in V$ ，都有  $0 + \alpha = \alpha$ 。
- 对  $V$  中每个元素  $\alpha$ ，都能找到负元素  $-\alpha \in V$ ，使得  $\alpha + (-\alpha) = 0$ 。

# 线性空间的定义

- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 。
- $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ 。
- 存在零元素  $0$ ，即对任意  $\alpha \in V$ ，都有  $0 + \alpha = \alpha$ 。
- 对  $V$  中每个元素  $\alpha$ ，都能找到负元素  $-\alpha \in V$ ，使得  $\alpha + (-\alpha) = 0$ 。
- $1 \cdot \alpha = \alpha$ 。



# 线性空间的定义

- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 。
- $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ 。
- 存在零元素  $0$ ，即对任意  $\alpha \in V$ ，都有  $0 + \alpha = \alpha$ 。
- 对  $V$  中每个元素  $\alpha$ ，都能找到负元素  $-\alpha \in V$ ，使得  $\alpha + (-\alpha) = 0$ 。
- $1 \cdot \alpha = \alpha$ 。
- $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$ ,  $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$ 。

# 线性空间的定义

- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 。
- $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ 。
- 存在零元素  $0$ ，即对任意  $\alpha \in V$ ，都有  $0 + \alpha = \alpha$ 。
- 对  $V$  中每个元素  $\alpha$ ，都能找到负元素  $-\alpha \in V$ ，使得  $\alpha + (-\alpha) = 0$ 。
- $1 \cdot \alpha = \alpha$ 。
- $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$ ,  $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$ 。
- $\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha$ 。

# 线性空间的定义

则称  $V$  为线性空间。

# 线性空间的定义

则称  $V$  为线性空间。

全称是  $V$  按所定义的线性运算构成数域  $F$  上的线性空间。

或  $V$  是  $F$  上的线性空间。

# 线性空间的定义

则称  $V$  为线性空间。

全称是  $V$  按所定义的线性运算构成数域  $F$  上的线性空间。

或  $V$  是  $F$  上的线性空间。

实数域上的线性空间称为实空间。

# 线性空间的定义

则称  $V$  为线性空间。

全称是  $V$  按所定义的线性运算构成数域  $F$  上的线性空间。

或  $V$  是  $F$  上的线性空间。

实数域上的线性空间称为实空间。

复数域上的线性空间称为复空间。

# 线性空间的定义

则称  $V$  为线性空间。

全称是  $V$  按所定义的线性运算构成数域  $F$  上的线性空间。

或  $V$  是  $F$  上的线性空间。

实数域上的线性空间称为实空间。

复数域上的线性空间称为复空间。

线性空间中的元素称为向量。

# 线性空间的例1

$F$  取为某个数域。 $n$  为某个给定正整数。 $V$  为  $F$  上的全体  $n$  维行向量的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的向量的加法运算。 $V$  中的数量乘法就是通常的向量的数量乘积。



# 线性空间的例1

$F$  取为某个数域。 $n$  为某个给定正整数。 $V$  为  $F$  上的全体  $n$  维行向量的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的向量的加法运算。 $V$  中的数量乘法就是通常的向量的数量乘积。  
逐条验证知此  $V$  为线性空间。

# 线性空间的例1

$F$  取为某个数域。 $n$  为某个给定正整数。 $V$  为  $F$  上的全体  $n$  维行向量的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的向量的加法运算。 $V$  中的数量乘法就是通常的向量的数量乘积。

逐条验证知此  $V$  为线性空间。

$F$  取为  $R$  时,  $V$  称为实  $n$  维向量空间。记作  $R^n$ 。

# 线性空间的例1

$F$  取为某个数域。 $n$  为某个给定正整数。 $V$  为  $F$  上的全体  $n$  维行向量的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的向量的加法运算。 $V$  中的数量乘法就是通常的向量的数量乘积。

逐条验证知此  $V$  为线性空间。

$F$  取为  $R$  时,  $V$  称为实  $n$  维向量空间。记作  $R^n$ 。

$F$  取为  $C$  时,  $V$  称为复  $n$  维向量空间。记作  $C^n$ 。

## 线性空间的例2

$F$  取为实数域。 $n$  为某个给定正整数。 $V$  为给定的某个  $n$  元齐次线性方程组的解向量的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的向量的加法运算。 $V$  中的数量乘法就是通常的向量的数量乘积。

## 线性空间的例2

$F$  取为实数域。 $n$  为某个给定正整数。 $V$  为给定的某个  $n$  元齐次线性方程组的解向量的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的向量的加法运算。 $V$  中的数量乘法就是通常的向量的数量乘积。

逐条验证知此  $V$  为线性空间。

## 线性空间的例2

$F$  取为实数域。 $n$  为某个给定正整数。 $V$  为给定的某个  $n$  元齐次线性方程组的解向量的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的向量的加法运算。 $V$  中的数量乘法就是通常的向量的数量乘积。

逐条验证知此  $V$  为线性空间。

称为该线性方程组的解空间。

## 线性空间的例2

$F$  取为实数域。 $n$  为某个给定正整数。 $V$  为给定的某个  $n$  元齐次线性方程组的解向量的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的向量的加法运算。 $V$  中的数量乘法就是通常的向量的数量乘积。

逐条验证知此  $V$  为线性空间。

称为该线性方程组的解空间。

零空间：只含有零向量的线性空间。

## 线性空间的例3

$F$  取为实数域。 $a, b$  为给定实数。 $V$  为  $[a, b]$  上所有连续函数的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的函数的加法。 $V$  中的数量乘法就是通常的函数与数相乘。



## 线性空间的例3

$F$  取为实数域。 $a, b$  为给定实数。 $V$  为  $[a, b]$  上所有连续函数的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的函数的加法。 $V$  中的数量乘法就是通常的函数与数相乘。

逐条验证知此  $V$  为线性空间。即  $V$  关于通常的函数加法和函数与数的乘法构成一个实线性空间。称为连续函数空间，记作  $C[a, b]$ 。

## 线性空间的例3

$F$  取为实数域。 $a, b$  为给定实数。 $V$  为  $[a, b]$  上所有连续函数的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的函数的加法。 $V$  中的数量乘法就是通常的函数与数相乘。

逐条验证知此  $V$  为线性空间。即  $V$  关于通常的函数加法和函数与数的乘法构成一个实线性空间。称为连续函数空间，记作  $C[a, b]$ 。

$F$  取为实数域。 $n$  为给定正整数。 $V$  为所有次数不超过  $n$  的一元实系数多项式的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的多项式加法。 $V$  中的数量乘法就是通常的多项式与数相乘。

## 线性空间的例3

$F$  取为实数域。 $a, b$  为给定实数。 $V$  为  $[a, b]$  上所有连续函数的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的函数的加法。 $V$  中的数量乘法就是通常的函数与数相乘。

逐条验证知此  $V$  为线性空间。即  $V$  关于通常的函数加法和函数与数的乘法构成一个实线性空间。称为连续函数空间，记作  $C[a, b]$ 。

$F$  取为实数域。 $n$  为给定正整数。 $V$  为所有次数不超过  $n$  的一元实系数多项式的全体构成的集合。 $V$  中的加法运算就是通常的多项式加法。 $V$  中的数量乘法就是通常的多项式与数相乘。

$V$  是一个实线性空间。记作  $P_n(x)$ 。

# 线性空间的性质

# 线性空间的性质

零向量唯一。（反证法）。

# 线性空间的性质

零向量唯一。（反证法）。

$$0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_1。$$

# 线性空间的性质

零向量唯一。（反证法）。

$$0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_1。$$

每个元素的负元素唯一。（反证法）。

# 线性空间的性质

零向量唯一。（反证法）。

$$0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_1。$$

每个元素的负元素唯一。（反证法）。

由此可定义向量的减法： $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 。



# 线性空间的性质

零向量唯一。（反证法）。

$$0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_1。$$

每个元素的负元素唯一。（反证法）。

由此可定义向量的减法： $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 。

$$\beta_1 = \beta_1 + 0 = \beta_1 + (\alpha + \beta_2) = (\beta_1 + \alpha) + \beta_2 = \beta_2。$$

# 线性空间的性质

零向量唯一。（反证法）。

$$0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_1。$$

每个元素的负元素唯一。（反证法）。

由此可定义向量的减法： $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 。

$$\beta_1 = \beta_1 + 0 = \beta_1 + (\alpha + \beta_2) = (\beta_1 + \alpha) + \beta_2 = \beta_2。$$

$$0\alpha = 0。$$

# 线性空间的性质

零向量唯一。（反证法）。

$$0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_1。$$

每个元素的负元素唯一。（反证法）。

由此可定义向量的减法： $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 。

$$\beta_1 = \beta_1 + 0 = \beta_1 + (\alpha + \beta_2) = (\beta_1 + \alpha) + \beta_2 = \beta_2。$$

$$0\alpha = 0。$$

$$\alpha = 1\alpha = (1 + 0)\alpha = 1\alpha + 0\alpha。$$

# 线性空间的性质

零向量唯一。（反证法）。

$$0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_1。$$

每个元素的负元素唯一。（反证法）。

由此可定义向量的减法： $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 。

$$\beta_1 = \beta_1 + 0 = \beta_1 + (\alpha + \beta_2) = (\beta_1 + \alpha) + \beta_2 = \beta_2。$$

$$0\alpha = 0。$$

$$\alpha = 1\alpha = (1 + 0)\alpha = 1\alpha + 0\alpha。$$

$$(-1)\alpha = -\alpha, \lambda 0 = 0。$$

# 线性空间的性质

零向量唯一。（反证法）。

$$0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_1。$$

每个元素的负元素唯一。（反证法）。

由此可定义向量的减法： $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 。

$$\beta_1 = \beta_1 + 0 = \beta_1 + (\alpha + \beta_2) = (\beta_1 + \alpha) + \beta_2 = \beta_2。$$

$$0\alpha = 0。$$

$$\alpha = 1\alpha = (1 + 0)\alpha = 1\alpha + 0\alpha。$$

$$(-1)\alpha = -\alpha, \lambda 0 = 0。$$

若  $\lambda\alpha = 0$ ，则  $\lambda = 0$  或  $\alpha = 0$ 。

# 线性相关与线性无关

线性空间中已经有加法运算和数乘运算。

# 线性相关与线性无关

线性空间中已经有加法运算和数乘运算。

有了加法运算和数乘运算就可以产生线性组合。

# 线性相关与线性无关

线性空间中已经有加法运算和数乘运算。

有了加法运算和数乘运算就可以产生线性组合。

有了线性组合就可以产生线性表出的概念。



# 线性相关与线性无关

线性空间中已经有加法运算和数乘运算。

有了加法运算和数乘运算就可以产生线性组合。

有了线性组合就可以产生线性表出的概念。

有了线性表出，就可以产生线性相关和线性无关。

# 线性相关与线性无关

线性空间中已经有加法运算和数乘运算。

有了加法运算和数乘运算就可以产生线性组合。

有了线性组合就可以产生线性表出的概念。

有了线性表出，就可以产生线性相关和线性无关。

有了线性相关和线性无关，可产生极大线性无关组和秩的概念。

# 线性相关与线性无关

线性空间中已经有加法运算和数乘运算。

有了加法运算和数乘运算就可以产生线性组合。

有了线性组合就可以产生线性表出的概念。

有了线性表出，就可以产生线性相关和线性无关。

有了线性相关和线性无关，可产生极大线性无关组和秩的概念。

前一章的很多定理和结论，仅建立在线性表出的概念之上的，其证明丝毫没有涉及向量的具体形式。因此它们在线性空间中也是成立的。它们的证明几乎可以照搬上一章的证明。但需要注意其中的加号和乘号的概念和  $0$  的含义发生了变化。

# 线性空间

但有些问题，需要根据线性空间中向量和运算的具体形式来证明。比如书上的上一章定理 2。

# 线性空间

但有些问题，需要根据线性空间中向量和运算的具体形式来证明。比如书上的上一章定理 2。

例题：线性空间  $P_n[x]$  中， $1, x, x^2, \dots, x^n$  线性无关。

# 线性空间

但有些问题，需要根据线性空间中向量和运算的具体形式来证明。比如书上的上一章定理 2。

例题：线性空间  $P_n[x]$  中， $1, x, x^2, \dots, x^n$  线性无关。

证明：注意  $P_n[x]$  中的零元素是取值恒为 0 的  $x$  的函数。

# 线性空间

但有些问题，需要根据线性空间中向量和运算的具体形式来证明。比如书上的上一章定理 2。

例题：线性空间  $P_n[x]$  中， $1, x, x^2, \dots, x^n$  线性无关。

证明：注意  $P_n[x]$  中的零元素是取值恒为 0 的  $x$  的函数。

以上几个向量的线性组合等于 0，是等于一个值恒为 0 的函数。

# 线性空间

但有些问题，需要根据线性空间中向量和运算的具体形式来证明。比如书上的上一章定理 2。

例题：线性空间  $P_n[x]$  中， $1, x, x^2, \dots, x^n$  线性无关。

证明：注意  $P_n[x]$  中的零元素是取值恒为 0 的  $x$  的函数。

以上几个向量的线性组合等于 0，是等于一个值恒为 0 的函数。

也就是如果  $n+1$  个实数  $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$  使得

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_n x^n = 0$$



# 线性空间

但有些问题，需要根据线性空间中向量和运算的具体形式来证明。比如书上的上一章定理 2。

例题：线性空间  $P_n[x]$  中， $1, x, x^2, \dots, x^n$  线性无关。

证明：注意  $P_n[x]$  中的零元素是取值恒为 0 的  $x$  的函数。

以上几个向量的线性组合等于 0，是等于一个值恒为 0 的函数。

也就是如果  $n+1$  个实数  $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$  使得

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_n x^n = 0$$

则在上式中的  $x$  中取任意实数，该式都成立。

# 线性空间

但有些问题，需要根据线性空间中向量和运算的具体形式来证明。比如书上的上一章定理 2。

例题：线性空间  $P_n[x]$  中， $1, x, x^2, \dots, x^n$  线性无关。

证明：注意  $P_n[x]$  中的零元素是取值恒为 0 的  $x$  的函数。

以上几个向量的线性组合等于 0，是等于一个值恒为 0 的函数。

也就是如果  $n+1$  个实数  $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$  使得

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_n x^n = 0$$

则在上式中的  $x$  中取任意实数，该式都成立。

将  $x$  取  $n+1$  个两两不等的实数  $x_0, x_1, \dots, x_n$ ，得到  $n+1$  个等式。

# 线性空间

这  $n+1$  个等式同时成立, 也就是  $\lambda_0, \dots, \lambda_n$  满足:

# 线性空间

这  $n+1$  个等式同时成立, 也就是  $\lambda_0, \dots, \lambda_n$  满足:

$$\begin{cases} \lambda_0 + \lambda_1 x_0 + \lambda_2 x_0^2 + \dots + \lambda_n x_0^n = 0 \\ \lambda_0 + \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_1^n = 0 \\ \dots \\ \lambda_0 + \lambda_1 x_n + \lambda_2 x_n^2 + \dots + \lambda_n x_n^n = 0 \end{cases}$$

# 线性空间

这  $n+1$  个等式同时成立, 也就是  $\lambda_0, \dots, \lambda_n$  满足:

$$\begin{cases} \lambda_0 + \lambda_1 x_0 + \lambda_2 x_0^2 + \dots + \lambda_n x_0^n = 0 \\ \lambda_0 + \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_1^n = 0 \\ \dots \\ \lambda_0 + \lambda_1 x_n + \lambda_2 x_n^2 + \dots + \lambda_n x_n^n = 0 \end{cases}$$

这个线性方程组系数矩阵的行列式是范德蒙行列式。

# 线性空间

这  $n+1$  个等式同时成立，也就是  $\lambda_0, \dots, \lambda_n$  满足：

$$\begin{cases} \lambda_0 + \lambda_1 x_0 + \lambda_2 x_0^2 + \dots + \lambda_n x_0^n = 0 \\ \lambda_0 + \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_1^n = 0 \\ \dots \\ \lambda_0 + \lambda_1 x_n + \lambda_2 x_n^2 + \dots + \lambda_n x_n^n = 0 \end{cases}$$

这个线性方程组系数矩阵的行列式是范德蒙行列式。

因为  $x_0, x_1, \dots, x_n$  两两不等，所以此行列式不等于 0。

# 线性空间

这  $n+1$  个等式同时成立，也就是  $\lambda_0, \dots, \lambda_n$  满足：

$$\begin{cases} \lambda_0 + \lambda_1 x_0 + \lambda_2 x_0^2 + \dots + \lambda_n x_0^n = 0 \\ \lambda_0 + \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_1^n = 0 \\ \dots \\ \lambda_0 + \lambda_1 x_n + \lambda_2 x_n^2 + \dots + \lambda_n x_n^n = 0 \end{cases}$$

这个线性方程组系数矩阵的行列式是范德蒙行列式。

因为  $x_0, x_1, \dots, x_n$  两两不等，所以此行列式不等于 0。

根据克莱姆法则，知此方程组有唯一解，且是 0 解。

即当且仅当  $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$  时，成立：



即当且仅当  $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$  时, 成立:

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \cdots + \lambda_n x^n = 0$$

# 线性空间

即当且仅当  $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$  时, 成立:

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \cdots + \lambda_n x^n = 0$$

所以这几个向量线性无关。

# 线性空间

即当且仅当  $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$  时，成立：

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \cdots + \lambda_n x^n = 0$$

所以这几个向量线性无关。

线性子空间（子空间）的定义，它要满足：

# 线性空间

即当且仅当  $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$  时, 成立:

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \cdots + \lambda_n x^n = 0$$

所以这几个向量线性无关。

线性子空间（子空间）的定义，它要满足：

- $V$  是  $F$  上的一个线性空间。 $L$  是  $V$  的一个非空子集。

# 线性空间

即当且仅当  $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$  时，成立：

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \cdots + \lambda_n x^n = 0$$

所以这几个向量线性无关。

线性子空间（子空间）的定义，它要满足：

- $V$  是  $F$  上的一个线性空间。 $L$  是  $V$  的一个非空子集。
- 在  $L$  中，使用  $V$  中的加法运算和数乘运算。

# 线性空间

即当且仅当  $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$  时，成立：

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \cdots + \lambda_n x^n = 0$$

所以这几个向量线性无关。

线性子空间（子空间）的定义，它要满足：

- $V$  是  $F$  上的一个线性空间。 $L$  是  $V$  的一个非空子集。
- 在  $L$  中，使用  $V$  中的加法运算和数乘运算。
- $L$  满足线性空间的定义。

# 线性空间

按定义，验证一个子集是子空间，需要验证它是线性空间。

# 线性空间

按定义，验证一个子集是子空间，需要验证它是线性空间。  
事实上，其中的多条不需要再验证。只需要验证封闭性即可。



# 线性空间

按定义，验证一个子集是子空间，需要验证它是线性空间。

事实上，其中的多条不需要再验证。只需要验证封闭性即可。

定理： $L$  是  $V$  的非空子集。若  $L$  关于加法运算和数乘运算封闭，则  $L$  是  $V$  的线性子空间。

# 线性空间

按定义，验证一个子集是子空间，需要验证它是线性空间。

事实上，其中的多条不需要再验证。只需要验证封闭性即可。

定理： $L$  是  $V$  的非空子集。若  $L$  关于加法运算和数乘运算封闭，则  $L$  是  $V$  的线性子空间。

部分证明：证  $L$  中存在零元素。

# 线性空间

按定义，验证一个子集是子空间，需要验证它是线性空间。

事实上，其中的多条不需要再验证。只需要验证封闭性即可。

定理： $L$  是  $V$  的非空子集。若  $L$  关于加法运算和数乘运算封闭，则  $L$  是  $V$  的线性子空间。

部分证明：证  $L$  中存在零元素。

因为  $L$  非空，所以必有某个向量  $\alpha \in L \subset V$ 。因  $L$  关于数乘运算封闭，所以  $0\alpha \in L$ 。

# 线性空间

按定义，验证一个子集是子空间，需要验证它是线性空间。

事实上，其中的多条不需要再验证。只需要验证封闭性即可。

定理： $L$  是  $V$  的非空子集。若  $L$  关于加法运算和数乘运算封闭，则  $L$  是  $V$  的线性子空间。

部分证明：证  $L$  中存在零元素。

因为  $L$  非空，所以必有某个向量  $\alpha \in L \subset V$ 。因  $L$  关于数乘运算封闭，所以  $0\alpha \in L$ 。但在  $V$  中  $0\alpha = 0$ ，而  $L$  中的运算继承了  $V$  中的运算，所以  $V$  中的零元素  $0 \in L$ 。

# 线性空间

按定义，验证一个子集是子空间，需要验证它是线性空间。

事实上，其中的多条不需要再验证。只需要验证封闭性即可。

定理： $L$  是  $V$  的非空子集。若  $L$  关于加法运算和数乘运算封闭，则  $L$  是  $V$  的线性子空间。

部分证明：证  $L$  中存在零元素。

因为  $L$  非空，所以必有某个向量  $\alpha \in L \subset V$ 。因  $L$  关于数乘运算封闭，所以  $0\alpha \in L$ 。但在  $V$  中  $0\alpha = 0$ ，而  $L$  中的运算继承了  $V$  中的运算，所以  $V$  中的零元素  $0 \in L$ 。而对  $L$  中任意  $\alpha$ ，有  $\alpha \in V$ ，所以  $0 + \alpha = \alpha$  在  $V$  内成立，也在  $L$  中成立。所以  $0$  是  $L$  中的零元素。

# 线性空间

$L_1$  和  $L_2$  都是  $V$  的线性子空间, 则  $L_1 \cap L_2$  仍是子空间。

# 线性空间

$L_1$  和  $L_2$  都是  $V$  的线性子空间, 则  $L_1 \cap L_2$  仍是子空间。

但  $L_1 \cup L_2$  未必是线性子空间。

# 线性空间

$L_1$  和  $L_2$  都是  $V$  的线性子空间, 则  $L_1 \cap L_2$  仍是子空间。

但  $L_1 \cup L_2$  未必是线性子空间。

线性空间  $V$ 。  $V$  中的  $m$  个向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 。



# 线性空间

$L_1$  和  $L_2$  都是  $V$  的线性子空间, 则  $L_1 \cap L_2$  仍是子空间。

但  $L_1 \cup L_2$  未必是线性子空间。

线性空间  $V$ 。  $V$  中的  $m$  个向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 。

$$\text{Span}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_1, \dots, k_m \in F\}$$

# 线性空间

$L_1$  和  $L_2$  都是  $V$  的线性子空间, 则  $L_1 \cap L_2$  仍是子空间。

但  $L_1 \cup L_2$  未必是线性子空间。

线性空间  $V$ 。  $V$  中的  $m$  个向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 。

$$\text{Span}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_1, \dots, k_m \in F\}$$

是线性子空间。称为由  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  生成的子空间。

# 线性空间

$L_1$  和  $L_2$  都是  $V$  的线性子空间, 则  $L_1 \cap L_2$  仍是子空间。

但  $L_1 \cup L_2$  未必是线性子空间。

线性空间  $V$ 。  $V$  中的  $m$  个向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 。

$$\text{Span}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_1, \dots, k_m \in F\}$$

是线性子空间。称为由  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  生成的子空间。

练习: 集合  $V$  取为全体正实数  $\mathbf{R}^+$ , 加法与数乘分别定义为:

$$a \oplus b = ab$$

$$k \odot a = a^k$$

$V$  是实数域上的线性空间吗?

# $n$ 维线性空间

如果线性空间  $V$  中可以找到  $n$  个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 使这  $n$  个向量是  $V$  的一个极大线性无关组。

# $n$ 维线性空间

如果线性空间  $V$  中可以找到  $n$  个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 使这  $n$  个向量是  $V$  的一个极大线性无关组。

则称  $V$  为  $n$  维线性空间。

# $n$ 维线性空间

如果线性空间  $V$  中可以找到  $n$  个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 使这  $n$  个向量是  $V$  的一个极大线性无关组。

则称  $V$  为  $n$  维线性空间。

$V$  的极大线性无关子组称为  $V$  的基底或基。

# $n$ 维线性空间

如果线性空间  $V$  中可以找到  $n$  个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 使这  $n$  个向量是  $V$  的一个极大线性无关组。

则称  $V$  为  $n$  维线性空间。

$V$  的极大线性无关子组称为  $V$  的基底或基。

基底所含向量的个数称为线性空间  $V$  的维数。零空间维数为 0。

# $n$ 维线性空间

如果线性空间  $V$  中可以找到  $n$  个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 使这  $n$  个向量是  $V$  的一个极大线性无关组。

则称  $V$  为  $n$  维线性空间。

$V$  的极大线性无关子组称为  $V$  的基底或基。

基底所含向量的个数称为线性空间  $V$  的维数。零空间维数为 0。

如果  $V$  中可以找到任意多个线性无关的向量, 就称  $V$  为无穷维空间。



# $n$ 维线性空间

如果线性空间  $V$  中可以找到  $n$  个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 使这  $n$  个向量是  $V$  的一个极大线性无关组。

则称  $V$  为  $n$  维线性空间。

$V$  的极大线性无关子组称为  $V$  的基底或基。

基底所含向量的个数称为线性空间  $V$  的维数。零空间维数为 0。

如果  $V$  中可以找到任意多个线性无关的向量, 就称  $V$  为无穷维空间。

线性空间的有序基: 基排成有序组。  $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$

# $n$ 维线性空间

- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是线性空间  $V$  的一个基, 则  $V$  中任何一个向量  $\alpha$  都可被  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性表出, 且表示式唯一。

# $n$ 维线性空间

- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是线性空间  $V$  的一个基, 则  $V$  中任何一个向量  $\alpha$  都可被  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性表出, 且表示式唯一。
- 式中系数的有序数组称为  $\alpha$  在基  $[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$  下的坐标。

# $n$ 维线性空间

- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是线性空间  $V$  的一个基, 则  $V$  中任何一个向量  $\alpha$  都可被  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性表出, 且表示式唯一。
- 式中系数的有序数组称为  $\alpha$  在基  $[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$  下的坐标。
- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是线性空间  $V$  的一个基,  $\alpha$  和  $\beta$  在这个基下的坐标为:  $X = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  和  $Y = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 。则  $\alpha + \beta$  的坐标为  $X + Y$ ,  $k\alpha$  的坐标为  $kX$ 。

# $n$ 维线性空间

- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是线性空间  $V$  的一个基, 则  $V$  中任何一个向量  $\alpha$  都可被  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性表出, 且表示式唯一。
- 式中系数的有序数组称为  $\alpha$  在基  $[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$  下的坐标。
- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  是线性空间  $V$  的一个基,  $\alpha$  和  $\beta$  在这个基下的坐标为:  $X = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  和  $Y = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 。则  $\alpha + \beta$  的坐标为  $X + Y$ ,  $k\alpha$  的坐标为  $kX$ 。
- 向量  $\alpha, \beta, \dots, \gamma$  的坐标分别为  $X, Y, \dots, Z$ , 则等式

$$a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma = 0$$

成立的充要条件是  $aX + bY + \dots + cZ = 0$ 。

# 基底变换与坐标变换

线性空间的基底通常是不唯一的（记得有的空间没有基底）。

# 基底变换与坐标变换

线性空间的基底通常是不唯一的（记得有的空间没有基底）。

如果在一个  $n$  维线性空间  $V$  中找到两个基底：

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \quad \text{和} \quad \eta_1, \dots, \eta_n$$

# 基底变换与坐标变换

线性空间的基底通常是不唯一的（记得有的空间没有基底）。

如果在一个  $n$  维线性空间  $V$  中找到两个基底：

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \quad \text{和} \quad \eta_1, \dots, \eta_n$$

$V$  中的一个向量  $\alpha$ ,

$\alpha$  在基底  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  下的坐标为  $\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix}^T$ ,



# 基底变换与坐标变换

线性空间的基底通常是不唯一的（记得有的空间没有基底）。

如果在一个  $n$  维线性空间  $V$  中找到两个基底：

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \quad \text{和} \quad \eta_1, \dots, \eta_n$$

$V$  中的一个向量  $\alpha$ ,

$\alpha$  在基底  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  下的坐标为  $\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix}^T$ ,

$\alpha$  在基底  $\eta_1, \dots, \eta_n$  下的坐标为  $\begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \end{pmatrix}^T$ ,

# 基底变换与坐标变换

线性空间的基底通常是不唯一的（记得有的空间没有基底）。

如果在一个  $n$  维线性空间  $V$  中找到两个基底：

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \quad \text{和} \quad \eta_1, \dots, \eta_n$$

$V$  中的一个向量  $\alpha$ ,

$\alpha$  在基底  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  下的坐标为  $(x_1 \ \dots \ x_n)^T$ ,

$\alpha$  在基底  $\eta_1, \dots, \eta_n$  下的坐标为  $(y_1 \ \dots \ y_n)^T$ ,

$(x_1 \ \dots \ x_n)^T$  与  $(y_1 \ \dots \ y_n)^T$  之间存在着什么联系？

# 基底变换与坐标变换

线性空间的基底通常是不唯一的（记得有的空间没有基底）。

如果在一个  $n$  维线性空间  $V$  中找到两个基底：

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \quad \text{和} \quad \eta_1, \dots, \eta_n$$

$V$  中的一个向量  $\alpha$ ,

$\alpha$  在基底  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  下的坐标为  $\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix}^T$ ,

$\alpha$  在基底  $\eta_1, \dots, \eta_n$  下的坐标为  $\begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \end{pmatrix}^T$ ,

$\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix}^T$  与  $\begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \end{pmatrix}^T$  之间存在着什么联系？

这取决于  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  与  $\eta_1, \dots, \eta_n$  之间的数量关系。

# 形式记法

向量的线性组合式:  $\xi = x_1\epsilon_1 + x_2\epsilon_2 + \cdots + x_k\epsilon_k$  可表示为

$$\xi = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_k] \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$$

# 形式记法

向量的线性组合式:  $\xi = x_1\epsilon_1 + x_2\epsilon_2 + \cdots + x_k\epsilon_k$  可表示为

$$\xi = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_k] \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_k \end{pmatrix}$$

这是借用矩阵乘法的形式而采用的表示法。不能认为是矩阵乘法。类似，一组向量的线性组合式：

# 形式记法

向量的线性组合式:  $\xi = x_1\epsilon_1 + x_2\epsilon_2 + \cdots + x_k\epsilon_k$  可表示为

$$\xi = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_k] \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_k \end{pmatrix}$$

这是借用矩阵乘法的形式而采用的表示法。不能认为是矩阵乘法。类似, 一组向量的线性组合式:

$$\begin{cases} \eta_1 = x_{11}\epsilon_1 + \cdots + x_{1k}\epsilon_k \\ \dots \\ \eta_s = x_{s1}\epsilon_1 + \cdots + x_{sk}\epsilon_k \end{cases}$$

# 基底变换与坐标变换

表示为  $[\eta_1, \dots, \eta_s] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_k] \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{s1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{1k} & \dots & x_{sk} \end{pmatrix}$

# 基底变换与坐标变换

表示为  $[\eta_1, \dots, \eta_s] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_k] \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{s1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{1k} & \dots & x_{sk} \end{pmatrix}$

回到  $\eta$  这组基和  $\epsilon$  这组基的关系。 $\eta$  这组向量在  $\epsilon$  基下都有坐标：

$$[\eta_1, \dots, \eta_n] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n] \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{1n} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$



# 基底变换与坐标变换

表示为  $[\eta_1, \dots, \eta_s] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_k] \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{s1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{1k} & \dots & x_{sk} \end{pmatrix}$

回到  $\eta$  这组基和  $\epsilon$  这组基的关系。 $\eta$  这组向量在  $\epsilon$  基下都有坐标：

$$[\eta_1, \dots, \eta_n] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n] \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{1n} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

最后这个矩阵称为由  $\epsilon$  这个基到  $\eta$  这个基的过渡矩阵。后面用  $M$  表示。

# 基底变换与坐标变换

向量  $\alpha$  在  $\varepsilon$  这个基下的坐标为  $X$ , 在  $\eta$  这个基下的坐标为  $Y$ ,

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$$

# 基底变换与坐标变换

向量  $\alpha$  在  $\varepsilon$  这个基下的坐标为  $X$ , 在  $\eta$  这个基下的坐标为  $Y$ ,

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$$

于是有:

$$\begin{aligned} \alpha &= [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n]X = [\eta_1, \dots, \eta_n]Y \\ &= ([\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n]M)Y = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n](MY) \end{aligned}$$

# 基底变换与坐标变换

所以  $X = MY$ 。

# 基底变换与坐标变换

所以  $X = MY$ 。

练习:  $R^3$  的两个基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ;

$\beta_1, \beta_2, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

求由基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的过渡矩阵  $P$ 。

# 基底变换与坐标变换

由基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的过渡矩阵  $P$  满足

$$\begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{pmatrix} P,$$

设  $P = (p_{ij})_{3 \times 3}$ , 则上式就是

$$\beta_1 = p_{11}\alpha_1 + p_{21}\alpha_2 + p_{31}\alpha_3$$

$$\beta_2 = p_{12}\alpha_1 + p_{22}\alpha_2 + p_{32}\alpha_3$$

$$\beta_3 = p_{13}\alpha_1 + p_{23}\alpha_2 + p_{33}\alpha_3$$

# 基底变换与坐标变换

由基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的过渡矩阵  $P$  满足

$$\begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{pmatrix} P,$$

设  $P = (p_{ij})_{3 \times 3}$ , 则上式就是

$$\beta_1 = p_{11}\alpha_1 + p_{21}\alpha_2 + p_{31}\alpha_3$$

$$\beta_2 = p_{12}\alpha_1 + p_{22}\alpha_2 + p_{32}\alpha_3$$

$$\beta_3 = p_{13}\alpha_1 + p_{23}\alpha_2 + p_{33}\alpha_3$$

因为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  和  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  为列向量, 所以以上式子可以表示为矩阵乘积形式, 即

# 基底变换与坐标变换

$$(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3)P = (\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3),$$

$$\text{其中 } (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$(\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



# 基底变换与坐标变换

计算:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

# 基底变换与坐标变换

计算:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

因此  $P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。