

南开大学 2019 级“一元函数积分（信）”结课统考试卷（A 卷）2019 年 12 月 30 日

草稿区

(说明：答案务必写在装订线右侧，写在装订线左侧无效。影响成绩后果自负。)

题号	一	二	三	四	五	六	七	卷面成绩	核分签名	复核签名
得分										

一、选择题(每小题 4 分)

$$-\frac{1}{2} \int f(1-x^2) d(1-x^2)$$

(1) 设 $\int f(x)dx = \sin x + C$, 则 $\int xf(1-x^2)dx =$ ():一题
得分(A) $2\sin(1-x^2) + C$; (B) $-2\sin(1-x^2) + C$; (C) $(1/2)\sin(1-x^2) + C$; (D) $-(1/2)\sin(1-x^2) + C$ (2) 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $F(x)$, 则 $\int f(2x)dx =$ ():

$$\frac{1}{2} \int f(2x) d(2x)$$

(A) $F(2x) + C$; (B) $F(x/2) + C$; (C) $(1/2)F(2x) + C$; (D) $2F(x/2) + C$ (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[-\delta, \delta]$ 上有二次导数, $\delta > 0$, $f''(x) > 0$, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 则 $I = \int_{-\delta}^{\delta} f(x)dx$ 满足 ():(A) $I = 0$; (B) $I > 0$; (C) $I < 0$; (D) 正负号不确定

$$\int_0^{\pi/2} + \int_{\pi/2}^{\pi} \int_0^x |\sin t| dt$$

(4) 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{0}{x} =$ ():


$$\int_0^{\pi/2} |\sin t| dt = \frac{x}{\pi} \int_0^{\pi} \sin t dt = -\cos t \Big|_0^{\pi} = 2.$$

(A) 1; (B) 0; (C) 不存在; (D) $2/\pi$ (5) 设 $z = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$, 则该函数在 $(0, 0)$ 点 ():

(A) 连续, 且偏导数存在, 但不可微; (B) 不连续; (C) 连续, 但偏导数不存在; (D) 可微

$$\int_0^{\pi/2} |\sin t| dt + \int_{\pi/2}^{\pi} |\sin t| dt.$$

$$n \int_0^{\pi} \sin t dt.$$



姓名

姓名

学号

专业

任课教师

$$\text{设 } f(x) = \underline{x-a}$$

$$\int_0^1 t(t-a) dt = \frac{1}{3}t^3 \Big|_0^1 - \frac{a}{2}t^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{a}{2} = a.$$

$$\frac{2}{3}a = \frac{1}{3}$$

草稿区

二、填空题（每小题 4 分）：

(1) 设 $f(x)$ 是连续函数，满足 $f(x) = x - \int_0^x f(t) dt$ ，则 $f(x) = \underline{x - \frac{2}{9}}$

二题
得分

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^x = x^2 + y^2$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,0)} = \underline{\quad\quad}$

(3) 原点到平面 $2x + 2y + z - 9 = 0$ 的距离为 $\underline{\frac{9\sqrt{3}}{4}}$

(4) 设一平面过原点和点 $(6, -3, 2)$ ，且与平面 $4x - y + 2z = 7$ 垂直，则此平面方程为 $\underline{2x + 2y - 3z = 0}$

(5) 曲线 $y = x^2$ ， $(0 \leq x \leq 1)$ ，绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 $\underline{\frac{\pi}{2}}$

三、求下列不定积分：（每小题 6 分）

(1) $\int \frac{x+1}{x(x^2+1)} dx$;

$$= \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x-1}{x^2+1} \right) dx$$

$$= \ln|x| - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx = \int (\tan^2 x + 1)^2 d \tan x$$

(3) $\int x \sin^2 x dx$;

$$= \int \frac{x}{2} dx - \frac{1}{2} \int x \cos 2x dx$$


$$= \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} \int x d \sin 2x$$

(2) $\int \sec^6 x dx$;

$$= \int \sec^4 x d \tan x$$

$$= \int (t^4 + 2t^2 + 1) dt$$

$$= \frac{1}{5} (\tan x)^5 + \frac{2}{3} (\tan x)^3 + \tan x + C.$$

三题
得分

$$dV = dy \cdot \pi x^2 = \pi y dy$$

$$\pi \int_0^1 y dy$$

姓名

学号

专业

任课教师

$$= \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4} \left[x \sin 2x - \int \sin 2x dx \right]$$

+ C.

四、求下列定积分（每小题 7 分）：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= (1) \int_0^1 \ln(1+\sqrt{x}) dx; \\ &= \ln(1+\sqrt{x}) \cdot x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} x}{1+\sqrt{x}} dx \\ &= \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+3\cos^2 x}; \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x} \frac{1}{\sec^2 x + 3} dx \end{aligned}$$

$$= \int \frac{1}{\tan^2 x + 4} d \tan x \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 dx = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{\tan x}{2}\right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

五、(7 分) 设 $f(x) = x \int_1^x \frac{\arctan t^2}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 f(x) dx$.四题
得分

$$-\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx \stackrel{\sqrt{x}=t}{=} -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{1+t} dt$$

$$(3) \int_{-2}^0 x \ln(1+e^x) dx$$

$$\int_{-2}^0 x \ln(e^x+1) dx$$

$$= \int_{-2}^0 x \ln e^x (e^{-x}+1) dx$$

$$= \int_{-2}^0 x (x + \ln(e^{-x}+1)) dx$$

$$= \int_{-2}^0 x^2 dx + \int_{-2}^0 x \ln(e^{-x}+1) dx$$

$$= \frac{8}{3} + \int_{-2}^0 (-t) \ln(e^t+1) d(1-t) \quad x=-t$$

五题
得分

$$= \frac{8}{3} - \int_0^2 t \ln(e^t+1) dt$$

草稿区

姓名

学号

专业

任课教师



六、(8分) 设二元函数 $f(u,v)$ 具有连续二阶偏导数, $z = f(2x + 3y, x + y)$,

试求: $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

七题 得分	
----------	--

七、(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 在 $(0,2)$ 内可导,

且满足 $|f'(x)| \leq 1, f(0) = f(2) = 1$, 证明: $1 \leq \int_0^2 f(x) dx \leq 3$

七题 得分	
----------	--

草稿区