



DEPARTAMENTO  
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

# Práctica 2

2do cuatrimestre 2021

Álgebra I

Integrante	LU	Correo electrónico
Yago Pajariño	546/21	ypajarino@dc.uba.ar



**Facultad de Ciencias Exactas y Naturales**

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

# Índice

<b>2. Práctica 2</b>	<b>2</b>
2.1. Ejercicio 1 . . . . .	2
2.2. Ejercicio 2 . . . . .	2
2.3. Ejercicio 3 . . . . .	2
2.4. Ejercicio 4 . . . . .	3
2.5. Ejercicio 5 . . . . .	3
2.6. Ejercicio 6 . . . . .	4
2.7. Ejercicio 7 . . . . .	5
2.8. Ejercicio 8 . . . . .	8
2.9. Ejercicio 9 . . . . .	8
2.10. Ejercicio 10 . . . . .	10

## 2. Práctica 2

### 2.1. Ejercicio 1

1. (a)  $\sum_{i=1}^{100} i$   
(b)  $\sum_{i=1}^{10} i^2$   
(c)  $\sum_{i=1}^{12} (-1)^i \cdot i^2$   
(d)  $\sum_{i=1 \wedge i \text{ impar}}^{21} i^2$   
(e)  $\sum_{i=0}^n 2i + 1$   
(f)  $\sum_{i=1}^n i \cdot n$
2. (a)  $\frac{100!}{4!}$   
(b)  $\prod_{i=1}^{10} 2^i$   
(c)  $\prod_{i=1}^n i \cdot n$

### 2.2. Ejercicio 2

- (a)  $2 + 4 ; 2(n - 6) + 2(n - 5)$
- (b)  $\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} ; \frac{1}{(2n-1) \cdot 2n} + \frac{1}{2n \cdot (2n+1)}$
- (c)  $\frac{n+1}{2} + \frac{n+2}{4} ; \frac{n+n-1}{2 \cdot (n-1)} + \frac{2n}{2n}$
- (d)  $n + \frac{n}{2} ; \frac{n}{n^2-1} + \frac{n}{n^2}$
- (e)  $-(n+1) \cdot (n+2) ; \frac{n+n-1}{2(n-1)-3} \cdot \frac{2n}{2n-3}$

### 2.3. Ejercicio 3

- (a)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (4i + 1) &= \sum_{i=1}^n 4i + \sum_{i=1}^n 1 \\ &= 4 \cdot \sum_{i=1}^n i + n \\ &= 4 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} + n \\ &= 2 \cdot n(n+1) + n \\ &= 2n^2 + 3n\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\sum_{i=6}^n 2(i-5) &= 2 \sum_{i=6}^n (i-5) \\&= 2 \left( \sum_{i=6}^n i - \sum_{i=6}^n 5 \right) \\&= 2 \left( \left( \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^5 i \right) - \left( \sum_{i=1}^n 5 - \sum_{i=1}^5 5 \right) \right) \\&= 2 \left( \left( \frac{n(n+1)}{2} - 15 \right) - (5n - 25) \right) \\&= 2 \left( \left( \frac{n(n+1) - 30}{2} \right) - 5(n+5) \right) \\&= n(n+1) - 30 - 10(n+5) \\&= n^2 + n - 30 - 10n - 50 \\&= n^2 - 9n - 80\end{aligned}$$

## 2.4. Ejercicio 4

(a)  $\sum_{i=0}^n 2^i = n^{n+1} - 1$

(b)  $\sum_{i=1}^n q^i = \begin{cases} \frac{q^{n+1}-2}{q-1} & q \neq 1 \\ n & q = 1 \end{cases}$

(c)  $\sum_{i=1}^n q^{2i} = \sum_{i=1}^n (q^2)^i = \begin{cases} \frac{(q^2)^{n+1}-1}{q^2-1} & q \neq 1 \\ n+1 & q = 1 \end{cases}$

(d)  $\sum_{i=n}^{2n} q^i = \sum_{i=0}^{2n} q^i - \sum_{i=0}^{n-1} q^i = \begin{cases} \frac{q^{2n+1}-q^n}{q-1} & q \neq 1 \\ n+1 & q = 1 \end{cases}$

## 2.5. Ejercicio 5

Usando la suma aritmética:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (2i-1) &= \sum_{i=1}^n 2i - \sum_{i=1}^n 1 \\&= 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n \\&= n^2 + n - n \\&= n^2\end{aligned}$$

Usando el principio de inducción:

Defino el predicado  $p(n) : \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2; \forall n \in \mathbb{N}$

Caso base  $n = 1$

$$\sum_{i=1}^1 (2i-1) = 2-1 = 1$$

$$n^2 = 1^2 = 1$$

Luego el caso base es verdadero.

Paso inductivo

Quiero probar que para  $k \geq 1$ ,  $p(k) \implies p(k+1)$

HI:  $\sum_{i=1}^k (2i-1) = k^2$

QpQ:  $\sum_{i=1}^{k+1} (2i-1) = (k+1)^2$

Pero,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} (2i-1) &= \sum_{i=1}^k (2i-1) + 2(k+1) - 1 \\ &= k^2 + 2(k+1) - 1 \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k+1)^2\end{aligned}$$

Luego el paso inductivo es verdadero. Por lo tanto  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$

## 2.6. Ejercicio 6

### 2.6.A. Pregunta i

Prueba por inducción:

Defino el predicado  $p(n) : \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

**Caso base n = 1**

$$\sum_{i=1}^1 i^2 = 1^2 = 1$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo**

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } \sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

$$\text{QpQ: } \sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2(k+1)+1)}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

Pero,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= \sum_{i=1}^k i^2 + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2\end{aligned}$$

Entonces necesito probar que,

$$\begin{aligned}&\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \\ \iff &\frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \\ \iff &k(2k+1) + 6(k+1) = (k+2)(2k+3) \\ \iff &2k^2 + k + 6k + 6 = 2k^2 + 3k + 4k + 6 \\ \iff &2k^2 + 7k + 6 = 2k^2 + 7k + 6\end{aligned}$$

Luego  $\sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$  como se quería probar, el paso inductivo el verdadero.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

## 2.6.B. Pregunta ii

Defino el predicado  $p(n) : \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

**Caso base n = 1**

$$\sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 = 1$$

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo**

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } \sum_{i=1}^k i^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

$$\text{QpQ: } \sum_{i=1}^{k+1} i^3 = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$$

Pero,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i^3 &= \sum_{i=1}^k i^3 + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} \end{aligned}$$

Luego debo probar,

$$\begin{aligned} \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ \iff k^2 + 4(k+1) &= k^2 + 4k + 4 \\ \iff k^2 + 4k + 4 &= k^2 + 4k + 4 \end{aligned}$$

Luego  $p(k) \implies p(k+1); \forall k \geq 1$ , como se quería probar.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

## 2.7. Ejercicio 7

### 2.7.A. Pregunta i

Prueba por inducción:

Defino el predicado  $p(n) : \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \cdot i^2 = \frac{(-1)^{n+1} \cdot n(n+1)}{2}$

**Caso base n = 1**

$$\sum_{i=1}^1 (-1)^{i+1} \cdot i^2 = (-1)^2 \cdot 1^2 = 1$$

$$\frac{(-1)^{1+1} \cdot 1(1+1)}{2} = \frac{(-1)^2 \cdot 1(2)}{2} = 1$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo**

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } \sum_{i=1}^k (-1)^{i+1} \cdot i^2 = \frac{(-1)^{k+1} \cdot k(k+1)}{2}$$

QpQ:  $\sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i+1} \cdot i^2 = \frac{(-1)^{k+2} \cdot (k+1)(k+2)}{2}$

Pero,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i+1} \cdot i^2 &= \sum_{i=1}^k (-1)^{i+1} \cdot i^2 + (-1)^{k+2} \cdot (k+1)^2 \\ &= \frac{(-1)^{k+1} \cdot k(k+1)}{2} + (-1)^{k+2} \cdot (k+1)^2 \\ &= \frac{(-1)^{k+1} \cdot k(k+1) + 2 \cdot (-1)^{k+2} \cdot (k+1)^2}{2} \end{aligned}$$

Luego debo probar,

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^{k+1} \cdot k(k+1) + 2 \cdot (-1)^{k+2} \cdot (k+1)^2}{2} &= \frac{(-1)^{k+2} \cdot (k+1)(k+2)}{2} \\ (-1)^{k+1} \cdot k(k+1) + 2 \cdot (-1)^{k+2} \cdot (k+1)^2 &= (-1)^{k+2} \cdot (k+1)(k+2) \\ (-1)^{k+1} \cdot k + 2 \cdot (-1)^{k+2} \cdot (k+1) &= (-1)^{k+2} \cdot (k+2) \\ -k + 2 \cdot (k+1) &= k+2 \\ k+2 &= k+2 \end{aligned}$$

Luego  $p(k) \implies p(k+1); \forall k \geq 1$ , como se quería probar.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

## 2.7.B. Pregunta ii

Prueba por inducción:

Defino el predicado  $p(n) : \sum_{i=1}^n (2i+1) \cdot 3^{i-1} = n \cdot 3^n$

**Caso base n = 1**

$$\sum_{i=1}^1 (2i+1) \cdot 3^{i-1} = 3$$

$$n \cdot 3^n = 3$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo**

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } \sum_{i=1}^k (2i+1) \cdot 3^{i-1} = k \cdot 3^k$$

$$\text{QpQ: } \sum_{i=1}^{k+1} (2i+1) \cdot 3^{i-1} = (k+1) \cdot 3^{k+1}$$

Pero,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} (2i+1) \cdot 3^{i-1} &= \sum_{i=1}^k (2i+1) \cdot 3^{i-1} + (2(k+1)+1) \cdot 3^k \\ &= k \cdot 3^k + (2k+2+1) \cdot 3^k \\ &= 3^k \cdot (k+2k+3) \\ &= 3^k \cdot (3k+3) \\ &= 3^k \cdot 3(k+1) \\ &= 3^k \cdot 3(k+1) \\ &= (k+1) 3^{k+1} \end{aligned}$$

Luego  $p(k) \implies p(k+1); \forall k \geq 1$ , como se quería probar.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

### 2.7.C. Pregunta iii

Prueba por inducción:

Defino el predicado  $p(n) : \sum_{i=1}^n \frac{i \cdot 2^i}{(i+1)(i+2)} = \frac{2^{n+1}}{n+2} - 1$

**Caso base n = 1**

$$\sum_{i=1}^1 \frac{i \cdot 2^i}{(i+1)(i+2)} = \frac{2^1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{2^{1+1}}{1+2} - 1 = \frac{2^2}{3} - 1 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo**

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } \sum_{i=1}^k \frac{i \cdot 2^i}{(i+1)(i+2)} = \frac{2^{k+1}}{k+2} - 1$$

$$\text{QpQ: } \sum_{i=1}^{k+1} \frac{i \cdot 2^i}{(i+1)(i+2)} = \frac{2^{k+2}}{k+3} - 1$$

Pero,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} \frac{i \cdot 2^i}{(i+1)(i+2)} &= \sum_{i=1}^k \frac{i \cdot 2^i}{(i+1)(i+2)} + \frac{(k+1) \cdot 2^{k+1}}{(k+2)(k+3)} \\ &= \frac{2^{k+1}}{k+2} - 1 + \frac{(k+1) \cdot 2^{k+1}}{(k+2)(k+3)} \end{aligned}$$

Luego debo probar,

$$\begin{aligned} \frac{2^{k+1}}{k+2} - 1 + \frac{(k+1) \cdot 2^{k+1}}{(k+2)(k+3)} &= \frac{2^{k+2}}{k+3} - 1 \\ \frac{(k+3)2^{k+1}}{k+2} + \frac{(k+1) \cdot 2^{k+1}}{k+2} &= 2^{k+2} \\ \frac{(k+3)2^{k+1} + (k+1) \cdot 2^{k+1}}{k+2} &= 2^{k+2} \\ 2^{k+1}(k+3+k+1) &= 2^{k+2} \cdot (k+2) \\ 2k+4 &= 2k+4 \end{aligned}$$

Luego  $p(k) \implies p(k+1); \forall k \geq 1$ , como se quería probar.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

### 2.7.D. Pregunta iv

Prueba por inducción:

Defino el predicado  $p(n) : \prod_{i=1}^n (1 + a^{2^{i-1}}) = \frac{1-a^{2^n}}{1-a}$

**Caso base n = 1**

$$\prod_{i=1}^1 (1 + a^{2^{i-1}}) = 1 + a$$

$$\frac{1-a^{2^1}}{1-a} = \frac{1-a^2}{1-a} = \frac{(1-a)(1+a)}{1-a} = 1 + a$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo**

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } \prod_{i=1}^k (1 + a^{2^{i-1}}) = \frac{1-a^{2^k}}{1-a}$$



$$\text{QpQ: } \prod_{i=1}^{k+1} (1 + a^{2^{i-1}}) = \frac{1 - a^{2^{k+1}}}{1 - a}$$

Pero,

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{k+1} (1 + a^{2^{i-1}}) &= \prod_{i=1}^k (1 + a^{2^{i-1}}) \cdot (1 + a^{2^k}) \\ &= \frac{1 - a^{2^k}}{1 - a} \cdot (1 + a^{2^k}) \\ &= \frac{(1 - a^{2^k}) \cdot (1 + a^{2^k})}{1 - a} \\ &= \frac{1 - a^{2^{k+1}}}{1 - a} \end{aligned}$$

Luego  $p(k) \implies p(k+1); \forall k \geq 1$ , como se quería probar.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

## 2.8. Ejercicio 8

Prueba por inducción.

Defino el predicado  $p(n) : a^n - b^n = (a - b) \cdot \sum_{i=1}^n a^{i-1} \cdot b^{n-i}$

**Caso base n = 1**

$$a^1 - b^1 = a - b$$

$$(a - b) \cdot \sum_{i=1}^1 a^{i-1} \cdot b^{1-i} = (a - b) \cdot 1 = a - b$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo**

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } a^k - b^k = (a - b) \cdot \sum_{i=1}^k a^{i-1} \cdot b^{k-i}$$

$$\text{QpQ: } a^{k+1} - b^{k+1} = (a - b) \cdot \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} \cdot b^{k+1-i}$$

Pero,

TODO

## 2.9. Ejercicio 9

### 2.9.A. Pregunta i

Defino  $p(n) : \sum_{i=1}^n a_{i+1} - a_i = a_{n+1} - a_1$

**Caso base n = 1**

$$\sum_{i=1}^1 a_{i+1} - a_i = a_2 - a_1$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo**

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } \sum_{i=1}^k a_{i+1} - a_i = a_{k+1} - a_1$$

$$\text{QpQ: } \sum_{i=1}^{k+1} a_{i+1} - a_i = a_{k+2} - a_1$$

Pero,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{k+1} a_{i+1} - a_i &= \sum_{i=1}^k a_{i+1} - a_i + a_{k+2} - a_{k+1} \\
&= a_{k+1} - a_1 + a_{k+2} - a_{k+1} \\
&= -a_1 + a_{k+2} \\
&= a_{k+2} - a_1
\end{aligned}$$

Luego  $p(k) \implies p(k+1); \forall k \geq 1$ , como se quería probar.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

### 2.9.B. Pregunta ii

Luego de probar con los casos  $n \in \{1, 2, 3\}$  conjeturo y defino el predicado  $p(n) : \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$

Prueba por inducción:

**Caso base n = 1**

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^1 \frac{1}{i(i+1)} &= \frac{1}{2} \\
\frac{1}{1+1} &= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo**

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } \sum_{i=1}^k \frac{1}{i(i+1)} = \frac{k}{k+1}$$

$$\text{QpQ: } \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{k+1}{k+2}$$

Pero,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i(i+1)} &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{i(i+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= \frac{(k+2)k+1}{(k+1)(k+2)}
\end{aligned}$$

Luego alcanza probar que:

$$\begin{aligned}
\frac{(k+2)k+1}{(k+1)(k+2)} &= \frac{k+1}{k+2} \\
\frac{k^2+2k+1}{(k+1)(k+2)} &= \frac{k+1}{k+2} \\
\frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)} &= \frac{k+1}{k+2} \\
\frac{k+1}{k+2} &= \frac{k+1}{k+2}
\end{aligned}$$

Luego  $p(k) \implies p(k+1); \forall k \geq 1$ , como se quería probar.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

### 2.9.C. Pregunta iii

Luego de probar con los casos  $n \in \{1, 2, 3, 4\}$  conjeturo y defino el predicado  $p(n) : \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n}{2n+1}$

Prueba por inducción:

### Caso base $n = 1$

$$\sum_{i=1}^1 \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{1}{3}$$

Luego el caso base  $p(1)$  es verdadero.

### Paso inductivo

Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } \sum_{i=1}^k \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

$$\text{QpQ: } \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{k+1}{2(k+1)+1}$$

Pero,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} + \frac{1}{(2(k+1)-1)(2(k+1)+1)} \\ &= \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \end{aligned}$$

Luego alcanza probar que,

$$\begin{aligned} \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} &= \frac{k+1}{2(k+1)+1} \\ \frac{(2k+3) \cdot k + 1}{(2k+1)(2k+3)} &= \frac{k+1}{2k+3} \\ (2k+3) \cdot k + 1 &= (k+1)(2k+1) \\ 2k^2 + 3k + 1 &= 2k^2 + k + 2k + 1 \\ 2k^2 + 3k + 1 &= 2k^2 + 3k + 1 \end{aligned}$$

Luego  $p(k) \implies p(k+1); \forall k \geq 1$ , como se quería probar.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

## 2.10. Ejercicio 10

### 2.10.A. Pregunta i

Defino  $p(n) : 3^n + 5^n \geq 2^{n+2}$

### Caso base $n = 1$

$$3^1 + 5^1 = 3 + 5 = 8$$

$$2^{1+2} = 2^3 = 8$$

Como  $8 \geq 8$  el caso base  $p(1)$  es verdadero.

**Paso inductivo** Para todo  $k \geq 1 : p(k) \implies (k+1)$

$$\text{HI: } 3^k + 5^k \geq 2^{k+2}$$

$$\text{QpQ: } 3^{k+1} + 5^{k+1} \geq 2^{k+3}$$

Pero,

$$\begin{aligned}3^{k+1} + 5^{k+1} &= 3 \cdot 3^k + 5 \cdot 5^k \\&= 3 \cdot 3^k + 3 \cdot 5^k + 2 \cdot 5^k \\&= 3 \cdot (3^k + 5^k) + 2 \cdot 5^k\end{aligned}$$

Por hipótesis inductiva:

$$3 \cdot (3^k + 5^k) + 2 \cdot 5^k \geq 3 \cdot 2^{k+2} + 2 \cdot 5^k$$

Luego alcanza con probar que,

$$\begin{aligned}3 \cdot 2^{k+2} + 2 \cdot 5^k &\geq 2^{k+3} \\3 \cdot 2^{k+2} + 2 \cdot 5^k - 2 \cdot 2^{k+2} &\geq 0 \\2^{k+2} + 2 \cdot 5^k &\geq 0\end{aligned}$$

Pero  $k \geq 1 \implies (2^{k+2} \geq 8 \wedge 2 \cdot 5^k \geq 10)$  y en particular  $2^{k+2} + 2 \cdot 5^k \geq 0$  como se quería probar.

Luego  $p(k) \implies p(k+1); \forall k \geq 1$ , como se quería probar.

Por lo tanto,  $p(n)$  es verdadero,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .