

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)»

Институт информационных технологий, математики и механики
Кафедра алгебры, геометрии и дискретной математики

ОТЧЕТ
по учебно-технологической практике

на тему:
Структура множества целочисленных решений матричного уравнения
 $AX = XB$

Выполнил:

студент группы 3825М1ПМкн1
Сучков В.Н.

Подпись:

Научный руководитель:

доцент каф. АГДМ, к.ф.-м.н.,
Сидоров С.В.

Подпись:

Нижний Новгород
2025

Содержание

Введение	1
Свойства множества $M_{J,J}$	2
Характеристическая функция для $\Lambda_{J,J}$	6
Случай одного собственного числа	6
Случай различных собственных чисел	7
Переход от $\Lambda_{J,J}$ к $\Lambda_{A,B}$	9
Список литературы	10

Введение

Пусть есть матрицы $A, B \in \mathbb{Z}^{n \times n}$. Множество решений уравнения $AX = XB$ над $\mathbb{Q}^{n \times n}$ обозначим как $M_{A,B} = \{X \in \mathbb{Q}^{n \times n} | AX = XB\}$. Тогда множество целочисленных решений есть $\Lambda_{A,B} = M_{A,B} \cap \mathbb{Z}^{n \times n}$. Суть настоящей работы заключается в изучении структуры множества $\Lambda_{A,B}$, а в особенности, его связь с множеством $M_{J,J}$, где J - жорданова нормальная форма матриц A и B .

Свойства множества $M_{J,J}$

Опишем несколько полезных свойств матриц из $M_{A,B}$, которые окажутся полезными в дальнейшем. Пусть J - рациональная жорданова нормальная форма матриц A и B обладающих целочисленным спектром. Обозначим S_A и S_B соответствующие трансформирующие матрицы над $\mathbb{Q}$, такие что $AS_A = S_A J$ и $BS_B = S_B J$. Известно, что $M_{A,B} = S_A M_{J,J} S_B^{-1}$ (Лемма 1 из [1]). Это равенство устанавливает связь между множествами $M_{A,B}$ и $M_{J,J}$, элементы последнего из которых суть решения уравнения $JX = XJ$.

Определение 1. Матрицу T размера $m \times n$ будем называть обобщенно-верхне-треугольной, если она имеет один из следующих видов:

- 1) Если $m = n$, T - квадратная верхне-треугольная матрица;
- 2) Если $m < n$, $T = \begin{pmatrix} 0 & T' \end{pmatrix}$, где T' - квадратная верхне-треугольная матрица порядка m ;
- 3) Если $m > n$, $T = \begin{pmatrix} T' \\ 0 \end{pmatrix}$, где T' - квадратная верхне-треугольная матрица порядка n ;

Если в каждом из трех случаев у верхне-треугольной матрицы любая наддиагональ состоит из одинаковых элементов, то такую обобщенно-верхне-треугольную матрицу назовем **правильной верхне-треугольной**.

Матрицы $X \in M_{J,J}$ имеют блочно-диагональный вид ([2], с. 199) $X = \text{diag}(X^{(1)}, \dots, X^{(s)})$, где s - число различных собственных чисел α_k , $k = \overline{1, s}$ матриц A и B . Каждый из диагональных блоков сам по себе имеет блочную структуру. Блоки матрицы $X^{(k)}$ обозначим как $X_{ij}^{(k)}$, $i, j = \overline{1, p_k}$, где p_k - число жордановых клеток, соответствующих собственному числу α_k . Каждый блок $X_{ij}^{(k)}$ имеем правильный верхне-треугольный вид.

Пример 1. Рассмотрим жорданову форму вида

$$J = \left(\begin{array}{cc|cc|c} a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & a \end{array} \right)$$

В данном случае собственное число всего одно, так что произвольная матрица X из $M_{J,J}$ будет иметь вид

$$X = \left(\begin{array}{cc|cc|c} x_{11}^{(1)} & x_{11}^{(2)} & x_{12}^{(1)} & x_{12}^{(2)} & x_{13}^{(1)} \\ 0 & x_{11}^{(1)} & 0 & x_{12}^{(1)} & 0 \\ \hline x_{21}^{(1)} & x_{21}^{(2)} & x_{22}^{(1)} & x_{22}^{(2)} & x_{23}^{(1)} \\ 0 & x_{21}^{(1)} & 0 & x_{22}^{(1)} & 0 \\ \hline 0 & x_{31}^{(1)} & 0 & x_{32}^{(1)} & x_{33}^{(1)} \end{array} \right)$$

Обозначим t_i размер i -го блока ($i = 1, 2, 3$). Найдем определитель матрицы X применяя теорему Лапласа. Для разложения определителя выберем столбцы с номерами $1, 1+t_1, 1+t_1+t_2$, то есть первый столбец в каждом из блочных столбцов матрицы X . Не трудно проверить, что все миноры 3-го порядка лежащие на пересечении выбранных столбцов и строк с номерами отличными от $1, 1+t_1, 1+t_1+t_2$ будут равны нулю, так как будут содержать хотя бы одну нулевую строку. Обозначим оставшийся ненулевой минор M и дополнительный к нему M_1 . Тогда, в соответствии с теоремой Лапласа, $\det X = MM_1$. Выпишем эти миноры.

$$M = \begin{vmatrix} x_{11}^{(1)} & x_{12}^{(1)} & x_{13}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} & x_{22}^{(1)} & x_{23}^{(1)} \\ 0 & 0 & x_{33}^{(1)} \end{vmatrix}, M_1 = \begin{vmatrix} x_{11}^{(1)} & x_{12}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} & x_{22}^{(1)} \end{vmatrix}$$

В свою очередь минор M можно разложить по третьей строке и в результате имеем

$$\det X = x_{33}^{(1)} \begin{vmatrix} x_{11}^{(1)} & x_{12}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} & x_{22}^{(1)} \end{vmatrix}^2$$

То есть, мы представили определитель матрицы X (в случае одного собственного числа) в виде $\det X = D_1 \cdot D_2^2$, где D_i это некоторые миноры. В дальнейшем будет установлено, что порядок i -го минора из произведения это число блоков совпадающего порядка, а степень равна порядку этих блоков.

Лемма 1. Пусть $X \in M_{J,J} = \text{diag}(X_1, X_2, \dots, X_s)$. Рассмотрим диагональный блок соответствующий некоторому собственному числу X_l – блочная матрица с блоками X_{ij} размера $t_i \times t_j$, $i, j = \overline{1, m}$ имеющими правильную верхне-треугольную структуру с элементами, стоящими на наддиагонали с соответственно равными $x_{ij}^{(s)}$ ($s = 1$ – главная диагональ) и пусть размеры блоков t_k упорядочены следующим образом: $t_1 = t_2 = \dots = t_{m_1} > t_{m_1+1} = t_{m_1+2} = \dots = t_{m_2} > \dots > t_{m_{\beta-1}+1} = \dots = t_{m_\beta}$. Тогда определитель $\det X$ имеет следующий вид:

$$\det X_l = D_1^{t_{m_1}} \cdot D_2^{t_{m_2}} \cdot \dots \cdot D_\beta^{t_{m_\beta}}$$

, где D_k – миноры матрицы X порядка m_k вида:

$$D_k = \begin{vmatrix} x_{m_{k-1}+1, m_{k-1}+1}^{(1)} & x_{m_{k-1}+1, m_{k-1}+2}^{(1)} & \dots & x_{m_{k-1}+1, m_{k-1}+m_k}^{(1)} \\ x_{m_{k-1}+2, m_{k-1}+1}^{(1)} & x_{m_{k-1}+2, m_{k-1}+2}^{(1)} & \dots & x_{m_{k-1}+2, m_{k-1}+m_k}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m_{k-1}+m_k, m_{k-1}+1}^{(1)} & x_{m_{k-1}+m_k, m_{k-1}+2}^{(1)} & \dots & x_{m_{k-1}+m_k, m_{k-1}+m_k}^{(1)} \end{vmatrix}$$

и $m_0 = 1$.

Доказательство. Разложим определитель матрицы X_l используя теорему Лапласа следующим образом: выберем столбцы с номерами $1, 1 + t_1, \dots, 1 + \sum_{k=1}^m t_k$, и строки с аналогичными номерами. Полученный на пересечении выбранных строк и столбцов минор будет единственным отличным от нуля в сумме определителя. В самом деле, зафиксируем выбор столбцов и рассмотрим, как будут выглядеть миноры построенные на других строках. В сущности, в каждом из блоков мы выбрали первый столбец и можем выбирать строки. Всего возможно несколько видов блоков, в соответствии с определением 1. Рассмотрим произвольный блок X_{ij} . Если $t_i < t_j$, то блок имеет вид $\begin{pmatrix} 0 & X'_{ij} \end{pmatrix}$. В таком случае, очевидно, что первый столбец целиком будет состоять из нулей, а значит при любом выборе строк в минор на соответствующие позиции будут поставлены нули. Если $t_i = t_j$, то X_{ij} – квадратная матрица верхне-треугольного вида, а значит, все элементы первого столбца, кроме, возможно, первого, будут равны нулю. И, наконец, если $t_i > t_j$ то блок $X_{ij} = \begin{pmatrix} X'_{ij} \\ 0 \end{pmatrix}$ и X'_{ij} – квадратная верхне-треугольная матрица. В матрице X'_{ij} , как мы уже выяснили, все элементы кроме первого в первом столбце обязательно равны нулю, а в оставшейся подматрице и вовсе все элементы равны нулю. Таким образом, любой минор, стоящий на пересечении обозначенных выше столбцов и произвольных строк содержащий хотя бы одну строку отличную от строк с номерами $1, 1 + t_1, \dots, 1 + \sum_{k=1}^m t_k$ будет содержать тем самым нулевую строку, а значит будет равен нулю.

Обозначим M полученный таким образом минор и M_1 дополнительный к нему минор. Тогда $\det X_l = M \cdot M_1$.

Покажем, что $M = D_1 \cdot D_2 \cdot \dots \cdot D_\beta$. Рассмотрим среди строк с номерами $1, 1 + t_1, \dots, 1 + \sum_{i=1}^m t_i$ некоторую s -ую строку матрицы X соответствующую блочной строке с номером k ($X_{kl}, l = \overline{1, m}$).

Пусть k_1 наибольшее такое, что $t_{k_1} > t_k$. Тогда, в соответствии с определением 1 элементы, стоящие в строке s на позициях с номерами $1, 1 + t_1, \dots, 1 + \sum_{i=1}^{k_1-1} t_i$ будут равны нулю, так как они взяты из блоков вида $X_{kl} = \begin{pmatrix} 0 & X'_{kl} \end{pmatrix}, l = \overline{1, k_1}$ (в силу того, что $t_k < t_l$), в которых элемент, стоящий на пересечении первой строки и первого столбца равен нулю. Начиная с позиции $p = 1 + \sum_{i=1}^{k_1+1} t_i$ соответствующие блоки, содержащие элемент стоящий на пересечении s -ой строки и p -го столбца имеют один из двух оставшихся видов, а значит тот элемент, в общем случае, отличен от нуля. Если такого номера k_1 нет, то такая строка не обязательно начинается с нулей. Таким образом, минор M имеет ступенчатый вид:

$$M = \begin{array}{c|ccc|ccc|ccc|c} \begin{array}{c} x_{11}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} \\ \vdots \\ x_{m_1,1}^{(1)} \end{array} & \dots & \begin{array}{c} x_{1m_1}^{(1)} \\ x_{2m_1}^{(1)} \\ \ddots \\ x_{m_1,m_1}^{(1)} \end{array} & \dots & \dots & \dots & & & & \\ \hline 0 & \dots & 0 & x_{m_1+1,m_1+1}^{(1)} & \dots & x_{m_1+1,m_2}^{(1)} & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_{m_1+2,m_1+1}^{(1)} & \dots & x_{m_1+2,m_2}^{(1)} & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_{m_2,m_1+1}^{(1)} & \dots & x_{m_2,m_2}^{(1)} & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & x_{m_2+1,m_2+1}^{(1)} & \dots & x_{m_2+1,m_3}^{(1)} & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & x_{m_2+2,m_2+1}^{(1)} & \dots & x_{m_2+2,m_3}^{(1)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & x_{m_3,m_2+1}^{(1)} & \dots & x_{m_3,m_3}^{(1)} & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & * \end{array}$$

Заметим, что блоки стоящие на диагонали и есть $D_1, \dots, D_\beta$. В самом деле, исходя из того, как мы упорядочили величины t_k , количество нулей в начале строки k -го диагонального блока будет равно t_{k-1} . Применяя теорему Лапласа к этому минору и получим выражение $M = D_1 \cdot D_2 \cdot \dots \cdot D_\beta$.

Теперь рассмотрим вид дополнительного минора M_1 . Этот минор получен из матрицы X_l вычеркиванием строк и столбцов с номерами $1, 1 + t_1, \dots, 1 + \sum_{i=1}^m t_i$. То есть, в каждом блоке мы вычеркиваем первую строку и первый столбец. Полученная таким образом матрица будет иметь такую же структуру, как и исходная матрица, однако каждый её блок станет меньше, или вовсе будет окончательно удален. Таким образом, к минору M_1 можно применить тот же подход, что мы применяли к $\det X_l$ изначально, получив $M_1 = M^{(1)} \cdot M_2$. Минор $M^{(1)}$ будет также как и минор M раскладываться в произведение миноров $D_1, \dots, D_\beta$, однако, начиная с $t_{m_\beta} - 1$, минор с меньшим порядком D_β пропадет из $M^{(t_{m_\beta})}$, начиная с $t_{m_{\beta-1}} - 1$ разложение покинет минор $D_{\beta-1}$ и так далее. В результате, подставляя $M_l = M^{(l)} \cdot M_{l+1}$ и раскрывая значения соответствующих миноров, мы получим $\det X_l = M \cdot M_1 = M \cdot M^{(1)} \cdot M_2 = \dots = D_1^{t_{m_1}} \cdot D_2^{t_{m_2}} \cdot \dots \cdot D_\beta^{t_{m_\beta}} \quad \square$

В силу того, что матрица X имеет блочно-диагональную структуру $X = \text{diag}(X_1, X_2, \dots, X_s)$, то $\det X = \det X_1 \cdot \det X_2 \cdot \dots \cdot \det X_s$ и каждый из определителей $\det X_i$ раскладывается в соответствии с леммой 1.

Пусть матрицы $G_i, i = \overline{1, m}$ образуют базис в $M_{J,J}$. Рассмотрим для начала случай одного собственного числа. Упорядочим матрицы G_i таким образом, чтобы сначала шли матрицы, у которых единичными являются элементы на диагоналях квадратных блоков X_{ij} матриц $X_k, k = 1, \dots, s$, а остальные элементы являются нулевыми. Причём, нумерацию введём так, что-

бы матрицы X_k проходилась по блочным строкам справа налево. Напрмиер, если произвольная матрица $X \in M_{J,J}$ имеет вид

$$X = \left(\begin{array}{cc|cc|c} x_{11}^{(1)} & x_{11}^{(2)} & x_{12}^{(1)} & x_{12}^{(2)} & x_{13}^{(1)} \\ 0 & x_{11}^{(1)} & 0 & x_{12}^{(1)} & 0 \\ \hline x_{21}^{(1)} & x_{21}^{(2)} & x_{22}^{(1)} & x_{22}^{(2)} & x_{23}^{(1)} \\ 0 & x_{21}^{(1)} & 0 & x_{22}^{(1)} & 0 \\ \hline 0 & x_{31}^{(1)} & 0 & x_{32}^{(1)} & x_{33}^{(1)} \end{array} \right)$$

То базис $M_{J,J}$ запишем следующим образом

$$G_1 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), G_2 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), G_3 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

$$G_4 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), G_5 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Порядок остальных матриц из базиса выберем произвольно. Таким образом, всякая матрица из $M_{J,J}$ представима в виде линейной комбинации $X = \sum_{i=1}^m x_i G_i$. Рассмотрим функцию $f(x_1, \dots, x_m) = \det X$. Пользуясь леммой 1 получим, что $f(x_1, \dots, x_m) = (D_1(x_1, \dots, x_{k_1}))^{t_1} \cdot (D_2(x_{k_1+1}, \dots, x_{k_2}))^{t_2} \cdot \dots \cdot (D_p(x_{k_{p-1}+1}, \dots, x_{k_p}))^{t_p}$, где $k_i = \sum_{j=1}^i m_j$, где, в свою очередь, m_j порядок минора D_j (количество клеток соответствующих одному и тому же собственному числу порядка t_j).

Характеристическая функция для $\Lambda_{J,J}$

Случай одного собственного числа

Выберем некоторый базис T_i в $\Lambda_{J,J}$. В этом базисе запишем функцию $f(y_1, \dots, y_m) = \det \left(\sum_{i=1}^m y_i T_i \right)$.

Матрицы этого базиса можно выразить через базис G_i (описанной выше структуры) в $M_{J,J}$. Пусть

$T_i = \sum_{j=1}^m \beta_{ij} G_j$, $\beta_{ij} \in \mathbb{Q}$, тогда функция $f(y_1, \dots, y_m)$ примет вид

$$f(y_1, \dots, y_m) = \sum_{i=1}^m y_i \sum_{j=1}^m \beta_{ij} G_j$$

Внося y_i во внутреннюю сумму и меняя порядок суммирования получим

$$f(y_1, \dots, y_m) = \sum_{i=1}^m y_i \sum_{j=1}^m \beta_{ij} G_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^m \beta_{ij} y_i \right) G_j$$

Введем обозначения $z_j = \sum_{i=1}^m \beta_{ij} y_i$, тогда $f(z_1, \dots, z_m) = \det \left(\sum_{i=1}^m z_i G_i \right)$.

В соответствующую с леммой 1 функция $f(z_1, \dots, z_m)$ примет вид

$$f(z_1, \dots, z_m) = (D_1(z_1, \dots, z_{k_1}))^{t_1} \cdot \dots \cdot (D_p(z_{k_{p-1}+1}, \dots, z_{k_p}))^{t_p},$$

где $k_i = \sum_{j=1}^i m_j$, где, в свою очередь, m_j порядок минора D_j .

Каждый из миноров $D_i(z_{i_1}, z_{i_2}, \dots, z_{i_k})$ ($i_{s+1} = i_s + 1$) может быть записан в виде

$$D_i(z_{i_1}, \dots, z_{i_k}) = \sum_{j_1, \dots, j_k = i_1}^{i_k} \alpha_{j_1, \dots, j_k} z_{j_1} \dots z_{j_k}$$

Коэффициенты $\alpha_{j_1, \dots, j_k}$ принимают значения из множества $\{\pm 1, 0\}$. Подставляя теперь вместо z_i соответствующие суммы получим

$$\begin{aligned} D_i(z_{i_1}, \dots, z_{i_k}) &= \sum_{j_1, \dots, j_k = i_1}^{i_k} \alpha_{j_1, \dots, j_k} \left(\sum_{s=1}^m \beta_{s j_1} y_s \right) \cdot \dots \cdot \left(\sum_{s=1}^m \beta_{s j_k} y_s \right) = \\ &= \sum_{j_1, \dots, j_k = i_1}^{i_k} \sum_{s_1, \dots, s_k = 1}^m \bar{\beta}_{s_1, \dots, s_k}^{j_1, \dots, j_k} y_{s_1} \dots y_{s_k} = \sum_{s_1, \dots, s_k = 1}^m y_{s_1} \dots y_{s_k} \left(\sum_{j_1, \dots, j_k = i_1}^{i_k} \bar{\beta}_{s_1, \dots, s_k}^{j_1, \dots, j_k} \right) = \\ &= \sum_{s_1, \dots, s_k = 1}^m \hat{\beta}_i^{s_1, \dots, s_k} y_{s_1} \dots y_{s_k}, \end{aligned}$$

где, в свою очередь, $\bar{\beta}_{s_1, \dots, s_k}^{j_1, \dots, j_k} = \alpha_{j_1, \dots, j_k} \beta_{s_1 j_1} \dots \beta_{s_k j_k}$ и $\hat{\beta}_i^{s_1, \dots, s_k} = \sum_{j_1, \dots, j_k = i_1}^{i_k} \bar{\beta}_{s_1, \dots, s_k}^{j_1, \dots, j_k}$ (В данном случае,

в обозначении для результирующего коэффициента $\hat{\beta}_*^i$ можно использовать индекс i , так как каждому минору D_i , очевидно, соответствуют свои уникальные i_1 и i_k).

В результате, функцию $f(y_1, \dots, y_m)$ можно записать как

$$f(y_1, \dots, y_m) = \left(\sum_{s_1, \dots, s_{k_1} = 1}^m \hat{\beta}_{s_1, \dots, s_{k_1}}^1 y_{s_1} \dots y_{s_{k_1}} \right)^{t_1} \cdot \dots \cdot \left(\sum_{s_1, \dots, s_{k_p} = 1}^m \hat{\beta}_{s_1, \dots, s_{k_p}}^p y_{s_1} \dots y_{s_{k_p}} \right)^{t_p}$$

Теперь, отдельно рассмотрим коэффициенты $\hat{\beta}_{s_1, \dots, s_{k_i}}^i$. Обозначим Δ_i наименьшее общее кратное всех знаменателей коэффициентов $\hat{\beta}_*^i$ и $\delta_i = \text{gcd}(\Delta_i \hat{\beta}_{s_1, \dots, s_{k_i}}^i)$. Тогда, в каждой из скобок в выражении функции $f(y_1, \dots, y_m)$ можно вынести выражение $\frac{\delta_i}{\Delta_i} t_i$ и заменить старые коэффициенты на новые $\gamma_{s_1, \dots, s_{k_i}}^i = \frac{\Delta_i \hat{\beta}_{s_1, \dots, s_{k_i}}^i}{\delta_i}$. Несложно заметить, что по построению новые коэффициенты являются целыми числами. Тогда функцию $f(y_1, \dots, y_m)$ можно переписать следующим образом

$$f(y_1, \dots, y_m) = a \left(\sum_{s_1, \dots, s_{k_1}=1}^m \gamma_{s_1, \dots, s_{k_1}}^1 y_{s_1} \dots y_{s_{k_1}} \right)^{t_1} \cdot \dots \cdot \left(\sum_{s_1, \dots, s_{k_p}=1}^m \gamma_{s_1, \dots, s_{k_p}}^p y_{s_1} \dots y_{s_{k_p}} \right)^{t_p},$$

где $a = \left(\frac{\delta_1}{\Delta_1} \right)^{t_1} \cdot \dots \cdot \left(\frac{\delta_p}{\Delta_p} \right)^{t_p}$. Коэффициент a является целым в силу того, что суммы в скобках являются целыми (после введения новых коэффициентов), а также само значение функции, исходя из её определения, является целым числом.

Теорема 1. Пусть задана жорданова форма J некоторой матрицы с одним собственным числом. Характеристическая функция для модуля $\Lambda_{J,J}$ с базисом T_i , $i = \overline{1, m}$ $f(y_1, \dots, y_m) = \det \left(\sum_{i=1}^m y_i T_i \right)$ представима в виде

$$f(y_1, \dots, y_m) = a \left(\sum_{s_1, \dots, s_{k_1}=1}^m \gamma_{s_1, \dots, s_{k_1}}^1 y_{s_1} \dots y_{s_{k_1}} \right)^{t_1} \cdot \dots \cdot \left(\sum_{s_1, \dots, s_{k_p}=1}^m \gamma_{s_1, \dots, s_{k_p}}^p y_{s_1} \dots y_{s_{k_p}} \right)^{t_p},$$

где все коэффициенты a и $\gamma_{s_1, \dots, s_{k_i}}^i$ являются целыми числами.

Случай различных собственных чисел

Пусть J - рациональная жорданова форма и пусть среди блоков J есть блоки соответствующие различным собственным числам. Для каждого уникального собственного числа λ_i , $i = \overline{1, s}$ обозначим q_i число жордановых клеток соответствующих ему.

Матрицы $X \in M_{J,J}$ имеют вид $X = \text{diag}(X_1, X_2, \dots, X_s)$, где каждая из матриц X_i имеет вид блочной матрицы с правильными верхне-треугольными блоками. Определитель матрицы будет иметь вид $\det X = \det X_1 \det X_2 \dots \det X_s$. Выберем в $M_{J,J}$ базис G_i , $i = \overline{1, m}$ следующим образом. Матрицы $G_1, \dots, G_{q_1^2}$ соответствуют диагональным элементам блоков матрицы X_1 (Элементы G_i стоящие на диагонали i -го блока в X_1 равны единице, остальные нулю. Нумерация блоков в X_1 совпадает с нумерацией переменных), матрицы $G_{q_1^2+1}, \dots, G_{q_1^2+q_2^2+1}$ соответствуют диагональным

элементам блоков матрицы X_2 и так далее. При таком выборе базиса имеем $X_1 = \sum_{i=1}^{q_1^2} x_i G_i$,

$X_2 = \sum_{i=n_1}^{n_2} x_i G_i, \dots, X_s = \sum_{i=n_{s-1}}^{n_s} x_i G_i$, где $n_k = 1 + \sum_{i=1}^k q_i^2$. За счёт такого выбора базиса мы можем

записать каждый из определителей $\det X_i$ в соответствии с леммой 1, а значит и $\det X$ как их произведение

$$\det X = \left[D_{11}^{t_{1m_1}} \cdot D_{12}^{t_{1m_2}} \cdot \dots \cdot D_{1\beta}^{t_{1m\beta}} \right] \cdot \left[D_{21}^{t_{2m_1}} \cdot D_{22}^{t_{2m_2}} \cdot \dots \cdot D_{2\beta}^{t_{2m\beta}} \right] \cdot \dots \cdot \left[D_{s1}^{t_{sm_1}} \cdot \dots \cdot D_{s\beta}^{t_{sm\beta}} \right]$$

Учитывая, что в каждой из скобок свой набор переменных не пересекающихся с другими, мы можем проделать те же рассуждения, что и в случае теоремы 1 для каждого из определителя диагональных блоков Y_k матрицы $Y \in \Lambda_{J,J}$, таким образом получая обобщение для вида $f(y_1, \dots, y_m) = \det Y$, на случай $Y = \text{diag}(Y_1, \dots, Y_s)$

$$f(y_1, \dots, y_m) = a \left(\sum_{s_1, \dots, s_{k_1}=1}^m \gamma_{s_1, \dots, s_{k_1}}^{11} y_{s_1} \dots y_{s_{k_1}} \right)^{t_{11}} \cdot \dots \cdot \left(\sum_{s_1, \dots, s_{k_p}=1}^m \gamma_{s_1, \dots, s_{k_p}}^{sp} y_{s_1} \dots y_{s_{k_p}} \right)^{t_{sp}},$$

где все коэффициенты a и γ_*^{ij} целые.

Переход от $\Lambda_{J,J}$ к $\Lambda_{A,B}$

Список литературы

- [1] С. В. Сидоров, “О подобии матриц с целочисленным спектром над кольцом целых чисел”, Изв. вузов. Матем., 2011, № 3, 86–94; Russian Math. (Iz. VUZ), 55:3 (2011), 77–84. <https://doi.org/10.3103/S1066369X11030091>
- [2] Гантмахер Ф.Р., *Теория матриц*, Наука, М., 1967