

วงจรชีวิตของพืชดอก

ดอกไม้และผลของไม้ดอกมีการหมุนเวียนไปเป็นวงจรชีวิต พืชดอกบางชนิดไม่มีแม่แต่ลำต้นและใบตลอดเวลา ผักและผลไม้ที่เรากินมาจากส่วนต่างๆ ของวงจรชีวิตของพืชแต่ละชนิด เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด มีบทเรียนพฤกษศาสตร์ดีๆ มากมายที่สามารถพบได้ในอาหารบนจานของเรา ซึ่งอาจมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น หากมันมีเมล็ดนักพฤกษศาสตร์ จะมองว่า มันคือผลไม้ ซึ่งรวมถึงมะเขือเทศ พักทอง และแตงกวา



เมล็ดพันธุ์และต้นใหม่

เมล็ดของคารามู (*Coprosma robusta*) ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินใต้ต้นไม้ บางเมล็ดก็งอกและเริ่มแตกยอดใหม่

สิทธิ: มหาวิทยาลัย Waikato Te Whare Wānanga o Waikato

ชาวสวนจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืช เพื่อให้พวกเขาสามารถเกสรและสวนสวยหลากสีสันได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรและชาวสวนผลไม้จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืช เพื่อให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าพืชผลของพวกเขาจะพร้อมเมื่อใด

พืชดอกทุกต้นจะผ่านขั้นตอนพื้นฐานของวงจรชีวิตเดียวกัน

ต้นใหม่เติบโตจากเมล็ด

เมื่อเมล็ดพันธุ์หยุดพักในสภาวะที่เหมาะสมต่อการงอกมันจะแตกออกและตัวอ่อนข้างในก็จะเริ่มเจริญเติบโต

รากจะเจริญเติบโตลงเพื่อยึดต้นไม้ไว้กับพื้นดิน รากยังดูดน้ำและสารอาหารและสะสมอาหาร อีกด้วย

หน่อจะเจริญเติบโตขึ้นสู่ท้องฟ้าและเติบโตเป็นลำต้นที่ลำเลียงน้ำและสารอาหารจากรากไปยังส่วนอื่นๆ ของต้น ลำต้นยังช่วยพยุงใบให้รับแสงแดดได้อีกด้วย


ใบไม้จะจับแสงแดดเพื่อสร้างอาหารให้กับพืชโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง

ต้นโตเต็มวัยจะออกดอก

เมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์ ก็จะออกดอก ดอกไม้เป็นโครงสร้างพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศซึ่งรวมถึงการผสมเกสรและการปฏิสนธิ

การผสมเกสร

การผสมเกสรคือกระบวนการที่ละอองเรณูถูกพัดพา (โดยลมหรือสัตว์) จากส่วนของดอกเพศผู้ (อับอับเรณู ประกอบด้วยถุงละอองเรณูของพืชและเป็นบริเวณที่เกิดละอองเรณูเรณู) ไปยังส่วนของดอกเพศเมีย (เกสรตัวเมีย) ของดอกอื่น จากนั้นละอองเรณูจะเคลื่อนจากเกสรตัวเมียไปยังออวุล เพศ เมีย



© Copyright. University of Waikato. All Rights Reserved | <https://sciencelearn.org.nz>

ดอกกีวีฟรุต

กีวีฟรุตมีดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่บนเถาแยกกัน ดอกตัวเมียไม่มีน้ำหวาน แต่ใช้ละอองเรณูปลอมเพื่อดึงดูดแมลงผสมเกสร

สิทธิ: มหาวิทยาลัย Waikato Te Whare Wānanga o Waikato

การใส่ปุ๋ย

ละอองเรณูประกอบด้วยเซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้ซึ่งมี โครโมโซมครึ่งหนึ่งของโครโมโซมปกติของพืชนั้น หลังจากการผสมเกสร เซลล์สืบพันธุ์เหล่านี้จะเคลื่อนตัวไปยังอวุลซึ่งจะรวมตัวกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งมีโครโมโซมครึ่งหนึ่งของพืช กระบวนการนี้เรียกว่าการปฏิสนธิ