



2024年春季 (1-18周) , F207 周一8:00-9:40

(1-9周) F207周三8:00-9:40

复变函数

朱炬波 13973168169
zhujubo@mail.sysu.edu.cn



第三节 基本定理的推广

——复合闭路定理

- 一、问题的提出
- 二、复合闭路定理
- 三、典型例题
- 四、小结与思考



一、问题的提出

$$\oint_c \frac{1}{z-1} dz.$$

c 是包含 $z = 1$ 的任意闭曲线

由此希望将基本定理推广到多连域中.




二、复合闭路定理

1. 闭路变形原理

设函数 $f(z)$ 在多连通域内解析,

C 及 C_1 为 D 内的任意两条简单闭曲线(正向为逆时针方向),


C 及 C_1 为边界的区域 D_1 全含于 D .



作两段不相交的弧段 $\widehat{AA'}$ 和 $\widehat{BB'}$,



如果我们把这两条简单闭曲线 C 及 C_1 看成一条复合闭路 Γ , Γ 的正方向为:
 外面的闭曲线 C 按逆时针进行,
 内部的闭曲线 C_1 按顺时针进行,
 (即沿 Γ 的正向进行时, Γ 的内部总在 Γ 的左手边),




那 说明: 在变形过程中曲线不经过函数 $f(z)$ 的不解析的点.

解析函数沿曲线的积分, 不因闭曲线在区域内作连续变形而改变它的值. 闭路变形原理



2. 复合闭路定理

设 C 为多连通域 D 内的一条简单闭曲线, C_1, C_2, \dots, C_n 是在 C 内部的简单闭曲线, 它们互不包含也互不相交, 并且以 C, C_1, C_2, \dots, C_n 为边界的区域全含于 D , 如果 $f(z)$ 在 D 内解析, 那末




$$(1) \oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz,$$

其中 C 及 C_k 均取正方向;



$$(2) \oint_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$


这里 Γ 为由 C, C_1, C_2, \dots, C_n 组成的复合闭路
(其方向是: C 按逆时针进行, C_1, C_2, \dots, C_n 按
顺时针进行).



三、典型例题

例1 计算积分 $\oint_{\Gamma} \frac{2z-1}{z^2-z} dz$, Γ 为包含圆周 $|z|=1$ 在内的任何正向简单闭曲线.

解 因为函数 $\frac{2z-1}{z^2-z}$ 在复平面
内有两个奇点 $z=0$ 和 $z=1$,
依题意知, Γ 也包含这两个奇点,




在 Γ 内作两个互不包含也互不相交的正向圆周 C_1 和 C_2 , C_1 只包含奇点 $z=0$,

C_2 只包含奇点 $z=1$, 根据复合闭路定理,

$$\oint_{\Gamma} \frac{2z-1}{z^2-z} dz = \oint_{C_1} \frac{2z-1}{z^2-z} dz + \oint_{C_2} \frac{2z-1}{z^2-z} dz$$

$$= \oint_{C_1} \frac{1}{z-1} dz + \oint_{C_1} \frac{1}{z} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z-1} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z} dz$$

$$= 0 + 2\pi i + 2\pi i + 0 = 4\pi i.$$




例2 计算积分 $\oint_{\Gamma} \frac{e^z}{z} dz$, Γ 为正向圆周 $|z|=2$ 和负向圆周 $|z|=1$ 所组成.

解 C_1 和 C_2 围成一个圆环域,

函数 $\frac{e^z}{z}$ 在此圆环域和其边界

上处处解析, 圆环域的边界构成一条复合闭路,

根据闭路复合定理, $\oint_{\Gamma} \frac{e^z}{z} dz = 0$.




例3 求 $\oint_{\Gamma} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz$, Γ 为含 a 的任一简单闭路,
 n 为整数.

解 因为 a 在曲线 Γ 内部,
 故可取很小的正数 ρ ,

使 $\Gamma_1: |z-a|=\rho$ 含在 Γ 内部,

$\frac{1}{(z-a)^{n+1}}$ 在以 $\Gamma + \Gamma_1^-$ 为边界的复连通域
 内处处解析,



由复合闭路定理,

$$\oint_{\Gamma} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz = \oint_{\Gamma_1} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz$$

$$\text{令 } z = a + \rho e^{i\theta}$$

$$\oint_{\Gamma_1} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{(\rho e^{i\theta})^{n+1}} \rho^n i e^{i\theta} d\theta$$

此结论非常重要, 用起来很方便, 因为 Γ 不必是圆, a 也不必是圆的圆心, 只要 a 在简单闭曲线 Γ 内即可.

$$\text{故 } \oint_{\Gamma} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$



四、小结与思考

本课所讲述的复合闭路定理与闭路变形原理是复积分中的重要定理, 掌握并能灵活应用它是本章的难点.

常用结论:

$$\oint_{\Gamma} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$



思考题

应用柯西-古萨定理应注意什么？



思考题答案

(1) 注意定理的条件“单连通域”.

反例： $f(z) = \frac{1}{z}$ 在圆环域 $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$ 内;

(2) 注意定理的不能反过来用.

即不能由 $\oint_C f(z)dz = 0$, 而说 $f(z)$ 在 C 内处处解析.

反例： $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 在 $|z| = 1$ 内.



思考题

复合闭路定理在积分计算中有什么用？要注意什么问题？



思考题答案

利用复合闭路定理是计算沿闭曲线积分的最主要方法.

使用复合闭路定理时, 要注意曲线的方向.

