

## 09 级一期 B 卷参考解答

一.(每小题 6 分,共 12 分)求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{2x^3};$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{2x^3(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - \cos x}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{12x^2 \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos^2 x \sin x}{24x} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{\sin^2 x} \ln \cos x}. \text{ 而}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x / \cos x}{2 \sin x \cos x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^2 x} = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{故} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

二. (每小题 6 分,共 24 分)求下列积分:

$$(1) \int \frac{dx}{x(2+x^{10})};$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \frac{dx}{x(2+x^{10})} &= \int \frac{x^9 dx}{x^{10}(2+x^{10})} = \frac{1}{10} \int \frac{dx^{10}}{x^{10}(2+x^{10})}; \\ &= \frac{1}{20} \left( \int \frac{dx^{10}}{x^{10}} - \int \frac{dx^{10}}{2+x^{10}} \right) = \frac{1}{20} \ln \left| \frac{x^{10}}{2+x^{10}} \right| + C. \end{aligned}$$

$$(2) \int \cos(\ln x) dx;$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \cos(\ln x) dx &\stackrel{u=\ln x}{=} \int e^u \cos u du = \int e^u d \sin u = e^u \sin u - \int \sin u de^u \\ &= e^u \sin u + \int e^u d \cos u = e^u \sin u + e^u \cos u - \int e^u \cos u du \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad \int \cos(\ln x) dx = \frac{e^u}{2} [\sin u + \cos u] + C = \frac{x}{2} [\sin \ln x + \cos \ln x] + C.$$

$$(3) \int_1^e \frac{dx}{x(2+\ln^2 x)};$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_1^e \frac{dx}{x(2+\ln^2 x)} & \stackrel{u=\ln x}{=} \int_0^1 \frac{du}{2+u^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{d(u/\sqrt{2})}{1+(u/\sqrt{2})^2} \\ & = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{u}{\sqrt{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt & \stackrel{s=\frac{\pi}{2}-t}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}-s\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}-t\right)} d\left(\frac{\pi}{2}-t\right) \\ & = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin s}{\sin s + \cos s} ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt \end{aligned}$$

$$\text{而} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{于是} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt = \frac{\pi}{4}.$$

三. (每小题 7 分, 共 21 分)

$$(1) \text{ 设 } z(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \text{ 求 } dz \Big|_{(0,1)};$$

$$\text{解} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-x \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{-xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}},$$

$$\text{于是} \quad \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,1)} = 1, \quad \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,1)} = 0, \quad \text{故} \quad dz \Big|_{(0,1)} = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,1)} dx + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,1)} dy = dx.$$

$$(2) \text{ 已知 } f(x, y, z) = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2}) \text{ 及点 } A(1, 0, 1), B(3, -2, -2), \text{ 求函数 } f(x, y, z) \text{ 在点 } A \text{ 处}$$

沿由  $A$  到  $B$  的方向导数, 并求此函数在点  $A$  处方向导数的最大值.

解  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{l} = (2, -2, -3)$ , 故  $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left( \frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{-2}{\sqrt{17}}, \frac{-3}{\sqrt{17}} \right)$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}}$ ,

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}}}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} = \frac{y}{x\sqrt{y^2 + z^2} + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\frac{z}{\sqrt{y^2 + z^2}}}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} = \frac{z}{x\sqrt{y^2 + z^2} + y^2 + z^2}$$

于是  $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2}, \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(1,0,1)} = 0, \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2},$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} \right|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{\sqrt{17}} + 0 \times \frac{(-2)}{\sqrt{17}} + \frac{1}{2} \times \frac{(-3)}{\sqrt{17}} = -\frac{1}{2\sqrt{17}}.$$

在 A 点的方向导数最大值为  $\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

(3) 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $x + y + z = e^z$  给出, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$  及  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}.$

解 令  $F(x, y, z) = e^z - x - y - z$ , 则  $\frac{\partial F}{\partial x} = -1, \frac{\partial F}{\partial y} = -1, \frac{\partial F}{\partial z} = e^z - 1$ . 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{1}{e^z - 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial y} / \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{1}{e^z - 1},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{1}{e^z - 1} \right) = \frac{-e^z}{(e^z - 1)^2} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-e^z}{(e^z - 1)^3}.$$

四. (第一小题 4 分, 第二小题 6 分, 共 10 分)

(1) 给定空间三点:  $A(1, 2, 0), B(-1, 3, 1), C(2, -1, 2)$ , 求  $\triangle ABC$  的面积  $S$ .

解 根据向量积的定义, 可知三角形  $ABC$  的面积

$$2S_{\triangle ABC} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \sin \angle A = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

由于  $\overrightarrow{AB} = (-2, 1, 1), \overrightarrow{AC} = (1, -3, 1)$ , 故

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 5\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 5\mathbf{k},$$

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{5^2 + 5^2 + 5^2} = 5\sqrt{3}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{5\sqrt{3}}{2}.$$

(2)求经过直线  $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$  且平行于直线  $L_2: x=y=\frac{z}{2}$  的平面方程.

解 平面的法向量为  $\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2\mathbf{i} + 0\mathbf{j} - \mathbf{k}$ , 又显然所求平面过点  $(1, -2, -3)$

故所求平面方程为  $2(x-1)+0(y+2)-(z+3)=0$ , 即  $2x-z-5=0$ .

五. (7 分) 求函数  $f(x) = x^{\frac{1}{x}}, x > 0$  的极值.

$$\text{解} \quad f'(x) = \frac{d}{dx} \left( e^{\frac{\ln x}{x}} \right) = e^{\frac{\ln x}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} = x^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2},$$

令  $f'(x) = 0$ , 得驻点  $x=e$ . 又 当  $0 < x < e$  时,  $f'(x) > 0$ , 当  $x > e$  时,  $f'(x) < 0$ , 故此点为极大值点, 极大值为  $f(e) = e^{\frac{1}{e}}$ .

六. (12 分) 设函数  $f(x) = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$ , 求(1)此函数的单调区间与极值点;(2)此函数的凹凸区间与拐点;(3)此函数的渐近线.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad f'(x) &= \frac{3(x-1)^2(x+1)^2 - 2(x-1)^3(x+1)}{(x+1)^4} \\ &= \frac{(x-1)^2[3(x+1) - 2(x-1)]}{(x+1)^3} = \frac{(x-1)^2(x+5)}{(x+1)^3}, \\ f''(x) &= \frac{[2(x-1)(x+5) + (x-1)^2](x+1)^3 - 3(x-1)^2(x+5)(x+1)^2}{(x+1)^6} \\ &= \frac{(x-1)[(3x+9)(x+1) - 3(x-1)(x+5)]}{(x+1)^4} = \frac{24(x-1)}{(x+1)^4}. \end{aligned}$$

$x$	$(-\infty, -5)$	$-5$	$(-5, -1)$	$(-1, 1)$	$1$	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	+	0	+
$f''(x)$	-	-	-	-	0	+
$f(x)$	凸, ↗	极大值 $-27/2$	凸, ↘	凸, ↗	拐点 $(1, 0)$	凹, ↗

单调增加区间为  $(-\infty, -5)$ ,  $(-1, 1)$  和  $(1, +\infty)$ , 单调减少区间为  $(-5, -1)$  函数在点

$x=-5$  处取到极大值, 极大值为  $f(-5) = -27/2$ . 因为极值点要在稳定点中寻求, 故没

有极小值点

曲线的凸区间为  $(-\infty, -1)$  和  $(-1, 1)$ , 凹区间为  $(1, +\infty)$ , 曲线拐点为  $(1, 0)$ .

显然曲线有垂直渐近线  $x=-1$ , 曲线无水平渐近线. 由于

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)^3}{x(x+1)^2} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2} = -5,$$

因此曲线有斜渐近线  $y = x - 5$ .

(七. (每小题 7 分, 共 14 分)

1. 求证不等式  $\sin x + \tan x > 2x$ ,  $0 < x < \frac{\pi}{2}$ ;

证 令  $f(x) = \sin x + \tan x - 2x$ ,  $0 < x < \frac{\pi}{2}$ , 则  $f'(x) = \cos x + \sec^2 x - 2$ ,

$$f''(x) = -\sin x + 2\sec x \cdot \sec x \tan x = \frac{\sin x(2 - \cos^3 x)}{\cos^3 x} \geq 0,$$

故  $f'(x) = \cos x + \sec^2 x - 2$ , 在区间  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  内单调增加, 而  $f'(0) = 0$ , 于是

在区间  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  内  $f'(x) > 0$ , 从而  $f(x) = \sin x + \tan x - 2x$  在区间  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  内单调增加,

于是  $f(x) = \sin x + \tan x - 2x > f(0) = 0$ . 证毕.

2. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上二阶可导, 且  $f(a) = f(b) = 0$ ,  $f''(x) \neq 0, x \in (a, b)$ .

求证:  $f(x) \neq 0, x \in (a, b)$ .

证 用反证法. 设存在  $c \in (a, b)$ , 使得  $f(c) = 0$ . 于是由罗尔定理,

$$\exists \xi \in (a, c), \exists \eta \in (c, b), \text{使得 } f'(\xi) = f'(\eta) = 0.$$

同样由罗尔定理,  $\exists \zeta \in (\xi, \eta) \subset (a, b)$ , 使得  $f''(\zeta) = 0$ . 矛盾.