

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (ਪੀ.ਐਚ.ਕਯੂ-9)

ਆਈ.ਡੀ.....

ਮਿਤੀ:.....

ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ?

ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ $\sqrt{\quad}$ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ

	ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ	ਕਈ ਦਿਨ	ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ	ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼
1. ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ/ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ।	0	1	2	3
2. ਉਦਾਸ, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।	0	1	2	3
3. ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਣਾ।	0	1	2	3
4. ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ।	0	1	2	3
5. ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ।	0	1	2	3
6. ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ — ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।	0	1	2	3
7. ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ (ਜਿਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ)।	0	1	2	3
8. ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ/ਬੋਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ — ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣਾ।	0	1	2	3
9. ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ।	0	1	2	3
ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਜੋੜੋ:				

(ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ: ਕੁਲ ਯੋਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖੋ)।

10. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?	0 = ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ 1 = ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 2 = ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 3 = ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ
---	---

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (ਪੀ.ਐਚ.ਕਯੂ-9) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਸੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਲਈ:

- ਮਰੀਜ਼ ਪੀ.ਐਚ.ਕਯੂ-9
- ਜੇਕਰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਉੱਤਰ $\sqrt$ ਹਨ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2 ਸਮੇਤ) ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ।

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਉੱਤਰ $\sqrt$ ਹਨ (ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ)

ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 $\sqrt$ ਉੱਤਰ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ) ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10) ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਖੋਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਬਾਈਪੋਲਰ ਰੋਗ), ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰੀਕ ਬਿਮਾਰੀ/ਦਵਾਈ/ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ

1. ਰੋਗੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਕਫੇ (ਜਿਵੇਂ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਹਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਹਰ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ $\sqrt$ ਉੱਤਰ ਜੋੜੋ। - ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ - 1, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ - 2 ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ - 3
3. ਕਾਲਮ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
4. ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਪੀ.ਐਚ.ਕਯੂ-9 ਸਕੋਰਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੇਖੋ।
5. ਨਤੀਜੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ

ਸਕੋਰਿੰਗ: ਪੀ.ਐਚ.ਕਯੂ-9 ਦੇ ਸਾਰੇ $\sqrt$ ਜਵਾਬ ਜੋੜੋ।

ਹਰੇਕ $\sqrt$ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲਈ

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ = 0

ਕੁਝ ਦਿਨ = 1

ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ = 2

ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ = 3

ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ:

ਕੁੱਲ ਅੰਕ	ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
1-4	ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਦਾਸੀ
5-9	ਹਲਕਾ ਉਦਾਸੀ
10-14	ਦਰਮਿਆਨਾ ਉਦਾਸੀ
15-19	ਦਰਮਿਆਨਾ-ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ
20-27	ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ