

# 무한수열과 무한급수

---

복작복잡스핀 | 160116

홍수린

# 10장의 목차

1. 수열
2. 급수
3. 적분판정법과 합의 추정
4. 비교판정법
5. 교대급수
6. 절대 수렴과 비판정법 및 근판정법
7. 급수판정을 위한 전략
8. 거듭제곱급수
9. 함수를 거듭제곱수로 나타내기
10. 테일러 급수와 매클로린 급수
11. 테일러 다항식의 응용

# 발제 목차

1. 수열
2. 급수
3. 양수 항을 갖는 급수의 판정법(적분판정법, 비교판정법)
4. 반드시 양수 항이 아니어도 되는 급수 판정법(교대급수판정법, 비판정법, 근판정법)

# 1. 수열

## (무한)수열

수열(sequence)은 다음과 같이 일정한 순서로 쓰여진 수의 나열로 생각할 수 있다.

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$$

수  $a_1$ 은 첫째 항,  $a_2$ 는 둘째 항, 그리고 일반적으로  $a_n$ 은  $n$  번째 항이라 한다. 여기서는 무한수열만을 다루며, 따라서  $a_{n+1}$ 은  $a_n$ 의 다음 항이다.

모든 양의 정수  $n$ 에 대응하는 수  $a_n$ 이 존재하므로 수열은 정의역이 양의 정수들의 집합인 함수로 정의할 수 있음에 주목하자. 그렇지만 통상 수  $n$ 의 함숫값은 기호  $f(n)$  대신  $a_n$ 으로 쓴다.

기호 수열  $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ 을 다음과 같이 나타내기도 한다.

$$\{a_n\} \quad \text{또는} \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$$


# 1. 수열

## 수열의 극한

**Ⅰ 정의** 수열  $\{a_n\}$ 에서  $n$ 을 충분히 크게 잡아 항  $a_n$ 이  $L$ 에 근접하게 만들 수 있다면, 수열  $\{a_n\}$ 의 극한은  $L$ 이라 하고 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{또는} \quad n \rightarrow \infty \text{일 때} \quad a_n \rightarrow L$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 이 존재하면 수열은 수렴한다고 하고, 그렇지 않으면 수열  $\{a_n\}$ 은 발산한다고 한다.



# 1. 수열

## 수열의 극한과 함수의 극한

정의 [2]와 3.4절 정의 [5]를 비교해 보면  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 과  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 의 차이는 단지  $n$ 이 정수라는 것뿐이다. 따라서 다음 정리를 얻으며, 그림 6은 이 정리를 그래프로 설명한다.

**[3] 정리**  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = L$ 이고  $n$ 이 정수일 때  $f(n) = a_n$ 이면  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 이다.

3.4절의 정의 5  
(p.197)

**[5] 정의** 함수  $f$ 가 어떤 구간  $(a, \infty)$ 에서 정의된다고 하자. 이때 다음 기호는 임의의  $\epsilon > 0$ 에 대해  $x > N$ 일 때  $|f(x) - L| < \epsilon$ 을 만족하는 수  $N$ 이 존재한다는 것을 의미한다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 를 다른 기호로 나타내면 아래와 같다.

$$x \rightarrow \infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

# 1. 수열

## 수열의 극한과 함수의 극한

정의 [2]와 3.4절 정의 [5]를 비교해 보면  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 과  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 의 차이는 단지  $n$ 이 정수라는 것뿐이다. 따라서 다음 정리를 얻으며, 그림 6은 이 정리를 그래프로 설명한다.

**[3] 정리**  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = L$ 이고  $n$ 이 정수일 때  $f(n) = a_n$ 이면  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 이다.




그림 6

# 1. 수열

## 단조수열

**[10] 정의**  $n \geq 1$ 인 모든  $n$ 에 대해,  $a_n < a_{n+1}$ , 즉  $a_1 < a_2 < a_3 < \dots$ 일 때 수열  $\{a_n\}$ 은 증가수열이라 한다.  $n \geq 1$ 인 모든  $n$ 에 대해  $a_n > a_{n+1}$ 일 때 감소수열이라 한다. 증가하거나 감소하는 수열을 단조수열이라 한다.



# 1. 수열

## 유계수열

III 정의  $n \geq 1$ 인 모든  $n$ 에 대해  $a_n \leq M$ 을 만족하는 수  $M$ 이 존재하면, 수열  $\{a_n\}$ 은 위로 유계(bounded above)라 한다.

$n \geq 1$ 인 모든  $n$ 에 대해  $m \leq a_n$ 을 만족하는 수  $m$ 이 존재하면, 수열  $\{a_n\}$ 은 아래로 유계(bounded below)라 한다. 위로 유계인 동시에 아래로 유계인 수열  $\{a_n\}$ 을 유계수열(bounded sequence)이라 한다.

\* 유계=bounded. 즉 '위로 유계'는 위쪽으로 더 나가지 못하고 막혀 있다는 것

# 1. 수열

## 유계수열, 단조수열의 수렴

예를 들어 수열  $a_n = n$ 은 아래로 유계이지만( $a_n > 0$ ), 위로 유계는 아니다. 수열  $a_n = n/(n+1)$ 은 모든  $n$ 에 대해  $0 < a_n < 1$ 이므로 유계이다.

모든 유계수열이 수렴하는 것은 아니다. [예를 들어 예제 7로부터 수열  $a_n = (-1)^n$ 은  $-1 \leq a_n \leq 1$ 을 만족하지만 발산한다.] 또한 단조수열이 반드시 수렴하는 것은 아니다( $a_n = n \rightarrow \infty$ ). 그러나 유계수열이고 단조수열이면 반드시 수렴한다. 이런 사실은 정리 [2]와 같이 증명된다. 그러나 그림 12를 보면 직관적으로 왜 그것이 참인지를 이해할 수 있다.  $\{a_n\}$ 이 증가하고 모든  $n$ 에 대해  $a_n \leq M$ 이면 항들은 뽁뽁이 모이게 되고 어떤 수  $L$ 에 접근한다.




그림 12

## 2. 급수

### (무한)급수

일반적으로 무한수열  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 의 각 항을 더하면, 다음 형태를 얻는다.

$$\boxed{\text{I}} \quad a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

이것을 무한급수(infinite series) 또는 간단히 급수(series)라 하며 다음과 같은 기호로 나타낸다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{또는} \quad \sum a_n$$

## 2. 급수

# 급수 관련 개념 정리

ex. 등차수열의 합:  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + 99 + 100$

- 급수(級數)란 수학에서 수열들의 각 항의 합. 즉, 급수란 여러 수들의 합연산으로 표현
- 급수는 유한 급수와 무한 급수로 나눌 수 있음
- 유한 급수는 쉽게 구할 수 있지만 무한 급수는 그 정확한 합을 구하기 위해서는 해석학의 여러 정리들이 필요
- 무한 급수는  $S_n$ , 즉 급수의 부분합으로 이루어지는 수열의 극한값

$$S_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n,$$

- $n$ 이 무한대로 갈 때 그 극한이 유한한 값을 갖는다면 이 급수는 수렴(이 극한값  $S$ 가 ‘무한급수의 합’)
- 만약 이 값이 무한하거나 존재하지 않는다면, 이 급수는 발산
- 하지만 그 극한값이 0으로 간다고 해도, 이 급수가 항상 수렴하는 것은 아님

(수열은 0으로 수렴하지만 급수는 수렴하지 않음) 반례:  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots$

## 2. 급수

# 급수의 합

처음  $n$ 항의 합

0.50000000

0.75000000

0.87500000

0.93750000

0.96875000

0.98437500

0.99218750

0.99902344

0.99996948

0.99999905

0.99999997

그러면 아래 급수의 항을 더해 보자.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$$

$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \frac{31}{32}, \frac{63}{64}, \dots, 1 - \frac{1}{2^n}, \dots$ 을 얻을 수 있다. 왼쪽 표는 항을 계속 더함에 따라 부분합은 더욱더 1에 가까워진다는 것을 보여 준다. 실제로 급수의 항을 충분히 많이 더하면 부분합을 1에 원하는 만큼 가깝게 만들 수 있다. 따라서 이 무한 급수의 합이 1이라고 말하는 것이 타당해 보이고 다음과 같이 쓴다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots = 1$$

## 2. 급수

# 급수의 수렴과 발산

**[2] 정의** 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ 에 대해  $s_n$ 을 다음과 같은  $n$  번째 부분 합이라 하자.

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

수열  $\{s_n\}$ 이 수렴하고  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 가 실수로 존재할 때 급수  $\sum a_n$ 은 수렴한다고 하며, 다음과 같이 나타낸다.

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = s \quad \sum a_n \quad \text{또는} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$$

수  $s$ 를 급수의 합이라 한다. 수열  $\{s_n\}$ 이 발산할 때 급수는 발산한다고 한다.

## 2. 급수

# 기하급수의 발산

4 다음 기하급수는  $|r| < 1$ 이면 수렴한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$$

그 합은 다음과 같다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \quad |r| < 1$$

$|r| \geq 1$ 이면 기하급수는 발산한다.

## 2. 급수

# 기하급수의 발산 ex

**예제 3** 다음 기하급수의 합을 구하라.

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots$$

**풀이** 첫째 항이  $a = 5$ 이고 공비가  $r = -2/3$ 이다.  $|r| = 2/3 < 1$ 이므로 [4]에 의해 이 급수는 수렴하고 합은 다음과 같다.

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots = \frac{5}{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)} = \frac{5}{\frac{5}{3}} = 3$$

$n$	$S_n$
1	5.000000
2	1.666667
3	3.888889
4	2.407407
5	3.395062
6	2.736626
7	3.175583
8	2.882945
9	3.078037
10	2.947975




그림 2



## 2. 급수

# 조화급수의 발산

- 조화수열(harmonic progression): 그 역수로 이루어진 수열이 등차수열이 되는 수열
- 조화급수(harmonic series)란 다음의 발산하는 무한급수

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

- 수열 각각의 항은 점차 0에 가까워지고 있음에도 불구하고, 총합은 무한대로 발산. 발산하는 속도는 매우 느려서  $\log_n$ 에 가까움

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 1. 발산판정법 divergence test

**[6] 정리** 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

**증명**  $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 이라 하면  $a_n = s_n - s_{n-1}$ 이다.  $\sum a_n$ 이 수렴하므로 수열  $\{s_n\}$ 도 수렴한다.  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 라 하자.  $n \rightarrow \infty$ 일 때  $n-1 \rightarrow \infty$ 이므로  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s$ 이다. 그러므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} \\ &= s - s = 0\end{aligned}$$

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 1. 발산판정법 divergence test

**7 발산판정법**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 이 존재하지 않거나  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이면  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.

발산판정법은 정리 **6**으로부터 결과가 나온다. 실제로 급수가 발산하지 않으면 급수는 수렴한다. 따라서  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

**예제 9** 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 4}$ 이 발산함을 보여라.

**풀이** 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{5n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5 + \frac{4}{n^2}} = \frac{1}{5} \neq 0$$

그러므로 발산판정법에 따라 이 급수는 발산한다.

### 3. 양수 항 급수의 판정법

#### 1. 발산판정법 divergence test

### 3. 양수 항 급수의 판정법

#### 1. 발산판정법 **divergence test**

- 급수가 수렴하면 수열의 극한값이 0(수렴) (정리 6)
- 수열의 극한값이 0이라도 급수가 항상 수렴하는 것은 아님: 조화급수의 반례 (note 2)
  - 역이 성립하지 않음
  - 급수의 수렴 발산 여부는 알 수 없음
- 발산판정법: 수열의 극한값이 존재하지 않거나 0이 아니면 급수는 발산한다 (정리 7)

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 2. 적분판정법

항들이 양의 정수의 제곱의 역수인 다음과 같은 급수를 조사해 보자.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots$$

$n$  번째 항까지의 합  $s_n$ 에 대한 간단한 공식은 없지만 컴퓨터로 생성한 오른쪽 표로부터  $n \rightarrow \infty$ 일 때 부분합은 1.64 부근의 값에 접근하고 있음을 알 수 있다. 그래서 급수는 수렴할 것으로 보인다.

$n$	$s_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}$
5	1.4636
10	1.5498
50	1.6251
100	1.6350
500	1.6429
1000	1.6439
5000	1.6447

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 2. 적분판정법: 개념 cont.

이런 생각을 기하학적인 논법으로 확인할 수 있다. 그림 1은  $y = 1/x^2$ 의 곡선과 이 곡선 아래에 놓인 직사각형을 나타낸다. 각각의 직사각형의 밑변은 길이 1인 구간이고 높이는 구간의 오른쪽 끝점에서  $y = 1/x^2$ 의 함수값과 일치한다. 따라서 직사각형들의 넓이의 합은 다음과 같다.

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$




그림 1

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 2. 적분판정법: 개념 cont.

첫 번째 직사각형을 제외한 나머지 직사각형의 전체 넓이는  $x \geq 1$  일 때 곡선  $y = 1/x^2$  아래의 넓이, 즉 적분  $\int_1^\infty 1/x^2 dx$ 의 값보다 작다. 7.8절에서 이 이상적분은 수렴하고 그 값이 1임을 보였다. 따라서 그림으로부터 모든 부분합은 다음과 같이 2보다 작다는 것을 알 수 있다.

$$\frac{1}{1^2} + \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = 2$$




그림 1



### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 2. 적분판정법: 7.8장의 이상적분(참고)

#### ■ 형태 1: 무한 구간




그림 1

곡선  $y = 1/x^2$ 의 아래와  $x$ 축 위, 그리고 직선  $x = 1$ 의 오른쪽에 놓이는 무한 영역  $S$ 를 생각하자.  $S$ 가 무한히 뻗어 나가기 때문에 넓이도 무한일 것이라 생각할 수 있다. 그러나 좀 더 자세히 살펴보자. 직선  $x = t$ 의 왼쪽에 있는  $S$ 의 일부 넓이(그림 1에서 색칠한 부분)는 다음과 같다.

$$A(t) = \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^t = 1 - \frac{1}{t}$$

즉  $t$ 가 얼마나 크든지 상관없이  $A(t) < 1$ 이고, 따라서 다음과 같음을 알 수 있다.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right) = 1$$

그림 2와 같이 색칠한 부분의 넓이는  $t \rightarrow \infty$ 일 때 1로 접근한다. 따라서 무한 영역  $S$ 의 넓이는 1







그림 2



### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 2. 적분판정법: 개념 cont.

즉 부분합은 유계이다. 또한 (모든 항이 양수이므로) 부분합은 증가하는 것을 안다. 그러므로 (단조수열정리에 의해) 부분합은 수렴하므로 급수는 수렴하고, 다음과 같이 급수의 합(부분합의 극한)은 2보다 작다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots < 2$$

유계수열이고 단조수열이면  
반드시 수렴




그림 1

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 2. 적분판정법: 개념 정리

**적분판정법**  $f$ 가  $[1, \infty)$ 에서 연속이고 양의 값을 갖는 감소함수라 하고,  $a_n = f(n)$ 이라 하자. 그러면 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하기 위한 필요충분조건은 이상적분  $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 가 수렴하는 것이다. 다시 말해 다음이 성립한다.

- (i)  $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 가 수렴하면  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.
- (ii)  $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 가 발산하면  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 2. 적분판정법: $p$ -급수

예제 2의 급수를  $p$ -급수( $p$ -series)라 한다.  $p$ -급수는 이번 장 나머지에서 매우 중요하다. 예제 2의 결과를 다음과 같이 요약한다.

□  $p$ -급수  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 은  $p > 1$ 이면 수렴하고  $p \leq 1$ 이면 발산한다.

#### 예제 3

(a) 다음 급수는  $p = 3 > 1$ 인  $p$ -급수이므로 수렴한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \cdots$$

(b) 다음 급수는  $p = \frac{1}{3} < 1$ 인  $p$ -급수이므로 발산한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \cdots$$

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 2. 적분판정법: 합(sum)의 추정=나머지(remainder) 추정

적분판정법을 이용해서 급수  $\sum a_n$ 이 수렴하는 것을 보일 수 있다고 가정하자. 그리고 이 급수의 합  $s$ 의 근삿값을 구한다고 하자. 물론  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 이므로 임의의 부분합은  $s$ 에 근사한다. 그러나 근삿값이 얼마나 적절한가 알기 위해서는 다음과 같이 나머지(remainder)의 크기를 추정해야 한다.

정확히 알 수  
없는 진짜  
급수의 합

$$R_n = \textcircled{s} - \textcircled{s_n} = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots$$

$a_n$ 까지로  
추정한  
급수의 합

나머지  $R_n$ 은  $n$  항까지의 합  $s_n$ 이 전체합에 대한 근삿값으로 사용될 때 발생하는 오차이다.

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 2. 적분판정법: 나머지(remainder) 추정

같은 개념과 표현을 적분판정법에 적용하고,  $f$ 가  $[n, \infty)$ 에서 감소한다고 가정하자.  $x > n$ 일 때  $y = f(x)$  아래의 넓이와 직사각형들의 넓이를 그림 3과 같이 비교하면 다음을 알 수 있다.

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$$

같은 방법으로 그림 4로부터 다음을 알 수 있다.

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots \geq \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx$$

따라서 다음과 같은 오차 추정을 증명한다.

**② 적분판정법에 대한 나머지 추정**  $x \geq n$ 에서  $f$ 가 연속이고 양이며 감소함수로서  $f(k) = a_k$ 이고,  $\sum a_n$ 는 수렴한다고 가정하자.  $R_n = s - s_n$ 이면 다음이 성립한다.

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$$




그림 3




그림 4

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 3. 비교판정법: 개념 cont.

급수의 모든 항이 양수인 급수에만 적용되는 다음 판정법을 증명하는 데 비슷한 논의를 사용할 수 있다. 첫 부분은 급수의 항이 알고 있는 수렴하는 급수의 항보다 작으면 그 급수는 또한 수렴함을 말한다. 둘째 부분은 급수의 항이 알고 있는 발산하는 급수의 항보다 크면 그 급수는 또한 발산함을 말한다.

**비교판정법**  $\sum a_n$ 과  $\sum b_n$ 의 각 항이 모두 양수인 급수일 때

- (i)  $\sum b_n$ 이 수렴하고, 모든  $n$ 에 대해  $a_n \leq b_n$ 이면  $\sum a_n$ 도 수렴한다.
- (ii)  $\sum b_n$ 이 발산하고, 모든  $n$ 에 대해  $a_n \geq b_n$ 이면  $\sum a_n$ 도 발산한다.



### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 3. 비교판정법의 표준급수

- $p$ -급수 [ $\sum 1/n^p$ 은  $p > 1$ 이면 수렴하고  $p \leq 1$ 이면 발산한다(10.3절의 1 참조).]
- 기하급수 [ $\sum ar^{n-1}$ 은  $|r| < 1$ 이면 수렴하고  $|r| \geq 1$ 이면 발산한다(10.2절의 4 참조).]



### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 3. 비교판정법의 표준급수 ex

**예제 1** 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ 가 수렴하는지 발산하는지 판정하라.

**풀이** 충분히 큰  $n$ 에 대해 분모를 지배하는 항은  $2n^2$ 이므로 주어진 급수를 급수  $\sum 5/(2n^2)$ 와 비교한다. 다음을 관찰하자.

$$\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$$

왜냐하면 좌변의 분모가 더 크기 때문이다. (비교판정법의 기호로  $a_n$ 은 좌변이고  $b_n$ 은 우변이다.) 이때 다음을 알 수 있다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2} = \frac{5}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$p = 2 > 1$ 인  $p$ -급수이므로 수렴한다. 따라서 비교판정법 (i)에 의해 다음은 수렴한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$$

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 3. 비교판정법: 극한비교판정법

**극한비교판정법**  $\sum a_n$ 과  $\sum b_n$ 의 항이 양수이고  $c > 0$ 인 유한수에 대해 다음이 성립하면 두 급수는 모두 수렴하거나 모두 발산한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$$

**증명**  $m$ 과  $M$ 을  $m < c < M$ 인 양수라 하자. 충분히 큰  $n$ 에 대해  $a_n/b_n$ 은  $c$ 에 매우 가깝게 되므로 다음을 만족하는  $N$ 이 존재한다.

$$m < \frac{a_n}{b_n} < M, \quad n > N$$

따라서  $mb_n < a_n < Mb_n, \quad n > N$

$\sum b_n$ 이 수렴하면  $\sum Mb_n$ 도 수렴한다. 따라서 비교판정법의 (i)에 의해  $\sum a_n$ 도 수렴한다.  
 $\sum b_n$ 이 발산하면  $\sum mb_n$ 역시 발산하고 비교판정법의 (ii)에 의해  $\sum a_n$ 도 발산한다. ■

### 3. 양수 항 급수의 판정법

### 3. 비교판정법: 합(sum)의 추정

비교판정법을 이용해서 비교급수  $\sum b_n$ 으로 급수  $\sum a_n$ 의 수렴성을 보인다면, 나머지를 비교해서  $\sum a_n$ 의 합을 추정할 수 있다. 10.3절과 같이 나머지를 생각하자.

$$R_n = s - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots$$

비교급수  $\sum b_n$ 에 대해 대응하는 나머지를 생각한다.

$$T_n = t - t_n = b_{n+1} + b_{n+2} + \cdots$$

모든  $n$ 에 대해  $a_n \leq b_n$ 이므로  $R_n \leq T_n$ 이다.  $\sum b_n$ 이  $p$ -급수이면 10.3절에서와 같이 나머지  $T_n$ 을 계산할 수 있다.  $\sum b_n$ 이 기하급수이면  $T_n$ 은 기하급수의 합이 되므로 정확하게 계산할 수 있다(연습문제 18 참조). 어느 경우라도  $R_n$ 은  $T_n$ 보다 작다.

### 3. 양수 항 급수의 판정법

## 3. 비교판정법: 합(sum)의 추정 ex

**예제 5** 급수  $\sum \frac{1}{n^3 + 1}$ 의 합의 근삿값으로 처음 100개 항의 합을 이용하라. 이 근삿값으로 얻은 오차를 추정하라.

**풀이** 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{n^3 + 1} < \frac{1}{n^3}$$

그러므로 주어진 급수는 비교판정법에 따라 수렴한다. 비교급수  $\sum 1/n^3$ 에 대한 나머지  $T_n$ 은 적분판정법에 대한 나머지 계산을 이용해서 10.3절 예제 5에서 계산했다.

$$T_n \leq \int_n^\infty \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$$

따라서 주어진 급수의 나머지  $R_n$ 은 다음을 만족한다.

$$R_n \leq T_n \leq \frac{1}{2n^2}$$

$n = 100$ 일 때 다음을 얻는다.

$$R_{100} \leq \frac{1}{2(100)^2} = 0.00005$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 1} \approx \sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n^3 + 1} \approx 0.6864538$$

오차는 0.00005보다 작다.

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 1. 교대급수판정법: 교대급수

급수의 각 항의 부호가 교대로 나타나는 급수를 **교대급수**(alternating series)라 한다. 다음 두 예를 보자.

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$$
$$-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \frac{6}{7} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$$

위의 예와 같은 교대급수의  $n$  번째 항은 다음과 같은 형태임을 알 수 있다.

$$a_n = (-1)^{n-1} b_n \quad \text{또는} \quad a_n = (-1)^n b_n$$

여기서  $b_n$ 은 양수이다. (실제로  $b_n = |a_n|$ 이다.)

다음 판정법은 교대급수의 항들이 절댓값을 취했을 때 감소하면서 0으로 수렴하면 교대급수는 수렴한다는 것이다.

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 1. 교대급수판정법: 개념

교대급수판정법 교대급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + b_5 - b_6 + \cdots, \quad b_n > 0$$

가 다음 두 조건을 만족하면 이 급수는 수렴한다.

(i) 모든  $n$ 에 대해  $b_{n+1} \leq b_n$


(ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 1. 교대급수판정법: 개념

증명하기에 앞서 그림 1을 살펴보자. 먼저 수직선에  $s_1 = b_1$ 을 그리고,  $b_2$ 를 빼서  $s_2$ 를 구하면  $s_2$ 는  $s_1$ 의 왼쪽에 놓인다. 그 다음  $b_3$ 를 더해  $s_3$ 를 구하면  $s_3$ 는  $s_2$ 의 오른쪽에 놓인다. 그러나  $b_3 < b_2$ 이므로  $s_3$ 은  $s_1$ 의 왼쪽에 놓이게 된다. 이 과정을 계속하면 부분합이 앞뒤로 진동함을 알 수 있다.  $b_n \rightarrow 0$ 이므로 단계를 거듭할수록 점점 더 작아진다. 짝수 부분합  $s_2, s_4, s_6, \dots$ 은 증가하고, 홀수 부분합  $s_1, s_3, s_5, \dots$ 는 감소한다. 즉 두 수열은 어떤 수  $s$ (급수의 합)에 수렴할 것 같다. 그러므로 아래 증명에서 짝수 부분합과 홀수 부분합으로 나눠서 생각한다.

그림 1



## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 1. 교대급수판정법: 합(sum)의 추정

임의의 수렴하는 급수의 부분합  $s_n$ 은 전체합  $s$ 의 근삿값으로 이용될 수는 있지만, 근삿값의 정확도를 추정할 수 없는 경우에는 별로 쓸모가 없다.  $s \approx s_n$ 을 이용할 때 나타나는 오차는 나머지  $R_n = s - s_n$ 이다. 다음 정리는 교대급수판정법의 조건을 만족하는 급수에 대한 오차의 크기는 처음으로 무시할 수 있는 항의 절댓값인  $b_{n+1}$ 보다 작다는 것을 보여 준다.

**교대급수추정정리** 교대급수의 합  $s = \sum (-1)^{n-1} b_n$ 이 다음 조건을 만족한다고 하자.

$$(i) b_{n+1} \leq b_n \text{ 과 } (ii) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

그러면 다음이 성립한다.

$$|R_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1}$$



## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 2. 비판정법 및 근판정법: 절대수렴

임의의 주어진 급수  $\sum a_n$ 에 대응하는 원래 급수의 각 항에 절댓값을 취한 다음과 같은 급수를 생각하자.

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots$$

**정의** 절댓값의 급수  $\sum |a_n|$ 이 수렴할 때, 급수  $\sum a_n$ 은 **절대 수렴**(absolutely convergent)한다고 한다.

급수  $\sum a_n$ 이 양수 항을 갖는 급수이면  $|a_n| = a_n$ 이므로 이 경우에는 절대 수렴과 수렴은 같음에 주목하자.

**예제 1** 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots$ 은 절대 수렴한다.

왜냐하면 다음과 같이  $p = 2$ 인  $p$ -급수이므로 수렴하기 때문이다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots$$

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 2. 비판정법 및 근판정법: 조건부수렴

**2 정의** 급수  $\sum a_n$ 이 수렴하지만 절대 수렴하지 않을 때, 급수  $\sum a_n$ 을 조건부 수렴(conditionally convergent)한다고 한다.

**예제 2** 다음 교대조화급수는 수렴한다(10.5절 예제 1 참조).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

그러나 이에 대응하는 다음과 같은 절댓값의 급수는 조화급수( $p = 1$ 인  $p$ -급수)이므로 이 급수는 절대 수렴하지 않는다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 2. 비판정법 및 근판정법: 절대수렴

**[3] 정리** 급수  $\sum a_n$ 이 절대 수렴하면 그 급수는 수렴한다.

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 2. 비판정법 및 근판정법: 비(ratio)판정법

- 비판정법 또는 비율판정법은 궁극적으로 0이 아닌 실 또는 복소항 급수의 수렴 여부를 판정하는 방법
- 장 르 롱 달랑베르가 처음으로 출간. 달랑베르의 판정법, 코시의 비율판정법으로도 불림
- $a_n$ 의 극한값  $L$ 이 존재하는 경우, ...

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 2. 비판정법 및 근판정법: 비(ratio)판정법

$a_n$ 의 극한값  $L$ 이 존재하는 경우, ...

#### 비판정법

- (i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L < 1$ 이면 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 절대 수렴한다(따라서 수렴한다).
- (ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L > 1$  또는  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$ 이면 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.
- (iii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 이면 비판정법으로 결론을 이끌어 낼 수 없다. 즉  $\sum a_n$ 의 수렴 또는 발산에 대한 어떤 결론도 내릴 수 없다.

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 2. 비판정법 및 근판정법: 근(root)판정법

다음 판정법은  $n$ 차 거듭제곱이 나오는 경우에 적용하면 편리하다. 증명은 비판정법의 증명과 유사하므로 연습문제 21로 남겨 둔다.

#### 근판정법

- (i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1$ 이면 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 절대 수렴한다(따라서 수렴한다).
- (ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L > 1$  또는  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$ 이면, 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.
- (iii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ 이면 근판정법으로 결론을 내릴 수 없다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ 이면, 근판정법의 (iii)은 이 판정법이 아무런 정보도 주지 않음을 말한다. 이때 급수  $\sum a_n$ 은 수렴할 수도 있고 발산할 수도 있다. (비판정법에서  $L = 1$ 이면 근판정법에서도  $L = 1$ 일 것이므로 근판정법을 시도하지 않는다. 그 역도 마찬가지이다.)

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 3. 급수 판정을 위한 전략

1. 급수가  $\sum 1/n^p$  형태이면  $p$ -급수이고, 이 급수는  $p > 1$ 이면 수렴하고  $p \leq 1$ 이면 발산한다.
2. 급수의 형태가  $\sum ar^{n-1}$  또는  $\sum ar^n$  이면 이는 기하급수이고  $|r| < 1$ 이면 수렴하고  $|r| \geq 1$ 이면 발산한다. 급수를 이런 형태로 바꾸기 위해서는 약간의 대수적인 조작이 필요하다.
3. 주어진 급수가  $p$ -급수나 기하급수와 비슷한 형태를 취한 경우에는 비교판정법 중 하나를 고려해야 한다. 특히  $a_n$ 이  $n$ 에 관한 유리함수나 대수함수(다항함수의 제곱근을 포함하는)이면 그 급수를  $p$ -급수와 비교할 수 있다. 10.4절 연습문제에서 대부분의 급수가 이 형태를 가지고 있음에 유의한다. ( $p$ 의 값은 분자와 분모에 있는  $n$ 의 최고차수인 상태로 유지해서 10.4절처럼 선택되어야 한다.) 비교판정법은 양수 항의 급수에만 적용할 수 있으나  $\sum a_n$ 이 음수 항을 포함하면 절대급수  $\sum |a_n|$ 에 비교판정법을 적용하면 된다.

## 4. 양수 또는 음수 항 급수의 판정법

### 3. 급수 판정을 위한 전략

4. 한눈에  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 임을 알아볼 수 있으면 발산판정법을 이용한다.
5. 급수의 형태가  $\sum (-1)^{n-1} b_n$  또는  $\sum (-1)^n b_n$ 이면 교대급수판정법을 확실히 적용할 수 있다.
6. 계승이나 다른 곱(상수의  $n$  번째 거듭제곱도 포함해)을 포함한 급수는 종종 비판정법을 이용하는 것이 편리하다. 모든  $p$ -급수에 대해  $n \rightarrow \infty$ 일 때  $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow 1$ 임을 명심하자. 그러므로  $n$ 의 모든 유리함수와 대수함수에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 비판정법은 그런 급수에 대해서는 이용하면 안 된다.
7.  $a_n$ 이  $(b_n)^n$  형태이면 근판정법이 유용하다.
8.  $\int_1^\infty f(x) dx$ 가 쉽게 구해지는  $a_n = f(n)$ 이라면 (이 판정법의 전제조건이 만족된다는 가정에서) 적분판정법이 효과적이다.



THANK YOU 😊

---