

1. Який спірографічний показник вважається найкращим для оцінки ступеня обструкції дихальних шляхів?

- Форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ)
- Об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) +
- Хвилинний об'єм дихання (ХОД)
- Функціональна залишкова ємність легень (ФЗЄ)
- Максимальна вентиляція легень (МВЛ)

2. Чоловік із діагнозом: двостороння крупозна пневмонія, знаходиться в стаціонарі 5 добу. З метою покращення вентиляції в обох легенях йому призначені спеціальні дихальні вправи. Яким є найвигідніше положення для пацієнта під час їх виконання?

- На боці з опорою рук фізичного терапевта
- Лежачи на животі
- Стоячи +
- Лежачи руки на грудній клітці
- Сидячи руки на плечах

3. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на періодичну появу епізодів експіраторної задишки та кашлю вночі. Ці скарги посилюються під час цвітіння липи. В анамнезі алергічний риніт. Під час аускультатії легень виявлено жорстке дихання та сухі свистячі хрипи з подовженим видихом. Яку пробу необхідно виконати для діагностики оборотності бронхіальної обструкції?

- З інгаляцією β_2 -адреностимулятора +
- З інгаляцією β -адреноблокатора
- З інгаляцією ГКС
- З інгаляцією кисню
- З інгаляцією муколітиків

4. Який суглоб найчастіше вражається першим при подагрі у чоловіків?

- Перший плеснофаланговий +
- Колінний
- Кульшовий
- Ліктьовий
- Променево-зап'ястковий

5. Вкажіть неврологічний рівень пошкодження спинного мозку, за якого прогностично пацієнт здатен буде до навчання ходьбі за допомогою ортезів і милиць.

- L1-2
- S2-4
- L2-3 +
- L1-Th11
- L4-S1

6. Пацієнту фізичний терапевт вимірює амплітуду рухів у променево-зап'ястковому суглобі. У якій площині відбувається долонне згинання і тильне розгинання цього суглоба?

- Фронтальній
- В.Горизонтальній
- Сагітальній +
- Поперечній
- Повздовжній

7. Які додаткові рухи не застосовують під час використання методу «суглобової гри»?

- Обертання +
- Згинання
- Витягання
- Кочення
- Ковзання

8. З метою виведення патологічного вмісту у пацієнта з ексудативним плевритом потрібно підібрати дихальні вправи. На що треба зробити акцент?

- Видих та стискання грудної клітки
- Видих та розтяг ураженої ділянки +
- Вдих та стискання грудної клітки
- Видих та стискання ураженої ділянки
- Вдих та розтяг ураженої ділянки

9. Виберіть чутливу ділянку на яку потрібно звернути увагу при огляді транстібіальної кукси після зняття протезу.

- Медіальна область великогомілкової кістки
- Супрапателлярна область
- Гребінь великогомілкової кістки +

- Латеральна область малогомілкової кістки
- Надвиросткова область

10. Під час обстеження кардіологічного хворого, було виявлено систолічний артеріальний тиск на рівні 170 мм рт. ст., діастолічний — 105 мм рт.ст. Який ступінь артеріальної гіпертензії у чоловіка?

- II +
- III
- IV
- V
- I

11. Вкажіть при якій поставі відмічається надмірний нахил таза назад.

- Прямій поставі
- Лордозній
- Сколіозній поставі
- Кіфозній поставі +
- Нормальній поставі

12. З метою профілактики пролежнів медична сестра фізіотерапевтичного відділення розмістила пацієнта в положення Сімса. Охарактеризуйте це положення.

- Напівсидяче положення
- Положення на боку
- Положення на животі
- Положення на спині
- Проміжне між положенням на животі та на боку +

13. До якого виду відноситься латеральне хапання?

- Силове хапання
- Долонні захоплення
- Двопальцеві хапання +
- Динамічні хапання
- Багатопальцеві захоплення

14. Виберіть із нижче наведених варіантів метод обстеження, що доцільно застосувати для визначення рівня ризику падіння у пацієнта, який три тижні тому переніс закриту черепно-мозкову травму.

- Шкала падінь Морсе +
- Шкала ком Глазго

- Мануально-м'язове тестування
- Оціночний тест Фугл-Мейєра
- Тест Берга

15. У пацієнтки віком 56 років, яка хворіє на бронхіальну астму, об'єктивно спостерігається: обличчя ціанотичне, шийні вени набухші, кашляє, під час дихання чути свистячі хрипи, жінка налякана. Яке положення необхідно надати для полегшення стану?

- Лежачи на животі
- Лежачи з піднятими ногами
- Лежачи з піднятим головним кінцем
- Ортопное +
- Стоячи

16. Який з нижченаведених рефлексів вказуватиме на органічне ураження пірамідної нервової системи?

- Рефлекс Керінга
- Рефлекс Бабінського +
- Рефлекс Брудзінського
- Рефлекс Марінеску-Радовічі
- Рефлекс Кремастера

17. Як характеризується обмежена рухливість суглобів?

- Можливість виконувати рухи з більшою амплітудою
- Максимальна пасивна амплітуда рухів у суглобі навколо з однієї з осей обертання
- Можливість виконувати рухи в неправильних площинах
- Неможливість виконувати рухи в межах нормальної амплітуди +
- Активний рух у суглобі з максимальною амплітудою

18. Жінка віком 42 роки після підняття важкого предмета відчула різкий біль у попереково-крижовому відділі хребта з іррадіацією в сідницю та по передній поверхні стегна і внутрішній поверхні гомілки справа. Об'єктивно спостерігається: напружені м'язи поперекової ділянки, сколіоз, випрямлення поперекового лордозу, обмеження рухів у поперековому відділі хребта та болючість під час глибокої пальпації паравертебральних точок L4-S1 справа. Симптом Ласега позитивний справа. Ахіловий рефлекс справа не викликається. Гіпестезія по зовнішньому краю правої стопи. Який із нижченаведених діагнозів найбільш ймовірний?

- Радикулопатія S1 +
- Люмбаго
- Люмбоішіалгія
- Радикулопатія L5
- Люмбалгія

19. Які вправи доцільно рекомендувати пацієнтам, які хворіють на гіпертонічну хворобу в різних стадіях, з метою зниження артеріального тиску?

- Ритмопластичні
- Дихальні з затримкою дихання на видиху +
- Ізотонічні
- Дихальні з затримкою дихання на вдиху
- Ізометричні

20. Рентгенологічно у пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?

- Великого грудного м'яза
- Великого круглого м'яза
- Найширшого м'яза спини
- Двоголового м'яза плеча +
- Дельтоподібного м'яза

21. Яку здатність людини ерготерапевту дозволяє оцінити універсальний опитувальник «активності у повсякденному житті» (Activities of Daily Living-ADL)?

- Задоволеність від виконання певної діяльності
- Інструментальну активність повсякденного життя
- Заняттєву активність
- Діяльність з точки зору її важливості для клієнт/пацієнта
- До самостійного існування +

22. Вкажіть хапання, що відноситься до первинного.

- Замінний тип хапання, що виконується іншими частинами тіла
- Хапання за допомогою ортеза
- Хапання кінчиками трьох пальців
- Хапання за допомогою допоміжного засобу
- Хапання, що виконується пальцями або долонею +

23. Які м'язи спини потрібно зміцнювати при сутулості та збільшенні грудного кіфозу?

- Довгі глибокі м'язи спини +
- Великий та малий ромбовидний м'яз
- Косий м'яз живота
- Нижній задній зубчастий м'яз
- Трапецієподібний м'яз

24. Який тест можна застосувати для дослідження маніпулятивного рівня кисті та можливості виконувати повні захоплення?

- Фугл-Мейєра
- Френчай +
- Тінетті
- Ловетта
- Мотрісіті

25. Вкажіть особливості позиціонування пацієнтів, які перенесли ендопротезування кульшового суглоба, в перші дні.

- У зручному положенні, не має значення на якому боці
- У положенні лежачи на спині, оперована нога в положенні відведення
- У положенні на неоперовану сторону тіла, між колінами знаходиться валик+
- Таких рекомендацій немає
- У положенні на оперованому боці, щоб суглоб набув правильної позиції

26. У підлітка віком 15 років під час візуального обстеження було з'ясовано, що грудна клітка заглиблена в нижній частині грудини, особливо в ділянці мечоподібного відростка. На яку форму грудної клітки вказують отримані результати обстеження?

- Емфізематорну
- Рахітичну
- Лійкоподібну +
- Астенічну
- Воронкоподібну

27. При проведенні ММТ м'язів що виконують приведення плеча, м'язом агоністом є:

- Підосний м'яз
- Малий грудний м'яз
- Дельтоподібний м'яз
- Надосний м'яз
- Великий грудний м'яз +

28. Пацієнту з ішемічним інсультом асистент ерготерапевта задає питання під час його пересування. Чоловік, для того щоб відповісти, зупиняється. Який дефіцит ми можемо спостерігати у пацієнта?

- Дефіцит перемикання уваги та розуміння
- Дефіцит зосередженої уваги та розуміння
- Дефіцит розділеної уваги та концентрації уваги +
- Дефіцит вибіркової уваги та сприйняття
- Дефіцит концентрації уваги та сприйняття

29. Після родової травми у новонародженої дитини відзначаються: обмеження рухів верхніх кінцівок, гіпорексія, м'язова атрофія. До якого виду рухових порушень відносяться ці зміни нервової системи?

- Порушення нижнього мотонейрону +
- Пірамідальні порушення
- Порушення верхнього мотонейрону
- Міастенія
- Бульбарні розлади

30. Протези кінцівок за призначенням поділяють на:

- Активні та косметичні
- Анатомічні та спеціалізовані
- Професійні та побутові
- Функціональні та косметичні +
- Активні та анатомічні

31. Пацієнт віком 29 років скаржиться на асиметрію обличчя. За оцінкою неврологічного статусу встановлено: у чоловіка відсутні рухи мимічних м'язів зліва, слезотеча з лівого ока. Який нерв уражений?

- Трійчастий
- Лицевий +
- Відвідний
- Окоруховий
- Блоковий

32. У пацієнта розлади рухових функцій верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для контролю ефективності його відновлення у діагностичному комплексі застосовували мануальне м'язове тестування, динамометрію. Дослідження проводили з метою визначити:

- Активність у повсякденному житті
- Точність та координованість рухів
- Силу м'язів +
- Спастичність
- Діапазон рухів

33. Пацієнт скаржиться на локальний біль у нижньому полюсі надколінка. З чим пов'язаний такий вид колінного болю?

- Тендінопатією надколінка +
- Іліотібіальним синдромом
- Травмою передньої хрестоподібної зв'язки
- Пателофеморальним больовим синдромом
- Остеоартрозом

34. Упродовж якого часу рекомендовано позиціонувати пацієнта з ішемічним інсультом в одному положенні для профілактики контрактур?

- 7-8 год
- 5-6 год
- 9-10 год
- 1-2 год +
- 3-4 год

35. Як називається захисний рефлекс розтягування, що запобігає перерозтягуванню м'язів?

- Міотатичний рефлекс +
- Сегментарний рефлекс
- Сухожильний рефлекс
- Тонічний рефлекс
- Аутогенне гальмування

36. Якою повинна бути відстань між верхньою перекладиною і пахвовою западиною для безпечного пересування пацієнта на пахвових милицях?

- 1-3 см
- 3-4 см
- 4-5 см +

- 2-3 см
- 5-7 см

37. Як часто фізичний терапевт повинен перевіряти справність обладнання, що використовується під час занять із пацієнтами?

- На початку робочого дня
- У кінці робочого дня
- Згідно з рекомендаціями виробника обладнання
- Повсякчас, перед кожним використанням +
- Згідно з графіком перевірки обладнання

38. Чоловіку віком 60 років два дні тому виконано ендопротезування правого кульшового суглоба. Вкажіть обмеження, яких повинен дотримуватись пацієнт упродовж 3-х місяців.

- Піднімати пряму кінцівку на 30° при розігнутому коліні
- Підніматися сходами
- Сідати під кутом більше ніж на 90° між тулубом та нижніми кінцівками +
- Відводити пряму нижню кінцівку більше ніж на 30°
- Лягати на здоровий бік із подушкою між ногами

39. Які показники є основними для контролю за станом хворого на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час виконання терапевтичних вправ у підгострому періоді?

- Толерантність до фізичного навантаження, шкала Berga, сатурація
- ЧСС, ММТ, координація, свідомість, ЖЕЛ
- VAS, ЧСС, сатурація, ДО, ЖЕЛ, ОФВ1, втома
- АТ, ЧСС, ступені втоми, MOS SF12, опитувальник MacGill
- ЧСС, АТ, ЧД, сатурація, шкала Borg, біль, втома +

40. Як називається вільний у просторі рух, що виконується дистальним сегментом кінцівки?

- Функціональна вправа
- Поступальна вправа
- Вправа з відкритим кінематичним ланцюгом +
- Вправа з закритим кінематичним ланцюгом
- Зворотна вправа

41. У пацієнта віком 34 роки під час заняття терапевтичними вправами спостерігається: прискорене дихання, невисока пітливість та незначне

почервоніння шкіри. Чоловік не має ніяких скарг та безпомилково виконує вказівки. Вкажіть рівень втоми у пацієнта.

- Виражений
- Незначний +
- Різкий
- Втома відсутня
- Значний

42. Під час обстеження та проведення тесту неврологічному хворому «Встань та йди» були отримані результати ходьби у 15 сек. Яка здатність до переміщення у цього пацієнта?

- Переважно незалежна здатність до переміщення +
- Обмежена здатність до переміщення
- Переважно обмежена здатність до переміщення
- Вільна здатність до переміщення
- Порушена здатність до переміщення

43. З якого положення здійснюються мобілізаційні прийоми для проксимального плечо-променевого суглоба?

- 90° згинання та пронація
- Максимальне розгинання та супінація +
- 75° згинання та супінація
- 90° згинання та супінація
- Максимальне розгинання та пронація

44. Жінці віком 27 років після перенесеної гострої пневмонії призначено курс масажу грудної клітки. Вкажіть правильну послідовність прийомів лікувального дренажного масажу.

- Погладжування, вібрація, розминання, розтирання
- Вібрація, розминання, погладжування, розтирання
- Погладжування, розминання, розтирання, вібрація
- Розтирання, погладжування, вібрація, розминання
- Погладжування, розтирання, розминання, вібрація +

45. Під час оцінки постави пацієнта віком 18 років було виявлено викривлення хребта у фронтальній площині. Який тест доцільно провести у цьому разі для деталізації діагнозу?

- Тест Ловетта
- Тест Філіпса

- Тест Ласега
- Тест Адамса +
- Тест Патріка

46. Які завдання фізичної терапії будуть пріоритетними в перші три дні хребетно-спинномозкової травми?

- Навчання навичок переміщення
- Сприяння процесам нейропластичності
- Відновлення втрачених функцій
- Навчання навичок самообслуговування
- Профілактика ускладнень +

47. Яка мета реалізації програми фізичної терапії у осіб із спастичністю?

- Зменшення спастичності
- Виконання функціонального завдання +
- Відновлення м'язового контролю
- Пригнічення діяльності рефлекторної дуги
- Навчання управлінню спастикою

48. Яку з вищих мозкових функцій можна оцінити, якщо запропонувати пацієнту назвати поточну дату?

- Орієнтацію +
- Абстракцію
- Увагу
- Мову
- Пам'ять

49. За якою шкалою оцінюють суб'єктивне сприйняття пацієнтом фізичного навантаження?

- Берга
- Борга +
- Брадена
- Бека
- Брока

50. Які терапевтичні вправи повинні бути виключені у пацієнтів із хронічною гіпертензією?

- Вправи на подолання маси свого тіла, з невеликим обтяженням та опором
- Ритмічні вправи для великих м'язових груп, з поворотами голови

- Вправи з глибокими нахилами голови вниз, з тривалими статичними зусиллями +
- Вправи на розслаблення м'язових груп та координацію рухів
- Вправи зі зміною положення тіла в просторі, з переключенням з одного виду м'язової діяльності на інший

51. У пацієнта перелом середньої третини плечової кістки. Йому накладено гіпсову пов'язку і рекомендовано курс ЛФК. На які періоди поділяється курс ЛФК цього пацієнта, залежно від етапів і термінів його лікування?

- Імобілізації, постімобілізації, відновний +
- Догоспітальний, госпітальний, загальний
- Ліжковий, напівліжковий, вільний
- Щадний, функціональний, тренувальний
- Стаціонарний, амбулаторно-поліклінічний

52. З якою метою застосовують дренажні позиції при захворюваннях органів дихання?

- Для протидії утворенню плевральних спайок
- Для зменшення проявів експіраторної задишки
- Для полегшення болю в грудній клітці при диханні
- Для підвищення сили дихальних м'язів
- Для сприяння відтоку харкотиння і гною з бронхів +

53. Під час огляду ліктьового суглоба, при зігнутому передпліччі під кутом 90°, лінії, що поєднують верхівку ліктьового виростка, зовнішній та внутрішній надвиростки в нормі утворюють:

- Рівнобедрений трикутник Гюнтера +
- Трикутник Ларррея
- Трикутник Пті
- Трикутник Богдалека
- Трикутник Морганьї

54. У пацієнта розлади рухових функцій верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для контролю ефективності його відновлення у діагностичному комплексі застосовували Індекс Бартел, Канадську шкалу продуктивності праці (COPM), тест Френчай, шкалу впливу інсульту.

Дослідження проводили з метою визначити:

- Спастичність
- Силу м'язів

- Активність у повсякденному житті +
- Діапазон рухів
- Точність та координованість рухів

55. Повна допомога під час прийому їжі надається особі зі спінальною травмою при ураженні спинного мозку на рівні:

- T1-T2
- C7-C8
- C6-C7
- C5-C6
- C1-C4 +

56. Які терапевтичні вправи потрібно виключити з програми фізичної терапії на вільному руховому режимі 20-річному пацієнтові з гіпертонічною хворобою II ступеня?

- Стрибкові +
- На рівновагу
- Силові
- На розслаблення
- На витривалість

57. Вкажіть найефективніший спосіб профілактики відлежин у пацієнтів з хребетно-спинномозковою травмою.

- Повноцінне харчування
- Мазі з трофічностимуючими властивостями
- Часта зміна положення тіла +
- Гігієна тіла
- Протипролежневі матраци та подушки

58. Яку стратегію потрібно вибрати для реалізації завдання із вдосконалення навичок пересідання на рівновисокі поверхні особою з наслідками хребетно-спинномозкової травми на рівні C7 (ASIA C)?

- Пересідання з відпрацюванням належного рівня рівноваги тіла
- Пересідання з вербальною допомогою фізичного терапевта
- Пересідання за допомогою ковзаючої поверхні +
- Пересідання з частковою допомогою фізичного терапевта
- Пересідання з повною допомогою фізичного терапевта

59. Що є протипоказанням до постурального дренажу?

- Легенева кровотеча +

- Артеріальна гіпертензія
- Субфебрильна температура
- Емфізема легень
- Наявність бронхоектазів

60. Який неінвазивний метод обстеження має найбільше значення в діагностиці інфаркту міокарда?

- Вимірювання АТ
- Аускультация
- Ехокардіографія
- Перкусія
- ЕКГ +

61. Під час обстеження підлітка реабілітолог виявив асиметрію хребта: лінія плечей і нижній кут лопатки знижені в лівий бік, лопатка наближається до хребта. Яка патологія у пацієнта?

- Плоска спина
- Сколіотична постава +
- Лордоз
- Кіфоз
- Кругла спина

62. У чоловіка віком 65 років з діагнозом: артеріальна гіпертензія, виявлено акцент II тону на аорті. Який об'єктивний метод обстеження застосовував лікар для визначення цього симптому?

- Огляд
- Перкусія
- Пальпація
- Ультразвукове дослідження серця
- Аускультация +

63. Пацієнт скаржиться на змішану задишку. При огляді відмічається тахіпное, відставання однієї половини грудної клітки в акті дихання та зглаженість міжреберних проміжків на цій стороні. При пальпації цієї сторони грудної клітки не визначається голосове тремтіння, при порівняльній перкусії виявляється тимпанічний звук. При аускультатії над зоною тимпанічного перкуторного звуку везикулярне дихання відсутнє. Який наявний синдром ураження системи дихання?

- Синдром бронхообструкції

- Синдром пневмотораксу +
- Синдром емфіземи
- Синдром порожнини в легені
- Синдром гідротораксу

64. Фізичний терапевт оцінює амплітуду рухів суглобів верхньої кінцівки та силу м'язів у пацієнта. Вкажіть загальні протипоказання до цих процедур.

- Неконсолідовані переломи, стан перед оперативним втручанням, неврит
- Інфекційний або запальний процес, розриви м'яких тканин, гіпермобільний суглоб
- Запальний процес, остеопороз, анкілоз
- Інфекційний або запальний процес, гемофілія, гематома
- Неконсолідовані переломи, післяопераційний стан, осифікуючий міозит +

65. Що з нижченаведеного найточніше підходить до адаптивних технологій для ADL?

- Ортез відпочинку, кінезіотейп, підвищене сидіння для туалету, корсет для утримання пози
- Комунікаційні дошки, спеціальне програмне забезпечення, картки для альтернативної комунікації
- Ручка з піни для олівця/ручки, адаптивна дошка для нарізання, тримач для посуду
- Стілець для душу, насадки для столових приборів та зубної щітки, тарілка з бортиком, підвищене сидіння для туалету, стакан зі зрізаним краєм +
- Крісло колісне, милиці, тростини, функціональне ліжко

66. Одним із етапів комплексної моделі реабілітаційного менеджменту у фізичній терапії є оцінювання. В якому із наведених варіантів відповідей висвітлено зміст діяльності фізичного терапевта на цьому етапі:

- Інтерпретація, аналіз та узагальнення зібраних даних +
- Анамнез, спостереження, системне опитування, тестування
- Визначення досяжних завдань та очікуваних результатів реабілітації
- Прогноз оптимального рівня та тривалості фізичної терапії

- Класифікація станів здоров'я, визначення порушень і обмежень функціонування

67. Під час участі в напівмарафоні в учасника відбулася раптова зупинка серця. Визначте частоту компресій грудної клітини дорослої людини під час проведення непрямого масажу серця при серцево-легеневій реанімації.

- 80-100 за хвилину
- 60-80 за хвилину
- 100-120 за хвилину +
- 30-50 за хвилину
- 150-180 за хвилину

68. Вкажіть консервативний метод, який найчастіше застосовують для лікування болю в плечах у користувачів інвалідних візків з ручним керуванням.

- Імобілізація
- Акупунктура
- Ін'єкції кортикостероїдів
- Вправи на зміцнення та розтяжку +
- Електрична нервова стимуляція

69. Як правильно зробити вимір сили кисті методом динамометрії?

- У відведений у бік прямій руці, одноразово
- В піднятій руці, рвучко
- У відведений у бік, прямій руці тричі +
- В опущеній вниз руці, одноразово
- У відведений вбік зігнутий у лікті руці, тричі

70. Для проведення реабілітації пацієнта після перенесеного інфаркту міокарда необхідно виконати оцінку толерантності до фізичного навантаження. Який діагностичний метод потрібно застосувати у цьому разі?

- Пікфлоуметрію
- Електрокардіографію
- Велоергометрію +
- Плавання
- Пульсоксиметрію

71. У пацієнта розлади рухових функцій верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для контролю ефективності його відновлення у діагностичному комплексі застосовували шкалу Ашворта та шкалу

інвалідизації, шкалу стійкості до пасивних рухів. Дослідження проводили з метою визначити:

- Активність у повсякденному житті
- Точність та координованість рухів
- Спастичність +
- Діапазон рухів
- Силу м'язів

72. Які дії виконує фізичний терапевт при маніпуляційному втручанні «мануальна вібрація»?

- Вібрацію низької частоти на грудну клітку під час вдиху пацієнта
- Вібрацію високої частоти на стінку грудної клітки під час видиху пацієнта +
- Вібрацію високої частоти на стінку грудної клітки під час вдиху пацієнта
- Вібрацію середньої частоти на грудну клітку під час видиху пацієнта
- Вібрацію низької частоти на стінку грудної клітки під час видиху пацієнта

73. Які індивідуальні соціальні чинники потрібно враховувати під час опитування пацієнта?

- Професія, матеріальне становище, сімейний стан, наявність домашніх тварин
- Соціальний статус, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип помешкання
- Професія, хобі, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип і поверх помешкання +
- —
- Професія, сімейний стан, хобі, хороші побутові умови

74. Пацієнт віком 37 років із клінічним діагнозом: нестабільний нефіксований перелом хребта на рівні Th12–L1, забій спинного мозку, нижня параплегія.

Яка амплітуда згинання прямої ноги при виконанні пасивних вправ у нижніх кінцівках такого пацієнта?

- Не більше 80°
- Не більше 50°
- Не більше 70°

- Не більше 90°
- Не більше 60° +

75. У чоловіка віком 68 років геморагічний інсульт, бал за шкалою ком Глазго

8. Який із заходів фізичної терапії застосовують у перші 4 дні в реанімаційному відділенні?

- Активні дихальні вправи
- Активні динамічні вправи
- Дренажні положення та динамічні вправи
- Лікування положенням та активні вправи
- Позиціонування та пасивні вправи +

76. При проведенні тесту 6-ти хвилинної ходьби, на 2-й хвилині тестування, пацієнт різко зблід. Що потрібно зробити у цьому разі?

- —
- Підбадьорити пацієнта, щоб він пройшов весь тест
- Запропонувати зробити пацієнтові відпочинок та продовжити тест
- Порадити пацієнтові знизити швидкість ходьби
- Зупинити тестування +

77. Під час стоматоскопічного та антропометричного огляду чоловіка було виявлено перевагу поздовжніх розмірів тіла над поперечними: довгі та тонкі кінцівки, довга та тонка шия, вузькі плечі, вузька та плоска грудна клітина, гострий епігастральний кут, крилоподібні лопатки, сутулувата постава, тонка, суха і бліда шкіра, слабо розвинуті м'язи та незначні жировідкладення. До якого типу тілобудови відноситься пацієнт (за Черноруцьким)?

- Нормостенічного
- Атонічного
- Гіпостенічного
- Астенічного +
- Гіперстенічного

78. Що оцінює ерготерапевт при оцінці глибокої чутливості?

- Больову чутливість
- —
- Термічну чутливість
- Кінестезію та статестезію +
- Тактильну чутливість

79. Що дозволяє оцінити Індекс Бартеля (BI) у пацієнтів, які перенесли інсульт?

- Силу м'язів
- Тонус м'язів
- Короткотривалу пам'ять
- Рівень самообслуговування +
- Когнітивні функції

80. У жінки віком 48 років, яка перенесла інфаркт міокарда, виникають больові відчуття під час підйому по сходах більше ніж на 1 поверх, спостерігається емоційне напруження. До якого функціонального класу стабільної стенокардії напруження відноситься ця пацієнтка?

- V
- IV
- II +
- I
- III

81. Яку шкалу використовують в ерготерапії для стандартизованої оцінки рівня розвитку великих моторних функцій у дітей з церебральним паралічем?

- CFCS
- MACS
- GMFCS +
- FMS
- FIM

82. Займаючись з пацієнтом дихальними вправами, яке із зазначених нижче положень не потрібно займати безпосередньо біля пацієнта?

- Ззаду і збоку
- Спереду і збоку
- Спереду
- Ззаду +
- Збоку

83. Яка стадія серцевої недостатності у пацієнта, якщо у нього є виражені гемодинамічні порушення в обох колах кровообігу, але відсутні стійкі незворотні зміни у серці, судинах, мозку, нирках?

- СН I
- СН 0

- СН ІА
- СН ІБ +
- СН ІІІ

84. Яке значення в контексті ерготерапії має глибоке переживання значення життя через участь у заняттях, що передбачають реалізацію особистих ідеологій, прагнення знайти відповіді на важливі питання про сенс життя?

- Духовності +
- Цінності особи
- Сім'ї, релігії
- Переліку особистісних переконань
- Інтересів та захоплення особи

85. У пульмонологічному відділенні на лікуванні знаходиться пацієнт віком 45 років із негоспітальною лівобічною нижньодольовою пневмонією.

Вкажіть дренажне положення, яке буде сприяти відходженню харкотиння.

- На правому боці з опущеним головним кінцем +
- Зміна положення тіла не вплине на відходження харкотиння
- На лівому боці з піднятим головним кінцем
- На правому боці з піднятим головним кінцем
- На лівому боці з опущеним головним кінцем

86. Яка мета використання допоміжних засобів в роботі з пацієнтами?

- Тренування сили нижніх кінцівок
- Забезпечити пацієнту більшу мобільність у ході відновлення його здатності пересуватись +
- Навчити його новим навичкам, які можуть знадобитись у житті
- Зменшення проявів слабкості м'язів
- Запобігання пасивно-активної роботи з пацієнтом

87. При проведенні аускультатії над нижньою частиною легень не вислуховується дихання. Для якого захворювання це характерно?

- Сухого плевриту
- Пневмонії
- Муковісцидозу
- Бронхоектатичної хвороби
- Ексудативного плевриту +

88. Яке положення є оптимальним для хворого, який дихає спонтанно, з двостороннім ураженням легені та серцевою недостатністю 2 ступеня?

- Лежачи на спині
- Лежачи з припіднятим ніжним кінцем ліжка
- Напівсидячи (напівлежачи) +
- Лежачи на правому боці
- Лежачи на лівому боці

89. При статичній атаксії виконують терапевтичні вправи, які спрямовані на:

- Відновлення сили
- Розвиток витривалості
- Відновлення гнучкості
- Підтримку амплітуди руху
- Розвиток рівноваги +

90. Вкажіть місце розташування фізичного терапевта для супроводження та страхування під час ходьби пацієнта із геміпарезом.

- Позаду і дещо збоку від пацієнта+
- Позаду або перед пацієнтом
- Перед пацієнтом на деякій відстані від нього
- Позаду на деякій відстані від пацієнта
- Перед пацієнтом і дещо збоку від нього

91. Пацієнт віком 48 років, який хворіє на бронхіальну астму, звернувся з приводу плану легеневої реабілітації. Які клінічні ознаки свідчатимуть про погіршення стану пацієнта?

- Інспіраторна задишка, клекочуче дихання
- Експіраторна задишка з подовженим видихом, вологі хрипи
- Експіраторна задишка з подовженим видихом, крепітація
- Інспіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи
- Експіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи +

92. Жінці віком 75 років після перелому великої гомілкової кістки лівої ноги накладено гіпсову пов'язку для іммобілізації та зростання. Після 5-ти тижнів гомілка лівої ноги значно зменшилася у об'ємі. Визначте вид атрофії, що виникла у пацієнтки.

- Дистрофія
- Нейрогенна атрофія
- Атрофія від тривалого здавлювання
- Дегенерація

- Атрофія внаслідок бездіяльності +

93. Яке порушення рухливості у кульшовому суглобі характеризується тим, що нога знаходиться в положенні згинання і розігнати повністю ногу хворий не може?

- Привідна контрактура
- Згинальна контрактура +
- Відвідна контрактура
- Розгинальна контрактура
- Комбінована контрактура

94. Постізометричну релаксацію використовують для ліквідації міогенних контрактур. Після закінчення ізометричного напруження м'язів пацієнта фізичний терапевт легко й повільно виконує пасивне розтягування м'язів. Упродовж скількох секунд він це робить?

- До 5 сек
- 16-20 сек
- 10-15 сек
- 21-25 сек
- 6-10 сек +

95. Пацієнт скаржиться на експіраторну задишку, задуху. Чутно дистанційні хрипи. Він займає положення ортопное, лице одутловате, ціанотичне. Допоміжна мускулатура грудної клітини приймає участь в диханні. Грудна клітка збільшена, в стані максимального вдиху, екскурсія її різко зменшена. При пальпації грудна клітка ригідна, голосове тремтіння ослаблене по всім полям. При порівняльній перкусії відчувається гучний коробковий перкуторний звук по всім полям, при топографічній — екскурсія нижнього краю легень різко обмежена. При аускультатії — ослаблене везикулярне дихання з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи різної тональності (високі, низькі). Який наявний синдром ураження системи дихання?

- Синдром емфіземи
- Синдром гідротораксу
- Синдром бронхоспазму +
- Синдром пневмотораксу
- Синдром порожнини в легені

96. Визначте поняття «стандартизований тест» у роботі ерготерапевта.

- Тест, який часто використовується для певних випадків

- —
- Тест, який пройшов процес наукового випробування, щоб визначити його валідність та надійність +
- Будь який тест з арсеналу ерготерапевта, який відповідає потребам оцінки конкретного індивіда
- Тест, який має детальну інструкцію для використання

97. Яка мета реалізації програми фізичної терапії з профілактики респіраторних ускладнень у осіб в гострому періоді хребетно-спинномозкової травми шийного відділу хребта?

- Видалення мокрот з трахіобронхіального дерева
- Попередження ателектазу +
- Збільшення екскурсії діафрагми
- Збільшення екскурсії грудної клітки
- Забезпечення вентиляції легень

98. Ерготерапевт просить пацієнта, який переніс операцію на ротаторній манжеті, дотягнутись до шафи, де лежить гребінець, та взяти його. Яка рамка практики застосовується ерготерапевтом?

- Біомеханічна +
- Соціально-адаптаційна
- Компенсаційна
- Моторного контролю
- Заняттєва

99. Як має рухатися фахівець страхуючи пацієнта під час спуску зі сходів?

- Стояти позаду пацієнта та переходити після того як пацієнт зробив крок
- Стояти на рівні з пацієнтом та рухатись одночасно з ним
- Стояти двома ногами на одній і тій самій сходинці при кожному кроці пацієнта
- Стояти нижче пацієнта та переходити на сходинку нижче, після того як пацієнт зробив крок +
- Переходити одночасно з пацієнтом

100. У чоловіка раптово почалися сильні болі в лівій половині грудної клітини, кашель, рясне кровохаркання, температура тіла підвищилася до 38,2°C. Під час обстеження встановлено, що ліва половина грудної клітини

дещо відстає в акті дихання. Під час аускультатії прослуховується крепітація і шум тертя плеври. Встановіть попередній діагноз.

- Хронічний бронхіт
- Гострий бронхіт
- Емфізема
- Пневмонія +
- Бронхіальна астма

101. Вкажіть неправильний підхід у роботі з пацієнтом з ЧМТ (черепно-мозковою травмою) IV рівня за шкалою Ранчо Лос Амігос.

- Використання спокійного та розміреного темпу виконання повсякденних занять
- Встановлення передбачуваного графіку та розпорядку дня для повернення додому
- Навчання пацієнта працювати у тихому середовищі з мінімальними відволікаючими факторами
- Використання підказок
- Незважаючи на збудження клієнта тренувати толерантності до відволікаючих факторів під час виконання завдання +

102. В процесі відновлення втрачених після інсульту функцій, активно застосовується метод дзеркальної терапії. При розладах яких функцій даний метод найбільш ефективний?

- Координаторних
- Рухових +
- Когнітивних
- Мовних
- Ковтання

103. Жінка віком 35 років має синдром зап'ясткового каналу. Скаржиться на те, що не може друкувати більше 10 хвилин, перш ніж біль стане непереборним. Які заходи фізичної терапії та ерготерапії застосовуватиметься з метою зменшення больових відчуттів перші 5 днів?

- Розтягування м'язів передпліччя почергово із ортезуванням
- Ортезування та зміцнення м'язів передпліччя
- Покращення мобільності променево-зап'ясткового суглоба та ергономіка робочого місця

- Ортезування почергово із вправами з полегшених вихідних положень +
- Покращення нейро-м'язового контролю

104. Який метод обстеження хворих із патологією органів дихання використовують під час перевірки голосового тремтіння, визначенні тургору, вологості шкіри, тону м'язів, товщини підшкірного жирового шару та периферичних лімфатичних вузлів?

- Ларингоскопія
- Пальпація +
- Мануально-м'язове тестування
- Перкусія
- Аускультация

105. Який з наведених нижче тестів використовується для оцінювання ризиків падіння у осіб із захворюваннями чи травмами центральної нервової системи?

- Індекс Рівермід
- Проба Ромберга
- Шкала Берга +
- Шкала Борга
- Індекс Бартела

106. Вкажіть правильну позицію рук фізичного терапевта при страхуванні пацієнта під час ходи.

- Одна рука розміщена на куприку, інша розміщена попереду грудей
- Одна рука розміщена на бедрах, інша тримає за плече
- Одна рука тримає за плече
- Одна рука страхує за пояс, інша тримає за плече +
- Обидві руки страхують за пояс

107. Вкажіть причину виникнення дефекту ходьби «підйом на носок» у пацієнта із протезом на трансфеморальному рівні.

- Жорсткий протез стопи
- Контрактура відвідних м'язів стегна
- Слабкість м'язів задньої поверхні стегна
- Приймальна гільза у зігнутому положенні
- Занадто довгий протез +

108. Дихальні вправи, вібраційні рухи, дренажні положення, стискання, ротацію грудної клітини пацієнтам з інсультом проводять для профілактики виникнення:

- Респіраторних ускладнень +
- Тромбозів
- Пролежнів
- Контрактур
- Патологічних поз

109. У чоловіка віком 45 років після перелому дистального відділу кісток гомілки та зняття імобілізації спостерігається атрофія м'язів на передній поверхні гомілки. Для відновлення опорно-ресорної функції стопи та зміцнення м'язів, що підтримують її зведення призначено терапевтичні вправи. Вкажіть з акцентом на які м'язи їх потрібно виконувати.

- Передній великогомілковий, довгий і короткий малогомілкові
- Довгий малогомілковий, передній і задній великогомілкові
- Передній великогомілковий, довгий розгинач пальців, довгий розгинач великого пальця +
- Передній великогомілковий, довгий згинач пальців, довгий згинач великого пальця
- Довгий, короткий і третій малогомілкові

110. Які функції нижньої кінцівки будуть порушені при розриві двоголового м'яза стегна, що виник у результаті падіння з висоти?

- Розгинання стегна і згинання гомілки +
- Супінація стопи
- Згинання стегна та гомілки
- Розгинання стегна та гомілки
- Згинання та пронація гомілки

111. Під час проведенні проби з фізичним навантаженням реакція серцево-судинної системи характеризувалася підвищенням систолічного артеріального тиску більше ніж на 70 мм рт. ст., а показник діастолічного становив більше 95 мм рт. ст. Який із нижченаведених типів реакцій спостерігається у пацієнта?

- Нормотонічний
- Гіпертонічний +
- Дистонічний

- Гіпотонічний
- Астенічний

112. У чоловіка під час дослідження встановлено відсутність усіх видів чутливості на правій половині тіла. Який вид порушення чутливості спостерігається у пацієнта?

- Гіперестезія
- Гіпестезія
- Анестезія +
- Парестезія
- Каузалгія

113. Як називається нейророзвивальна терапія, спрямована на пригнічення активності патологічних тонічних рефлексів, поступальних реакцій та рухових стереотипів із подальшим відновленням статики і моторних навичок (повзання, стояння, хода) незалежно від віку пацієнта?

- Метод рефлекс-локомоцій Войта
- Метод кондуктивної педагогіки А.Петьо
- Метод динамічного пропріоцептивного коригування (ДПК) К.О.Семенової
- Метод Бобатів +
- Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР)

114. Травматологічному пацієнту, який має зріст 170 см, після пластики передньої хрестоподібної зв'язки лівого колінного суглоба були призначені ліктьові милиці для пересування. Вкажіть правильні критерії підбору милиць для цього пацієнта.

- Лікоть зігнутий під кутом 10-15°, положення манжети — на відстані 10 см нижче від найгострішої точки ліктя
- Лікоть зігнутий під кутом 20-30°, положення манжети — на відстані 8 см нижче від найгострішої точки ліктя
- Лікоть зігнутий під кутом 40-50°, положення манжети — на відстані 11 см нижче від найгострішої точки ліктя
- Лікоть зігнутий під кутом 15-20°, положення манжети — на відстані 5 – 7 см нижче від найгострішої точки ліктя +
- Лікоть зігнутий під кутом 30-40°. положення манжети — на відстані 9 см нижче від найгострішої точки ліктя

115. Виберіть орієнтири, що допомагають орієнтуватися людям із порушенням зору, а також попереджують падіння та травмування в медичних закладах.

- Широкі двірні отвори і коридори в медичному закладі
- Ручки важільного типу на дверях кабінетів
- Пониження стійки в реєстратурі
- Скляні двері при вході в медичний заклад
- Кольорове розмежування стін, підлоги, дверей, меблі +

117. Спортсмену проведено вимірювання частоти серцевих скорочень та артеріального тиску на 5, 20 та 45 хвилинах тренування. Який вид лікарсько-педагогічного контролю використано у цьому разі?

- Повторний
- Етапний
- Поточний
- Первинний
- Оперативний +

118. За допомогою якого приладу вимірюється сила м'язів?

- Міографа
- Міотонометра
- С Тензоплатформи
- Гоніометра
- Динамометра +

119. За якою міжнародною шкалою проводиться мануально-м'язове тестування?

- 0-8 балів
- 0-5 балів +
- 1-8 балів
- 1-5 балів
- 1-10 балів

120. При проведенні перкусії, як реабілітаційного обстеження, чутно тупий чи притуплений (приглушений) легеневий звук. Які з цих факторів не вказують на нього?

- В якомусь відділі легеневої тканини утворилася друга, безповітряна тканина;

- Утворення в легенях патологічної порожнини, наповненої повітрям та оточеної фіброзним валиком +
- Плевральна порожнина, заповнена рідиною
- Плевральна порожнина, заповнена твердим середовищем
- Легеня стала менш повітряною

121. При моноартриті лівого колінного суглоба масажні прийоми потрібно починати з:

- Правого стегна
- Лівого стегна +
- Лівого колінного суглоба
- Лівої гомілки
- Правої гомілки

122. Вкажіть характерний симптом, що визначається аускультативно під час оцінки загального стану пацієнта з сухим плевритом.

- Сухі свистячі хрипи
- Вологі хрипи
- Крепітація
- Шум тертя плеври +
- Посилене везикулярне дихання

123. Які з представлених етіологічних чинників є основними факторами розвитку хронічного обструктивного бронхіту?

- Хімічні, фізичні, стресові, алергічні
- Інфекційні, алергічні, хімічні, стресові
- Фізичні, алергічні, стресові, інфекційні
- Хімічні, стресові, фізичні, інфекційні
- Фізичні, хімічні, інфекційні, алергічні +

124. Як називається сукупність моделей та поведінкових дій, очікуваних суспільством і сформованих культурою або середовищем в ерготерапії?

- Характеристики людини
- Духовність
- Орієнтири поведінкових дій особи
- Виконання ролей +
- Особистісні обов'язки

125. Якою першою ногою має зробити крок пацієнт при спуску із бордюру за допомогою двох милиць?

- Одночасно дві милиці та слабшу ногу +
- Слабшу ногу
- Одночасно дві милиці та сильнішу ногу
- Дві ноги одночасно, тримаючись на милицях
- Сильнішу ногу

126. З урахуванням яких факторів здійснюється підбір інвалідного візка?

- Функціональної потреби пацієнта
- Бажання пацієнта та його родичів
- Ваги та зросту пацієнта
- Функціональної можливості пацієнта
- Функціональної можливості, зросту та ваги тіла, функціональної потреби та активності пацієнта +

127. Фахівець з фізичної терапії проводить тест Mini Mental State Examination (MMSE) з пацієнтом неврологічного відділення. Які сфери особистості розглядаються в цій методиці?

- Орієнтування у часі та місці, сприйняття, концентрація уваги, пам'ять, мовні функції +
- Орієнтування у просторі та місці, сприйняття, концентрація уваги, депресія, мовні функції
- Орієнтування у часі та місці, слухове сприйняття, концентрація уваги, наявність апатії, мовні функції
- Орієнтування у часі та місці, сприйняття, концентрація уваги, пам'ять, дисфагія
- Орієнтування у часі та просторі, настрої, концентрація уваги, роботоздатність, мовні функції

128. Пацієнт віком 69 років, за 6 місяців після ендопротезування правого колінного суглоба, перебуває на довготривалій реабілітації. Який тест доцільно застосувати фізичному терапевту для оцінки швидкості ходьби?

- Тест «Встань та йди»
- Тест Ласега
- 10-метровий тест ходьби +
- Тест Філіпса
- 6-хвилинний тест ходьби

129. Як фізичний терапевт повинен страхувати пацієнта під час навчання умінню долати бордюри на кріслі колісному?

- Стоячи попереду, утримуючи за підніжки візка
- Стоячи позаду, в готовності до страхування
- Стоячи з боку, в готовності до страхування
- Стоячи з боку, утримуючи за раму візка
- Стоячи позаду візка, тримаючи за ручки візка +

130. Який основний метод проведення інструктажу з правильного користування допоміжним засобом?

- Підбадьорювання
- Підтримка позитивного психоемоційного стану
- Демонстрація +
- Страхування
- Фасилітація

131. 35-річний пацієнт з абсцесом легені (права легеня, середня доля, бічний сегмент) у стадії прориву більшу частину дня проводить у ліжку. Яке з наведених нижче положень є фактором ризику ускладнення стану пацієнта?

- Лежачи на спині
- Лежачи на правому боці
- Сидячи
- Стоячи
- Лежачи на лівому боці +

132. Піднімання на бордюр (до 10 см) за допомогою ходунків, відбувається:

- А Повернутися спиною, підняти сильнішу кінцівку на бордюр, перенести вагу тіла на ходунці, підняти слабку кінцівку
- Поставити ходунці. підняти слабку кінцівку на бордюр, перенести вагу тіла на ходунці, підняти сильнішу кінцівку +
- Поставити ходунці. підняти сильнішу кінцівку на бордюр, перенести вагу тіла на ходунці, підняти слабку кінцівку
- Повернутися спиною, підняти слабку кінцівку на бордюр, перенести вагу тіла на ходунці, підняти сильнішу кінцівку
- Здійснювати підйом без використання ходунків

133. До ерготерапевта звернулась сім'я з трирічним хлопчиком, який хворіє на ДЦП (геміпарез 3 рівень за GMFCS). Скаржаться на відсутність у дитини навику пиття з чашки (відсутність втягування рідини). Яка стратегія формування пиття буде найактуальнішою?

- Порекомендувати дитині відвідування логопеда та отримання логопедичного масажу
- Заміна рідини за смаком уподобання дитини та формування змикання губ на чашці
- Заміна чашки на пляшку через соломинку
- Терапевтичні вправи направлені на розвиток м'язів лиця
- За допомогою спеціального стаканчику та тренування втягування за рахунок використання тягучої рідини +

134. Процес самостійного прийому їжі входить до:

- Активності повсякденного життя +
- Виробничої активності
- Мобільності
- Інструментальної активності
- Соціальних ролей

135. Страхувальна позиція фізичного терапевта при спуску зі сходів є:

- Збоку від пацієнта
- Позаду пацієнта
- Позаду і трохи збоку від пацієнта
- Попереду і трохи збоку від пацієнта +
- Попереду пацієнта

136. При ураженні якого нерву у пацієнта спостерігається, крилоподібна лопатка?

- Блукаючий
- Блоковий
- Лицевий
- Язико-глотковий
- Довгий грудний +

137. За допомогою якого інструмента вимірюють ширину плечей, діаметри грудної клітки і таза людини?

- Сантиметрова стрічка
- Ростомір
- Динамометр
- Циркуль-каліпометр
- Товстотний циркуль +

138. Вкажіть із нижченаведеного визначення стереогнозу.

- Визначення із заплученими очима цифри, що накреслена на шкірі
- Відчуття пасивних рухів у пальцях верхніх і нижніх кінцівок
- Визначення напрямку руху шкірної складки
- Впізнання предмету шляхом його обмацування із заплученими очима +
- Визначення здатності сприймати відокремлено два подразники одночасно

139. Яке положення потрібно надати суглобу під час оцінки пасивних додаткових рухів?

- Нещільно укладене +
- Вимушене
- Анатомічне
- Індивідуальне
- Щільно укладене

140. Пацієнтка віком 48 років, ГМПК за шкалою Chedoke-McMaster Stroke Assessment, показники парезу верхньої кінцівки нижче 4-ї стадії. На якій стратегії відновлення для такої пацієнтки краще сфокусуватися асистенту фізичного терапевта?

- Адаптації самообслуговування
- Профілактики та стимуляції
- Відновлення та стимуляції
- Повного відновлення функцій
- Підтримування та компенсації +

141. Оберіть мобілізаційний прийом, який використовується при згинальній контрактурі в променево-зап'ястковому суглобі:

- —
- Ковзання вниз +
- Ковзання вгору
- Ковзання медіальне
- Ковзання латеральне

142. Вкажіть форму ДЦП для якої характерно: несвідомі, неконтрольовані, повторювані, іноді стереотипні рухи уражених частин тіла, а також патологічний зразок положення тіла та/або рухів.

- Спастична диплегія

- Атаксія
- Дискінетична +
- Спастичний геміпарез
- Спастичний тетрапарез

143. У чоловіка віком 45 років в анамнезі ХОЗЛ. Скаржиться на задишку, що посилюється під час незначного навантаження та малопродуктивний кашель. Вкажіть найбільш інформативний метод для визначення дихальної недостатності у пацієнта.

- Рентгенографія органів грудної клітки
- Бронхоскопія
- Бронхографія
- Комп'ютерна томографія легень
- Спірографія +

144. Який технічний засіб допомоги обов'язково застосовується для безпечного супроводження та страхування пацієнта під час ходьби?

- Пояс для ходи, підвісна система +
- Милиці, пояс для ходи
- Тростина, підвісна система
- Крісло колісне
- Ходунці, пояс для ходи

145. З якою метою пацієнт має оволодіти навичками переміщення в положеннях лежачи та сидячи?

- Для покращення психоемоційного стану
- Для зменшення спастичності
- Для зміцнення здорових частин тіла
- Для уникнення розвитку контрактур або пошкоджень шкіри +
- Це є одним з базових принципів нейропластичності

146. Пацієнту віком 27 років, який хворіє на бронхіальну астму, сімейним лікарем призначено 20 профілактичних сеансів переривчастої гіпоксичної терапії на стадії ремісії захворювання. Який очікуваний ефект дозованих інтервальних гіпоксичних тренувань сприятиме попередженню виникнення наступного загострення хвороби?

- Підвищення тонуусу гладеньких м'язів бронхіол
- Зниження тонуусу гладеньких м'язів мікросудин +
- Підвищення ефективності мукоциліарного кліренсу

- Підвищення тонуусу гладеньких м'язів мікросудин
- Зниження тонуусу гладеньких м'язів бронхіол

147. Пацієнт скаржиться на змішану задишку. При огляді відмічається тахіпноє, відставання однієї половини грудної клітки в акті дихання та зглаженість міжреберних проміжок на цій стороні. В нижньому відділі цієї сторони грудної клітки при пальпації не визначається голосове тремтіння, при порівняльній перкусії виявляється притуплений звук, а при топографічній — обмеження рухомості нижнього краю легені. При аускультії над зоною притуплення перкуторного звуку везикулярне дихання відсутнє, а вище цієї зони — ослаблене. Який наявний синдром ураження системи дихання?

- Синдром емфіземи
- Синдром бронхообструкції
- Синдром гідротораксу
- Синдром пневмотораксу +
- Синдром порожнини в легені

148. У пацієнта розлади рухових функцій верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для контролю ефективності його відновлення у діагностичному комплексі застосовували визначення об'єму активних та пасивних рухів, максимального кута розгинання при спробі дотягування. Дослідження проводили з метою визначити:

- Активність у повсякденному житті
- Силу м'язів
- Точність та координованість рухів
- Діапазон рухів +
- Спастичність

149. Яке втручання з метою профілактики контрактур є найефективнішим для пацієнта з наслідками хребетно-спинномозкової травми (ASIA A)?

- Пасивні рухи та позиціонування
- Масаж та діяльність повсякденного життя
- Вправи на збільшення м'язової сили та розтяг
- Позиціонування та вправи на збільшення м'язової сили
- Позиціонування та діяльність повсякденного життя +

150. Що з нижщенаведених чинників вказує на те, що крісло колісне є небезпечним і не готовим до використання?

- Вилка переднього направляючого колеса вільно обертається
- Підніжки надійно закріплені
- Крісло колісне їде по прямій лінії
- Немає гострих країв
- Спинка складної рами туго складається вперед і розкладається. +