

Варіант 1

1. Дитина віком 12 років хворіє на поліомієліт. Починають виникати парези та паралічі. Які методи реабілітації будуть використовуватися у цьому періоді?

- Статичні дихальні вправи та лікування положенням +
- –
- ЛФК та фізіотерапевтичні процедури
- Гідрокінезіотерапія та масаж
- Масаж та терапевтичні вправи

2. Який тест доцільно застосувати для дослідження маніпулятивної функції кисті та можливості виконувати повні захоплення у пацієнтів із патологічними синергіями?

- Тінетті
- Мотрісіті
- Ловетта
- Фугл-Мейєра +
- Френчай

3. Вихідний показник пікфлоуметрії у пацієнта віком 15 років із бронхіальною астмою становив 600 л/хв. Який повторний показник на 5-ій хв відпочинку після тесту 6-хвилинної ходьби буде вказувати на реакцію бронхів (звуження) на фізичне навантаження?

- 550 л/хв
- 505 л/хв +
- 615 л/хв
- 515 л/хв
- 690 л/хв

4. Який суглоб найчастіше вражається першим при подагрі у чоловіків?

- Перший плеснофаланговий +
- Колінний
- Кульшовий
- Ліктьовий
- Променево-зап'ястковий

5. Чоловік із діагнозом: двостороння крупозна пневмонія, знаходиться в стаціонарі 5 добу. З метою покращення вентиляції в обох легенях йому призначені спеціальні дихальні вправи. Яким є найвигідніше положення для пацієнта під час їх виконання?

- На боці з опорою рук фізичного терапевта
- Лежачи на животі
- Стоячи +
- Лежачи руки на грудній клітці
- Сидячи руки на плечах

6. Рентгенологічно у пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?

- Великого грудного м'яза
- Великого круглого м'яза
- Найширшого м'яза спини
- Двоголового м'яза плеча +
- Дельтоподібного м'яза

7. Після родової травми у новонародженої дитини спостерігається: обмеження руху верхньої кінцівки, гіпорексія, м'язова атрофія. До якого виду рухових порушень належать ці зміни нервової системи?

- Бульбарні розлади
- Порушення нижнього мотонейрона +
- Міастенія
- Пірамідальні порушення
- Порушення верхнього мотонейрона

8. Які вправи доцільно рекомендувати пацієнтам, які хворіють на гіпертонічну хворобу в різних стадіях, з метою зниження артеріального тиску?

- Дихальні із затримкою дихання на видиху +
- Ізометричні
- Ритмопластичні
- Ізотонічні
- Дихальні із затримкою дихання на вдиху

9. Під час обстеження кардіологічного хворого, було виявлено систолічний артеріальний тиск на рівні 170 мм рт. ст., діастолічний — 105 мм рт.ст. Який ступінь артеріальної гіпертензії у чоловіка?

- II +
- III

- IV
- V
- I

10. Які додаткові рухи не застосовують під час використання методу «суглобової гри»?

- Обертання +
- Згинання
- Витягання
- Кочення
- Ковзання

11. З метою профілактики пролежнів медична сестра фізіотерапевтичного відділення розмістила пацієнта в положення Сімса. Охарактеризуйте це положення.

- Напівсидяче положення
- Положення на боку
- Положення на животі
- Положення на спині
- Проміжне між положенням на животі та на боку +

12. Виберіть із нижче наведених варіантів метод обстеження, що доцільно застосувати для визначення рівня ризику падіння у пацієнта, який три тижні тому переніс закриту черепно-мозкову травму.

- Шкала падінь Морсе +
- Шкала ком Глазго
- Мануально-м'язове тестування
- Оціночний тест Фугл-Мейєра
- Тест Берга

13. У підлітка віком 15 років під час візуального обстеження було з'ясовано, що грудна клітка заглиблена в нижній частині грудини, особливо в ділянці мечоподібного відростка. На яку форму грудної клітки вказують отримані результати обстеження?

- Емфізематорну
- Рахітичну
- Лійкоподібну +

- Астенічну
- Воронкоподібну

14. Протези кінцівок за призначенням поділяють на:

- Активні та косметичні
- Анатомічні та спеціалізовані
- Професійні та побутові
- Функціональні та косметичні +
- Активні та анатомічні

15. Якою повинна бути відстань між верхньою перекладиною і пахвовою западиною для безпечного пересування пацієнта на пахвових милицях?

- 1-3 см
- 3-4 см
- 4-5 см +
- 2-3 см
- 5-7 см

16. Вкажіть неврологічний рівень пошкодження спинного мозку, за якого прогностично пацієнт здатен буде до навчання ходьбі за допомогою ортезів і милиць.

- L1-2
- S2-4
- L2-3 +
- L1-Th11
- L4-S1

17. Пацієнт віком 38 років у стані спокою мав ЧСС – 70/хв та АТ – 120/80 мм рт. ст. Відразу після виконання стандартного навантаження «20 присідань за 30 секунд» спостерігається: ЧСС — 160/хв, АТ — 130/85 мм рт. ст. Яким є тип реакції серцево-судинної системи на навантаження у цього пацієнта?

- Гіпотонічний +
- Східчастий
- Нормотонічний
- Гіпертонічний
- Дистонічний

18. Який основний метод проведення інструктажу з правильного користування допоміжним засобом?

- Фасилітація

- Підтримка позитивного психоемоційного стану
- Страхування
- Підбадьорювання
- Демонстрація +

19. Укажіть денну тривалість аеробних вправ помірної та високої інтенсивності для пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень.

- 100-120 хв
- 20-60 хв +
- 60-80 хв
- 10-20 хв
- 80-100 хв

20. Після силових вправ у спортзалі спортсмен помітив зміну кольору шкіри та підвищення температури м'язів, які він тренував. Який негативний наслідок артеріальної гіперемії можливий у цьому разі?

- Розриви стінок мікроциркуляторних судин +
- Підвищення лімфоутворення та поява набряку
- Підвищення функціональної активності клітин
- Гіпертрофія та гіперплазія клітин та тканин
- Пригнічення місцевого імунітету

21. Який метод обстеження пацієнтів із патологією органів дихання використовують під час перевірки голосового тремтіння, визначенні тургору, вологості шкіри, тону м'язів, товщини підшкірного жирового шару та периферичних лімфатичних вузлів?

- Пальпацію +
- Ларингоскопію
- Аускультацию
- Перкусію
- Мануально-м'язове тестування

22. У разі ураження якого рівня спинного мозку пацієнту надається повна допомога під час прийому їжі?

- C7-C8
- C6-C7
- C5-C6
- T1-T2

- C1-C4 +

23. У підлітка віком 14 років під час візуального обстеження грудної клітки груднина виступає вперед у вигляді гребеня (кіля). Пальпаторно в місцях переходу реберних хрящів у кістку фіксуються чоткоподібні потовщення. На яку форму грудної клітки вказують результати обстеження?

- Лійкоподібна
- Рахітична +
- Емфізематозна
- Гіперстенічна
- Астенічна

24. Пацієнт із діагнозом: адгезивний капсуліт — має контрактуру плечового суглоба. Під час обстеження було встановлено обмеження відведення 80° та кінцеве відчуття капсульне патологічне. Які додаткові компоненти руху є обмеженими в аспекті артрокінематики суглоба?

- Ковзання вгору та кручення
- Ковзання вниз і кручення
- —
- Ковзання вниз і кочення вгору +
- Ковзання вгору та кочення вниз

25. Під час проведення соматоскопії пацієнта фізичний терапевт встановив, що його грудний кіфоз становить 2 см, а поперековий лордоз — 4 см. Укажіть форму спини пацієнта.

- Кругла
- Нормальна +
- Плоска
- Кругло-увігнута
- Плоско-увігнута

26. Який спірографічний показник вважається найкращим для оцінки ступеня обструкції дихальних шляхів?

- Хвилинний об'єм дихання (ХОД)
- Об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) +
- Максимальна вентиляція легень (МВЛ)

- Функціональна залишкова ємність легень (ФЗЄ)
- Форсована життєва ємність легень (ФЗЄЛ)

27. Чоловік віком 42 роки потрапив до нефрологічного відділення зі скаргами на біль у поперековій ділянці. В анамнезі: хронічний гломерулонефрит. Після проведеної терапії його стан дещо покращився, призначено фізичну терапію. Укажіть, у якому періоді для цього захворювання показано лікувальний масаж спини?

- У фазі загострення
- У фазі ремісії +
- При спінальному болю
- У фазі згасаючого загострення
- При м'язовому спазмі

28. У пацієнтки віком 56 років, яка хворіє на бронхіальну астму, об'єктивно спостерігається: обличчя ціанотичне, шийні вени набухші, кашляє, під час дихання чути свистячі хрипи, жінка налякана. Яке положення необхідно надати для полегшення стану?

- Лежачи на животі
- Лежачи з піднятими ногами
- Лежачи з піднятим головним кінцем
- Ортопное +
- Стоячи

29. Вкажіть особливості позиціонування пацієнтів, які перенесли ендопротезування кульшового суглоба, в перші дні.

- У зручному положенні, не має значення на якому боці
- У положенні лежачи на спині, оперована нога в положенні відведення +
- У положенні на неоперовану сторону тіла, міжколінами знаходиться валик
- Таких рекомендацій немає
- У положенні на оперованому боці, щоб суглоб набув правильної позиції

30. Пацієнту з ішемічним інсультом асистент ерготерапевта задає питання під час його пересування. Чоловік, для того щоб відповісти, зупиняється. Який дефіцит ми можемо спостерігати у пацієнта?

- Дефіцит перемикання уваги та розуміння
- Дефіцит зосередженої уваги та розуміння
- Дефіцит розділеної уваги та концентрації уваги+

- Дефіцит вибіркової уваги та сприйняття
- Дефіцит концентрації уваги та сприйняття

31. Пацієнт скаржиться на змішану задишку. Об'єктивно виявлено: тахіпное, відставання однієї половини грудної клітки в акті дихання та згладженість міжреберних проміжків на цьому боці. У нижньому відділі цього боку грудної клітки під час пальпації не визначається голосове тремтіння, при порівняльній перкусії виявляється притуплений звук, а при топографічній — обмеження рухомості нижнього краю легені. Під час аускультатії над зоною притуплення перкуторного звуку везикулярне дихання відсутнє, а вище цієї зони — ослаблене. Який наявний синдром ураження системи дихання?

- Синдром пневмотораксу
- Синдром порожнини в легені
- Синдром гідротораксу +
- Синдром бронхообструкції
- Синдром емфіземи

32. Як правильно зробити вимір сили кисті методом динамометрії?

- У відведеній убік, прямій руці тричі +
- У відведеній убік прямій руці, одноразово
- В опущеній вниз руці, одноразово
- У відведеній вбік зігнутий у лікті руці, тричі
- У піднятій руці, різко

33. Які терапевтичні вправи потрібно виключити з програми фізичної терапії на вільному руховому режимі 20-річному пацієнтові з гіпертонічною хворобою II ступеня?

- Стрибкові +
- На рівновагу
- Силові
- На розслаблення
- На витривалість

34. У пацієнта розлади рухових функцій верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для контролю ефективності його відновлення у діагностичному комплексі застосовували Індекс Бартел, Канадську шкалу

продуктивності праці (COPM), тест Френчай, шкалу впливу інсульту.

Дослідження проводили з метою визначити:

- Спастичність
- Силу м'язів
- Активність у повсякденному житті +
- Діапазон рухів
- Точність та координованість рухів

35. Одним із етапів комплексної моделі реабілітаційного менеджменту у фізичній терапії є оцінювання. В якому із наведених варіантів відповідей висвітлено зміст діяльності фізичного терапевта на цьому етапі:

- Інтерпретація, аналіз та узагальнення зібраних даних +
- Анамнез, спостереження, системне опитування, тестування
- Визначення досяжних завдань та очікуваних результатів реабілітації
- Прогноз оптимального рівня та тривалості фізичної терапії
- Класифікація станів здоров'я, визначення порушень і обмежень функціонування

36. Ерготерапевт просить пацієнта, який переніс операцію на ротаторній манжеті, дотягнутись до шафи, де лежить гребінець, та взяти його. Яка рамка практики застосовується ерготерапевтом?

- Біомеханічна +
- Соціально-адаптаційна
- Компенсаційна
- Моторного контролю
- Заняттєва

37. Визначте поняття «стандартизований тест» у роботі ерготерапевта.

- Тест, який часто використовується для певних випадків
- —
- Тест, який пройшов процес наукового випробування, щоб визначити його валідність та надійність+
- Будь який тест з арсеналу ерготерапевта, який відповідає потребам оцінки конкретного індивіда
- Тест, який має детальну інструкцію для використання

38. Якою першою ногою має зробити крок пацієнт при спуску із бордюру за допомогою двох милиць?

- Одночасно дві милиці та слабшу ногу +
- Слабшу ногу
- Одночасно дві милиці та сильнішу ногу
- Дві ноги одночасно, тримаючись на милицях
- Сильнішу ногу

39. Як фізичний терапевт повинен страхувати пацієнта під час навчання умінню долати бордюри на кріслі колісному?

- Стоячи попереду, утримуючи за підніжки візка
- Стоячи позаду, в готовності до страхування
- Стоячи з боку, в готовності до страхування
- Стоячи з боку, утримуючи за раму візка
- Стоячи позаду візка, тримаючи за ручки візка +

40. У пацієнтки віком 56 років, яка хворіє на бронхіальну астму, об'єктивно спостерігається: обличчя ціанотичне, шийні вени набухлі, кашляє, під час дихання чути свистячі хрипи, жінка налякана. Яке положення необхідно надати пацієнтці для полегшення стану?

- Стоячи
- Лежачи на животі
- Лежачи з піднятим головним кінцем
- Лежачи з піднятими ногами
- Ортопное +

41. З якого боку повинен знаходитися фізичний терапевт для страхування пацієнта з геміплегією в положенні сидючи?

- Позаду пацієнта
- Зі здорової сторони тіла
- Спереду і з боку геміплегії
- Попереду пацієнта
- З геміплегічного боку тіла +

42. Які функції чотириголового м'яза впливають на стереотип ходьби?

- Стабілізація коліна та розгинання гомілки +

- Супінація та згинання гомілки
- Розгинання та супінація стегна
- Згинання та пронація стегна
- Генерація сили у фазі опору

43. Пацієнт віком 30 років скаржиться на обмеження рухливості в правому ліктьовому суглобі. З анамнезу відомо, що 7 місяців тому отримав термічний опік зовнішньої поверхні ліктьового суглоба на глибині до підшкірної клітковини. Об'єктивно спостерігається: рубцева тканина на зовнішній поверхні правого ліктьового суглоба та обмеження згинання у цьому суглобі. Який прийом масажу найбільш доцільно застосувати в цьому разі?

- Вібрація
- Розтирання +
- Вижимання
- Погладжування
- Розминання

44. У чоловіка віком 45 років після перелому дистального відділу кісток гомілки та зняття імобілізації спостерігається атрофія м'язів на передній поверхні гомілки. Для відновлення опорно-ресорної функції стопи та зміцнення м'язів, що підтримують її зведення, призначено терапевтичні вправи. Укажіть, з акцентом на які м'язи їх потрібно виконувати.

- Передній великогомілковий, довгий розгинач пальців, довгий розгинач великого пальця
- Передній великогомілковий, довгий і короткий малогомілкові +
- Передній великогомілковий, довгий згинач пальців, довгий згинач великого пальця
- Довгий, короткий і третій малогомілкові
- Довгий малогомілковий, передній і задній великогомілкові

45. Фахівець з фізичної терапії проводить тест Mini Mental State Examination (MMSE) з пацієнтом неврологічного відділення. Які сфери особистості розглядаються в цій методиці?

- Орієнтування у часі та місці, сприйняття, концентрація уваги, пам'ять, мовні функції +
- Орієнтування у просторі та місці, сприйняття, концентрація уваги, депресія, мовні функції

- Орієнтування у часі та місці, слухове сприйняття, концентрація уваги, наявність апатії, мовні функції
- Орієнтування у часі та місці, сприйняття, концентрація уваги, пам'ять, дисфагія
- Орієнтування у часі та просторі, настрої, концентрація уваги, роботоздатність, мовні функції

46. Пацієнт скаржиться на змішану задишку. Об'єктивно виявлено: тахіпное, відставання однієї половини грудної клітки в акті дихання та згладженість міжреберних проміжків на цьому боці. Під час пальпації цього боку грудної клітки не визначається голосове тремтіння, при порівняльній перкусії виявляється тимпанічний звук. Аускультативно — над зоною тимпанічного перкуторного звуку везикулярне дихання відсутнє. Який наявний синдром ураження системи дихання?

- Синдром гідротораксу
- Синдром бронхообструкції
- Синдром порожнини в легені
- Синдром пневмотораксу+
- Синдром емфіземи

47. Хто несе відповідальність за безпечну роботу на фізіотерапевтичному обладнанні, оформляє на кожний кабінет технічний паспорт, що включає перелік приміщень, їх оснащення і захисні пристрої та розробляє інструкції з техніки безпеки для кожного кабінету?

- Асистент фізіотерапевта
- Фізіотерапевт
- Сестра медична фізіотерапевтичного відділення
- Технічний персонал фізіотерапевтичного відділення
- Завідувач фізіотерапевтичного відділення +

48. Фізичний терапевт проводить мануальне м'язове тестування привідних м'язів стегна. Який принцип є основним правилом тестування та оцінки м'язової сили?

- —
- Розслаблення та подолання
- Розслаблення та напруження
- Напруження та подолання +

- Напруження та розслаблення

49. Процес самостійного прийому їжі входить до:

- Активності повсякденного життя +
- Виробничої активності
- Мобільності
- Інструментальної активності
- Соціальних ролей

50. Вкажіть форму ДЦП для якої характерно: несвідомі, неконтрольовані, повторювані, іноді стереотипні рухи уражених частин тіла, а також патологічний зразок положення тіла та/або рухів.

- Спастична диплегія
- Атаксія
- Дискінетична +
- Спастичний геміпарез
- Спастичний тетрапарез

51. Укажіть причину виникнення дефекту ходьби «підйом на носок» у пацієнта із протезом на трансфеморальному рівні.

- Слабкість м'язів задньої поверхні стегна
- Жорсткий протез стопи
- Контрактура відвідних м'язів стегна
- Занадто довгий протез +
- Приймальна гільза у зігнутому положенні

52. Укажіть правильну позицію рук фізичного терапевта при страхуванні пацієнта під час ходьби.

- Одна рука страхує за пояс, інша тримає за плече
- Одна рука тримає за плече
- Одна рука розміщена на куприку, інша розміщена попереду грудей
- Одна рука розміщена на бедрах, інша тримає за плече +
- Обидві руки страхують за пояс

53. Чоловіку віком 60 років два дні тому виконано ендопротезування правого кульшового суглоба. Укажіть обмеження, яких повинен дотримуватися пацієнт упродовж 3-х місяців.

- Сідати під кутом більше ніж на 90° між тулубом та нижніми кінцівками +

- Піднімати пряму кінцівку на 30° при розігнутому коліні
- Підніматися сходами
- Лягати на здоровий бік із подушкою між ногами
- Відводити пряму нижню кінцівку більше ніж на 30°

54. Яку стратегію потрібно вибрати для реалізації завдання із вдосконалення навичок пересідання на рівновисокі поверхні особою з наслідками хребетно-спинномозкової травми на рівні C7 (ASIA C)?

- Пересідання з вербальною допомогою фізичного терапевта
- Пересідання за допомогою ковзкої поверхні +
- Пересідання з відпрацюванням належного рівня рівноваги тіла
- Пересідання з повною допомогою фізичного терапевта
- Пересідання з частковою допомогою фізичного терапевта

55. З якою метою пацієнт має оволодіти навичками переміщення в положеннях лежачи та сидячи?

- Для покращення психоемоційного стану
- Для зменшення спастичності
- Для зміцнення здорових частин тіла
- Для уникнення розвитку контрактур або пошкоджень шкіри +
- Це є одним з базових принципів нейропластичності

56. Пацієнту з травмою колінного суглоба рекомендовано виконувати силові вправи для чотириголового м'яза стегна 3 рази на тиждень. Кожну вправу треба виконувати 8 разів, по 2 підходи, у повільному темпі. Застосування якого мнемонічного принципу дозволяє якісно описати дозування фізичного навантаження?

- SOAP
- RICE
- SMART
- FITT +
- PQRST

57. Під час обстеження тактильної чутливості дистального відділу верхньої кінцівки виявлено, що пацієнт розпізнає локалізацію дотику пензлем до шкіри кисті на відстані 3 см від місця подразнення. Про що свідчать отримані дані обстеження?

- Чутливість відсутня

- Чутливість знижена
- Чутливість підвищена
- –
- Чутливість у межах норми +

58. У пульмонологічному відділенні на лікуванні знаходиться пацієнт віком 45 років із негоспітальною лівобічною нижньодольовою пневмонією.

Вкажіть дренажне положення, яке буде сприяти відходженню харкотиння.

- На правому боці з опущеним головним кінцем +
- Зміна положення тіла не вплине на відходження харкотиння
- На лівому боці з піднятим головним кінцем
- На правому боці з піднятим головним кінцем
- На лівому боці з опущеним головним кінцем

59. Вкажіть місце розташування фізичного терапевта для супроводження та страхування під час ходьби пацієнта із геміпарезом.

- Позаду і дещо збоку від пацієнта +
- Позаду або перед пацієнтом
- Перед пацієнтом на деякій відстані від нього
- Позаду на деякій відстані від пацієнта
- Перед пацієнтом і дещо збоку від нього

60. Спортсмену проведено вимірювання частоти серцевих скорочень та артеріального тиску на 5, 20 та 45 хвилинах тренування. Який вид лікарсько-педагогічного контролю використано у цьому разі?

- Повторний
- Етапний
- Поточний
- Первинний
- Оперативний +

61. Який неінвазивний метод обстеження має найбільше значення в діагностиці інфаркту міокарда?

- Вимірювання АТ
- Аускультация
- Ехокардіографія
- Перкусія

- ЕКГ +

62. У пацієнта розлади рухових функцій верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для контролю ефективності його відновлення у діагностичному комплексі застосовували шкалу Ашворта та шкалу інвалідизації, шкалу стійкості до пасивних рухів. Дослідження проводили з метою визначити:

- Активність у повсякденному житті
- Точність та координованість рухів
- Спастичність +
- Діапазон рухів
- Силу м'язів

63. Які з представлених етіологічних чинників є основними факторами розвитку хронічного обструктивного бронхіту?

- Хімічні, фізичні, стресові, алергічні
- Інфекційні, алергічні, хімічні, стресові
- Фізичні, алергічні, стресові, інфекційні
- Хімічні, стресові, фізичні, інфекційні
- Фізичні, хімічні, інфекційні, алергічні +

64. У пацієнта розлади рухових функцій верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для контролю ефективності його відновлення у діагностичному комплексі застосовували пальце-носову пробу, тест «коробка та кубики», тест із дев'ятьма отворами та стрижнями. Дослідження проводили з метою визначити:

- Силу м'язів
- Активність у повсякденному житті
- Діапазон рухів
- Спастичність
- Точність та координованість рухів +

65. Якою повинна бути відстань між верхньою перекладиною і паховою западиною для безпечного пересування пацієнта на пахових милицях?

- 1-3 см
- 3-4 см

- 4-5 см +
- 2-3 см
- 5-7 см

66. З якого положення здійснюються мобілізаційні прийоми для проксимального плечо-променевого суглоба?

- 90° згинання та пронація
- Максимальне розгинання та супінація +
- 75° згинання та супінація
- 90° згинання та супінація
- Максимальне розгинання та пронація

67. Яка мета реалізації програми фізичної терапії у осіб із спастичністю?

- Зменшення спастичності
- Виконання функціонального завдання +
- Відновлення м'язового контролю
- Пригнічення діяльності рефлексорної дуги
- Навчання управлінню спастикою

68. Під час огляду ліктьового суглоба, при зігнутому передпліччі під кутом 90°, лінії, що поєднують верхівку ліктьового виростка, зовнішній та внутрішній надвиростки в нормі утворюють:

- Рівнобедрений трикутник Гюнтера +
- Трикутник Ларррея
- Трикутник Піті
- Трикутник Богдалека
- Трикутник Морганьї

69. Яку шкалу використовують в ерготерапії для стандартизованої оцінки рівня розвитку великих моторних функцій у дітей із церебральним паралічем?

- CFCS
- MACS
- FIM
- GMFCS +

- FMS

70. Що дозволяє оцінити Бартел Індекс (BI) у пацієнтів, які перенесли інсульт?

- Рівень самообслуговування +
- Силу м'язів
- Короткотривалу пам'ять
- Тонус м'язів
- Когнітивні функції

71. Пацієнт скаржиться на експіраторну задишку. Об'єктивно виявлено: чутно дистанційні хрипи, положення ортонное, лице набрякле, ціанотичне. допоміжна мускулатура грудної клітки бере участь в акті дихання. Грудна клітка збільшена, в стані максимального вдиху, екскурсія її різко зменшена. Під час пальпації грудна клітка ригідна, голосове тремтіння ослаблене по всіх полях. При порівняльній перкусії відчувається гучний коробковий перкуторний звук у всіх полях, при топографічній — екскурсія нижнього краю легень різко обмежена. Аускультативно — ослаблене везикулярне дихання з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи різної тональності (високі, низькі). Який наявний синдром ураження системи дихання?

- Синдром пневмотораксу
- Синдром бронхоспазму
- Синдром гідротораксу
- Синдром емфіземи +
- Синдром порожнини в легені

72. Під час обстеження пацієнта з наслідками ЧМТ за тестом «Встань та йди» було отримано результат — 15 с. Яка здатність до переміщення у цього пацієнта?

- Переважно незалежна здатність до переміщення +
- Обмежена здатність до переміщення
- Переважно обмежена здатність до переміщення
- Порушена здатність до переміщення
- Вільна здатність до переміщення

73. Які індивідуальні соціальні чинники потрібно враховувати під час опитування пацієнта?

- Професія, матеріальне становище, сімейний стан, наявність домашніх тварин

- Соціальний статус, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип помешкання
- Професія, хобі, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип і поверх помешкання +
- –
- Професія, сімейний стан, хобі, хороші побутові умови

74. У чоловіка віком 68 років геморагічний інсульт, бал за шкалою ком Глазго 8. Який із заходів фізичної терапії застосовують у перші 4 дні в реанімаційному відділенні?

- Активні дихальні вправи
- Активні динамічні вправи
- Дренажні положення та динамічні вправи
- Лікування положенням та активні вправи
- Позиціонування та пасивні вправи +

75. Яка стадія серцевої недостатності у пацієнта, якщо у нього є виражені гемодинамічні порушення в обох колах кровообігу, але відсутні стійкі незворотні зміни у серці, судинах, мозку, нирках?

- СН I
- СН 0
- СН ІА
- СН ІБ +
- СН ІІІ

76. Під час обстеження пацієнта, який лежить на спині, різке приведення голови до грудей викликало гострий біль у попереку та по ходу сідничного нерва. Перевірка якого симптому спричинила таку реакцію?

- Вассермана
- Керніга
- Брудзинського
- Нері +
- Ласега

77. Яку здатність людини ерготерапевту дозволяє оцінити універсальний опитувальник «активності у повсякденному житті» (Activities of Daily Living-ADL)?

- Інструментальну активність повсякденного життя
- Заняттєву активність
- Діяльність в аспекті її важливості для пацієнта
- До самостійного існування +
- Задоволеність від виконання певної діяльності

78. При статичній атаксії виконують терапевтичні вправи, які спрямовані на:

- Відновлення сили
- Розвиток витривалості +
- Відновлення гнучкості
- Підтримку амплітуди руху
- Розвиток рівноваги

79. Яка мета реалізації програми фізичної терапії з профілактики респіраторних ускладнень у осіб в гострому періоді хребетно-спинномозкової травми шийного відділу хребта?

- Видалення мокрот з трахіобронхіального дерева
- Попередження ателектазу
- Збільшення екскурсії діафрагми
- Збільшення екскурсії грудної клітки
- Забезпечення вентиляції легень +

80. Який тест можна застосувати для дослідження маніпулятивного рівня кисті та можливості виконувати повні захоплення?

- Фугл-Мейєра
- Френчай +
- Тінетті
- Ловетта
- Мотрісіті

81. Визначте інтенсивність планованого навантаження (робочу ЧСС) для пацієнта віком 65 років з ішемічною хворобою серця I-II ФК.

- 100-108
- 116-124 +
- 132-140
- 124-132
- 108-116

82. Пацієнт звернувся зі скаргами на біль у плечовому суглобі, який провокується рухами над головою. У результаті суб'єктивної оцінки у лікаря

виникла гіпотеза щодо міогенного джерела болю. Якими методами об'єктивної оцінки можна підтвердити цю гіпотезу?

- Оцінкою активного/пасивного руху, тестування ізометричним напруженням, пальпацією +
- Оцінкою пасивного діапазону руху, ММТ, пальпацією
- Оцінкою активного/пасивного діапазону руху, ММТ, оцінкою суглобової гри
- Оцінкою активного/пасивного руху, оцінкою суглобової гри
- Оцінкою активного/пасивного діапазону руху, ММТ

83. Які клінічні ознаки свідчатимуть про погіршення стану пацієнта, який хворіє на бронхіальну астму?

- Експіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи +
- Експіраторна задишка з подовженим видихом, вологі хрипи
- Інспіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи
- Інспіраторна задишка, клекочуче дихання
- Експіраторна задишка з подовженим видихом, крепітація

84. Після родової травми у новонародженої дитини відзначаються: обмеження рухів верхніх кінцівок, гіпорексія, м'язова атрофія. До якого виду рухових порушень відносяться ці зміни нервової системи?

- Порушення нижнього мотонейрону +
- Пірамідальні порушення
- Порушення верхнього мотонейрону
- Міастенія
- Бульбарні розлади

85. Що дозволяє оцінити Індекс Бартеля (ВІ) у пацієнтів, які перенесли інсульт?

- Силу м'язів
- Тонус м'язів
- Короткотривалу пам'ять
- Рівень самообслуговування +
- Когнітивні функції

86. Із якою метою застосовують дренажні позиції при захворюваннях органів дихання?

- Для підвищення сили дихальних м'язів

- Для сприяння відтоку мокротиння та гною з бронхів +
- Для зменшення проявів експіраторної задишки
- Для полегшення болю в грудній клітці при диханні
- Для протидії утворенню плевральних спайок

87. Фізичний терапевт у палаті інтенсивної терапії планує проведення позиціонування пацієнта після гострого порушення мозкового кровообігу з ознаками лівостороннього геміпарезу. Який недолік позиціонування пацієнта в положенні лежачи на правому боці?

- Погіршення респіраторної функції
- Підвищення негативного впливу шийних тонічних рефлексів
- Зменшення активності +
- Неможливість розміщення хворих кінцівок в антиспастичних положеннях
- Збільшення ризику розвитку пролежнів

88. Після травми верхньої кінцівки пацієнту важко піднімати її вбік-вгору. Укажіть вид активної вправи, який може допомогти пацієнту покращити фізичний стан верхньої кінцівки.

- Розгинання
- Згинання
- Ротація
- Приведення
- Відведення +

89. В процесі відновлення втрачених після інсульту функцій, активно застосовується метод дзеркальної терапії. При розладах яких функцій даний метод найбільш ефективний?

- Координаторних
- Рухових +
- Когнітивних
- Мовних
- Ковтання

90. Пацієнт віком 48 років, який хворіє на бронхіальну астму, звернувся з приводу плану легеневої реабілітації. Які клінічні ознаки свідчатимуть про погіршення стану пацієнта?

- Інспіраторна задишка, клекочуче дихання

- Експіраторна задишка з подовженим видихом, вологі хрипи
- Експіраторна задишка з подовженим видихом, крепітація
- Інспіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи +
- Експіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи

91. Що оцінює ерготерапевт при оцінці глибокої чутливості?

- Больову чутливість
- —
- Термічну чутливість
- Кінестезію та статестезію +
- Тактильну чутливість

92. Яке порушення рухливості у кульшовому суглобі характеризується тим, що нога знаходиться в положенні згинання і розігнути повністю ногу хворий не може?

- Привідна контрактура
- Згинальна контрактура +
- Відвідна контрактура
- Розгинальна контрактура
- Комбінована контрактура

93. Які терапевтичні вправи повинні бути виключені у пацієнтів із хронічною гіпертензією?

- Вправи на подолання маси свого тіла, з невеликим обтяженням та опором
- Ритмічні вправи для великих м'язових груп, з поворотами голови
- Вправи з глибокими нахилами голови вниз, з тривалими статичними зусиллями +
- Вправи на розслаблення м'язових груп та координацію рухів
- Вправи зі зміною положення тіла в просторі, з переключенням з одного виду м'язової діяльності на інший

94. Який принцип модифікації житлового середовища для літніх людей передбачає формування житлового простору з урахуванням фізіології, психології та гігієни проживання?

- Компенсувального простору
- Комплексного впливу

- Ергономічності +
- Доступності
- Безпеки

95. У чоловіка під час дослідження встановлено відсутність усіх видів чутливості на правій половині тіла. Який вид порушення чутливості спостерігається у пацієнта?

- Парестезія
- Гіпестезія
- Анестезія +
- Каузалгія
- Гіперестезія

96. Укажіть метод фізичної терапії, який застосовується з метою усунення набряків та застійних явищ, спричинених порушеннями в кровоносній та лімфатичній системах.

- Гідрокінезотерапія
- УВЧ-терапія
- Плавання
- Кінезотейпування
- Масаж +

97. Пацієнт віком 69 років за 6 місяців після ендопротезування правого колінного суглоба перебуває на довготривалій реабілітації. Який тест доцільно застосувати фізичному терапевту для оцінки швидкості ходьби?

- Тест Філіпса
- Тест «Встань та йди»
- 6-хвилинний тест ходьби
- 10-метровий тест ходьби +
- Тест Ласега

98. Пацієнт скаржиться на експіраторну задишку, задуху. Чутно дистанційні хрипи. Він займає положення ортопное, лице одутловате, ціанотичне.

Допоміжна мускулатура грудної клітини приймає участь в диханні. Грудна клітка збільшена, в стані максимального вдиху, екскурсія її різко зменшена. При пальпації грудна клітка ригідна, голосове тремтіння ослаблене по всім полям. При порівняльній перкусії відчувається гучний коробковий перкуторний звук по всім полям, при топографічній — екскурсія нижнього краю легень різко обмежена. При аускультатії — ослаблене везикулярне

дихання з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи різної тональності (високі, низькі). Який наявний синдром ураження системи дихання?

- Синдром емфіземи
- Синдром гідротораксу
- Синдром бронхоспазму +
- Синдром пневмотораксу
- Синдром порожнини в легені

99. При ураженні якого нерва у пацієнта спостерігається крилоподібна лопатка?

- Лицевого
- Блукаючого
- Язико-глоткового
- Блокового
- Довгого грудного +

100. Який вид патологічного кінцевого відчуття спостерігається при обмеженні руху ліктьового суглоба внаслідок анталгічної контрактури?

- Кістка в кістку
- –
- Пружинний блок
- М'язовий спазм +
- Стискання м'яких тканин