

Варіант 2

1. Які завдання фізичної терапії будуть пріоритетними в перші три дні хребетно-спинномозкової травми?

- Сприяння процесам нейропластичності
- Профілактика ускладнень +
- Навчання навичок переміщення
- Відновлення втрачених функцій
- Навчання навичок самообслуговування

2. Визначте вид вправ, що пов'язані з виконанням різких вибухових рухів (після стрибка, підтягування або віджимання), під час виконання яких відбувається швидка зміна ексцентричного скорочення м'язів на концентричний.

- Ізокінетичні
- Комбіновані
- Пліометричні +
- Обтяжувальні
- Самоопірні

3. Що є протипоказанням до постурального дренажу?

- Емфізема легень
- Артеріальна гіпертензія
- Субфебрильна температура
- Наявність бронхоектазів
- Легенева кровотеча +

4. Пацієнту фізичний терапевт вимірює амплітуду рухів у променево-зап'ястковому суглобі. У якій площині відбувається долонне згинання і тильне розгинання цього суглоба?

- Фронтальній
- В.Горизонтальній
- Сагітальній +
- Поперечній
- Повздовжній

5. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на періодичну появу епізодів експіраторної задишки та кашлю вночі. Ці скарги посилюються під час цвітіння липи. В анамнезі алергічний риніт. Під час аускультатії легень виявлено жорстке дихання та сухі свистячі хрипи з подовженим видихом. Яку

пробу необхідно виконати для діагностики оборотності бронхіальної обструкції?

- 3 інгаляцією β_2 -адреностимулятора +
- 3 інгаляцією β -адреноблокатора
- 3 інгаляцією ГКС
- 3 інгаляцією кисню
- 3 інгаляцією муколітиків

6. Які м'язи спини потрібно зміцнювати при сутулості та збільшенні грудного кифозу?

- Довгі глибокі м'язи спини +
- Великий та малий ромбовидний м'яз
- Косий м'яз живота
- Нижній задній зубчастий м'яз
- Трапецієподібний м'яз

7. Під час дослідження чутливості пацієнт сидить із заплющеними очима. Руку пацієнта поперемінно згинають і розгинають у ліктьовому суглобі та просять відповісти на питання, у якому напрямку та обсязі відбуваються рухи в ліктьовому суглобі. Який вид чутливості оцінюють у цьому разі?

- Дискримінацію
- Пропріоцепцію
- Кінестезію +
- Графестезію
- Стереогнозію

8. Укажіть найефективніші заходи фізичної терапії які застосовують для полегшення болю в плечах у користувачів крісла колісного з ручним керуванням

- Електрична нервова стимуляція, вправи на розтягнення та з опором
- Терапевтичні вправи на розтягнення, позиціонування, електрична нервова стимуляція
- Імобілізація плечового суглоба, вправи на розтягнення, навчання правильній ергономії руху
- Навчання правильній ергономії руху, терапевтичні вправи на розтягнення та з опором +

- Акупунктура, навчання правильній ергономіці руху, терапевтичні вправи з опором

9. У пацієнта віком 34 роки під час заняття терапевтичними вправами спостерігається: прискорене дихання, невисока пітливість та незначне почервоніння шкіри. Чоловік не має ніяких скарг та безпомилково виконує вказівки. Вкажіть рівень втоми у пацієнта.

- Виражений
- Незначний +
- Різкий
- Втома відсутня
- Значний

10. Вкажіть при якій поставі відмічається надмірний нахил таза назад.

- Прямій поставі
- Лордозній +
- Сколіозній поставі
- Кіфозній поставі
- Нормальній поставі

11. До якого виду відноситься латеральне хапання?

- Силове хапання
- Долонні захоплення
- Двопальцеві хапання +
- Динамічні хапання
- Багатопальцеві захоплення

12. Яку здатність людини ерготерапевту дозволяє оцінити універсальний опитувальник «активності у повсякденному житті» (Activities of Daily Living-ADL)?

- Задоволеність від виконання певної діяльності
- Інструментальну активність повсякденного життя
- Заняттєву активність
- Діяльність з точки зору її важливості для клієнт/пацієнта
- До самостійного існування +

13. При проведенні ММТ м'язів що виконують приведення плеча, м'язом агоністом є:

- Підосний м'яз
- Малий грудний м'яз
- Дельтоподібний м'яз
- Надосний м'яз
- Великий грудний м'яз +

14. Як часто фізичний терапевт повинен перевіряти справність обладнання, що використовується під час занять із пацієнтами?

- На початку робочого дня
- У кінці робочого дня
- Згідно з рекомендаціями виробника обладнання
- Повсякчас, перед кожним використанням +
- Згідно з графіком перевірки обладнання

15. Що з нижченаведеного найточніше підходить до адаптивних технологій для ADL?

- Ортез відпочинку, кінезіотейп, підвищене сидіння для туалету, корсет для утримання пози
- Комунікаційні дошки, спеціальне програмне забезпечення, картки для альтернативної комунікації
- Ручка з піни для олівця/ручки, адаптивна дошка для нарізання, тримач для посуду
- Стілець для душу, насадки для столових приборів та зубної щітки, тарілка з бортиком, підвищене сидіння для туалету, стакан зі зрізаним краєм +
- Крісло колісне, милиці, тростини, функціональне ліжко

16. Який із нижченаведених тестів використовується для оцінювання ризиків падіння в осіб із захворюваннями чи травмами центральної нервової системи?

- Індекс Бартела
- Індекс Рівермід
- Проба Ромберга
- Шкала Берга +
- Шкала Борга

17. Під час бесіди з пацієнтом лікар з'ясував наявність у нього постійного протипоказання до призначення масажу. Наявність якого захворювання/стану було виявлено у пацієнта?

- Доброякісного м'язового новоутворення +
- Вираженого больового синдрому
- Стану вираженої перетони
- Гострого респіраторного захворювання
- Артеріальної гіпертензії I ступеня

18. Під час вибору допоміжних засобів пересування орієнтуються на величину кута в ліктьовому суглобі. Який кут згинання в ліктьовому суглобі рекомендований при виборі тростини (ходунків, милиць, паралельних брусів)?

- 15-20° +
- 10-15°
- 5-10°
- 25-30°
- 20-25°

19. Із якою метою проводиться профілактика респіраторних ускладнень в осіб із ураженням шийного відділу хребта в гострому періоді хребетно-спинномозкової травми?

- Попередження ателектазу
- Збільшення екскурсії грудної клітки
- Забезпечення вентиляції легень +
- Видалення мокротиння з трахіобронхіального дерева
- Збільшення екскурсії діафрагми

20. Для проведення реабілітації пацієнта після перенесеного інфаркту міокарда необхідно виконати оцінку толерантності до фізичного навантаження. Який діагностичний метод потрібно застосувати в цьому разі?

- Електрокардіографію
- Пульсоксиметрію
- Пікфлоуметрію
- Велоергометрію +
- Плавання

21. Пацієнт віком 45 років скаржиться на періодичний кашель із відходженням слизового мокротиння впродовж останніх 2-х років. Останні 3

місяці відзначає появу задишки під час підйому на 3-ій поверх. З анамнезу відомо, що пацієнт курить із п'ятнадцятирічного віку. Під час фізикального огляду виявлено збільшення передньо-заднього діаметра грудної клітки, виступання надключичних ямок і горизонтальне розташування ребер. Яка форма грудної клітки у пацієнта?

- Нормостенічна
- Рахітична
- Гіперстенічна
- Паралітична
- Емфізематозна +

22. Застосування яких вправ вимагає мінімальних навичок і виконання яких може бути легко модифіковано для різних груп пацієнтів, у тому числі для осіб старшого віку?

- Постуральних
- Аеробних +
- Силових
- Анаеробних
- Координаційних

23. Який м'яз потрібно розтягувати першочергово при обмеженій внутрішній ротації в плечовому суглобі?

- Підлопатковий
- Найширший спини
- Дельтоподібний
- Підостьовий +
- Великий грудний

24. У пацієнтки віком 72 роки діагностовано стан після перенесеного інфаркту головного мозку з бульбарним синдромом. Під час навчання користуванню столовим приладдям ерготерапевт помітив, що пацієнтка має проблеми з ковтанням і закашлюється під час прийому їжі. Що в цьому разі повинен зробити ерготерапевт?

- Попросити молодший медичний персонал годувати пацієнтку та спостерігати за ковтанням
- –
- Порекомендувати терміново провести обстеження ковтання +
- Порекомендувати їсти повільніше та ретельно пережовувати їжу

- Порекомендувати вживати їжу спеціальної консистенції

25. Під час стоматоскопічного та антропометричного огляду чоловіка було виявлено перевагу поздовжніх розмірів тіла над поперечними: довгі та тонкі кінцівки, довга та тонка шия, вузькі плечі, вузька та плоска грудна клітка, гострий епігастральний кут, крилоподібні лопатки, сутулість, тонка, суха і бліда шкіра, слабо розвинені м'язи та незначні жировідкладення. До якого типу тілобудови належить пацієнт (за Черноручьким)?

- Атонічного
- Гіперстенічного
- Нормостенічного
- Гіпостенічного
- Астенічного +

26. Пацієнт віком 52 роки з діагнозом: бронхіальна астма — перебуває на стаціонарному лікуванні в пульмонологічному відділенні. Лікар призначив йому звукову гімнастику під контролем фізичного терапевта. Що належить до «звукової гімнастики» пацієнтів із бронхіальною астмою?

- Вимовляння голосних та приголосних звуків
- Вимовляння дзижчачих, шиплячих та режучих звуків +
- Вимовляння різноманітних звуків
- Чітке вимовляння голосних звуків
- Чітке вимовляння приголосних звуків

27. Для здійснення процедур теплолікування — парафіно- та озокеритолікування необхідне окреме приміщення. Скільки у такому приміщенні має передбачатися площі на одну кушетку (м²)?

- 4
- 10
- 6 +
- 8
- 12

28. З метою виведення патологічного вмісту у пацієнта з ексудативним плевритом потрібно підібрати дихальні вправи. На що треба зробити акцент?

- Видих та стискання грудної клітки
- Видих та розтяг ураженої ділянки +
- Вдих та стискання грудної клітки
- Видих та стискання ураженої ділянки

- Вдих та розтяг ураженої ділянки
- 29.** Як характеризується обмежена рухливість суглобів?
- Можливість виконувати рухи з більшою амплітудою
 - Максимальна пасивна амплітуда рухів у суглобі навколо з однієї з осей обертання
 - Можливість виконувати рухи в неправильних площинах
 - Неможливість виконувати рухи в межах нормальної амплітуди +
 - Активний рух у суглобі з максимальною амплітудою
- 30.** Пацієнт віком 29 років скаржиться на асиметрію обличчя. За оцінкою неврологічного статусу встановлено: у чоловіка відсутні рухи мимічних м'язів зліва, слезотеча з лівого ока. Який нерв уражений?
- Трійчастий
 - Лицевий +
 - Відвідний
 - Окоруховий
 - Блоковий
- 31.** Пацієнтці віком 16 років після перенесеної гострої правосторонньої пневмонії для запобігання розвитку спайок призначено лікувальний масаж. Укажіть правильну послідовність прийомів проведення лікувального масажу при захворюваннях органів дихання.
- Розтирання, погладжування, розтирання, вібрація
 - Вібрація, розминання, погладжування, розтирання
 - Погладжування, розминання, розтирання, вібрація
 - Погладжування, розтирання, розминання, вібрація +
 - Погладжування, вібрація, розминання, розтирання
- 32.** Жінка віком 42 роки після підняття важкого предмета відчула різкий біль у попереково-крижовому відділі хребта з іррадіацією в сідницю та по передній поверхні стегна і внутрішній поверхні гомілки праворуч. Об'єктивно спостерігається: напружені м'язи поперекової ділянки, сколіоз, випрямлення поперекового лордозу, обмеження рухів у поперековому відділі хребта та болючість під час глибокої пальпації паравертебральних точок L4 – S1 праворуч. Симптом Ласега позитивний з правого боку. Ахіловий рефлекс праворуч не викликається. Гіпестезія по зовнішньому краю правої стопи. Який найімовірніший діагноз?

- Люмбаго
- Люмбоішіалгія
- Радикулопатія L5
- Радикулопатія S1+
- Люмбалгія

33. Під час участі в напівмарафоні в учасника відбулася раптова зупинка серця. Визначте частоту компресій грудної клітини дорослої людини під час проведення непрямого масажу серця при серцево-легеневій реанімації.

- 80-100 за хвилину
- 60-80 за хвилину
- 100-120 за хвилину +
- 30-50 за хвилину
- 150-180 за хвилину

34. Повна допомога під час прийому їжі надається особі зі спінальною травмою при ураженні спинного мозку на рівні:

- T1-T2
- C7-C8
- C6-C7
- C5-C6
- C1-C4 +

35. Вкажіть консервативний метод, який найчастіше застосовують для лікування болю в плечах у користувачів інвалідних візків з ручним керуванням.

- Імобілізація
- Акупунктура
- Ін'єкції кортикостероїдів
- Вправи на зміцнення та розтяжку +
- Електрична нервова стимуляція

36. Які індивідуальні соціальні чинники потрібно враховувати під час опитування пацієнта?

- Професія, матеріальне становище, сімейний стан, наявність домашніх тварин
- Соціальний статус, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип помешкання

- Професія, хобі, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип і поверх помешкання +
- –
- Професія, сімейний стан, хобі, хороші побутові умови

37. Виберіть орієнтири, що допомагають орієнтуватися людям із порушенням зору, а також попереджують падіння та травмування в медичних закладах.

- Широкі двірні отвори і коридори в медичному закладі
- Ручки важільного типу на дверях кабінетів
- Пониження стійки в реєстратурі
- Скляні двері при вході в медичний заклад
- Кольорове розмежування стін, підлоги, дверей, меблів +

38. Травматологічному пацієнту, який має зріст 170 см, після пластики передньої хрестоподібної зв'язки лівого колінного суглоба були призначені ліктьові милиці для пересування. Вкажіть правильні критерії підбору милиць для цього пацієнта.

- Лікоть зігнутий під кутом 10-15°, положення манжети — на відстані 10 см нижче від найгострішої точки ліктя
- Лікоть зігнутий під кутом 20-30°, положення манжети — на відстані 8 см нижче від найгострішої точки ліктя
- Лікоть зігнутий під кутом 40-50°, положення манжети — на відстані 11 см нижче від найгострішої точки ліктя
- Лікоть зігнутий під кутом 15-20°, положення манжети — на відстані 5 – 7 см нижче від найгострішої точки ліктя +
- Лікоть зігнутий під кутом 30-40°. положення манжети — на відстані 9 см нижче від найгострішої точки ліктя

39. З урахуванням яких факторів здійснюється підбір інвалідного візка?

- A.** Функціональної потреби пацієнта
- B.** Бажання пацієнта та його родичів
- C.** Ваги та зросту пацієнта
- D.** Функціональної можливості пацієнта
- E.** Функціональної можливості, зросту та ваги тіла, функціональної потреби та активності пацієнта +

40. Під час проведення аускультації над нижньою частиною легень не вислуховується дихання. Для якого захворювання це характерно?

- Сухого плевриту
- Екссудативного плевриту +
- Бронхоектатичної хвороби
- Муковісцидозу
- Пневмонії

41. У пацієнта в анамнезі гостре порушення мозкового кровообігу. Об'єктивно виявлено: правобічний геміпарез. На досягнення якої цілі у довготривалому реабілітаційному періоді буде спрямовувати програму фізичний терапевт?

- Вдосконалення навичок самообслуговування +
- Покращення самопочуття
- Профілактика виникнення контрактур
- Вдосконалення дихальних рухів
- Профілактика болю

42. Чим характеризується обмежена рухливість суглобів?

- Можливістю виконувати рухи з більшою амплітудою
- Неможливістю виконувати рухи в межах нормальної амплітуди +
- Максимально пасивною амплітудою рухів у суглобі навколо однієї з осей обертання
- Можливістю виконувати рухи в неправильних площинах
- Активним рухом у суглобі з максимальною амплітудою

43. Під час роботи з електроприладом у фізіотерапевтичному відділенні медичну сестру вразило електрострумом. Зі всім персоналом відділення для попередження подібного випадку проводиться інструктаж з охорони праці. Як називається цей інструктаж?

- Первинний
- Вступний
- Позаплановий +
- Повторний
- Цільовий

44. Пацієнту, який проходить реабілітацію після реконструкції ахіллового сухожилля, з метою зміцнення триголового м'яза литки фізичний терапевт

призначив вправу з використанням еластичної стрічки. Укажіть, чим характеризуються вправи у відкритому кінематичному ланцюзі.

- Великою стимуляцією нервово- м'язової координації
- Ізольованою роботою певних м'язових груп +
- Високою стабільністю
- Залученням декількох м'язових груп
- Відтворенням функціональних схем рухів

45. Піднімання на бордюр (до 10 см) за допомогою ходунків, відбувається:

- А Повернутися спиною, підняти сильнішу кінцівку на бордюр, перенести вагу тіла на ходунці, підняти слабку кінцівку
- Поставити ходунці. підняти слабку кінцівку на бордюр, перенести вагу тіла на ходунці, підняти сильнішу кінцівку
- Поставити ходунці. підняти сильнішу кінцівку на бордюр, перенести вагу тіла на ходунці, підняти слабку кінцівку +
- Повернутися спиною, підняти слабку кінцівку на бордюр, перенести вагу тіла на ходунці, підняти сильнішу кінцівку
- Здійснювати підйом без використання ходунків

46. Пацієнтка віком 32 роки має в анамнезі: рецидивно-ремітуючий розсіяний склероз. Під час обстеження виявлено: дискоординація рухів, порушення балансу та хитання при ходьбі. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- Астереогнозія
- Атаксія +
- Анозогнозія
- Апраксія
- Афазія

47. Чоловік віком 45 років скаржиться на задишку, що посилюється під час незначного фізичного навантаження та малопродуктивний кашель. В анамнезі: ХОЗЛ. Укажіть найбільш інформативний метод для визначення дихальної недостатності у пацієнта.

- Бронхоскопія
- Спірографія +
- Комп'ютерна томографія легень
- Бронхографія
- Рентгенографія органів грудної клітки

48. Жінка віком 35 років має синдром зап'ясткового каналу. Скаржиться на те, що не може друкувати більше 10 хв, перш ніж біль стане непереборним. Які заходи фізичної терапії та ерготерапії застосовуватимуться з метою зменшення больових відчуттів у перші 5 днів?

- Розтягування м'язів передпліччя почергово із ортезуванням
- Покращення нейро-м'язового контролю
- Ортезування почергово із вправами з полегшених вихідних положень +
- Покращення мобільності променево- зап'ясткового суглоба та ергономіка робочого місця
- Ортезування та зміцнення м'язів передпліччя

49. При ураженні якого нерву у пацієнта спостерігається, крилоподібна лопатка?

- Блукаючий
- Блоковий
- Лицевий
- Язико-глотковий
- Довгий грудний +

50. До ерготерапевта звернулась сім'я з трирічним хлопчиком, який хворіє на ДЦП (геміпарез 3 рівень за GMFCS). Скаржаться на відсутність у дитини навичку пиття з чашки (відсутність втягування рідини). Яка стратегія формування пиття буде найактуальнішою?

- Порекомендувати дитині відвідування логопеда та отримання логопедичного масажу
- Заміна рідини за смаком уподобання дитини та формування змикання губ на чашці
- Заміна чашки на пляшку через соломинку
- Терапевтичні вправи направлені на розвиток м'язів лица
- За допомогою спеціального стаканчику та тренування втягування за рахунок використання тягучої рідини +

51. Активацією яких рухів досягається компенсація моторних порушень у пацієнтів після перенесеного інсульту у тяжкій формі у разі наявності парезу верхньої кінцівки з вираженими порушеннями функції передпліччя, кисті та пальців?

- У ліктьовому суглобі
- —

- У променево-зап'ятковому суглобі
- У кисті
- У плечовому суглобі +

52. Переважне використання яких вправ/рухів передбачає методика проведення занять фізичною терапією, якщо вік пацієнта становить 4 роки?

- Рефлекторні вправи
- Ідеомоторні вправи
- Прикладні фізичні вправи
- Імітаційні рухи +
- Спортивні вправи

53. Які функції нижньої кінцівки будуть порушені при розриві двоголового м'яза стегна, що виник у результаті падіння з висоти?

- Розгинання стегна та згинання гомілки +
- Розгинання стегна та гомілки
- Супінація стопи
- Згинання стегна та гомілки
- Згинання та пронація гомілки

54. Під час дослідження чутливості пацієнт сидить із заплющеними очима. На внутрішній поверхні передпліччя пацієнта на відстані 4 см один від одного здійснюють тиск за допомогою циркуля Вебера та просять відповісти на питання, на якій відстані одна від одної знаходяться точки тиску. Який вид чутливості оцінюють у цьому разі?

- Кінестезію
- Пропріоцепцію
- Стереогнозію
- Дискримінацію +
- Тактильну

55. Який технічний засіб допомоги обов'язково застосовується для безпечного супроводження та страхування пацієнта під час ходьби?

- Пояс для ходи, підвісна система +
- Милиці, пояс для ходи
- Тростина, підвісна система
- Крісло колісне
- Ходунці, пояс для ходи

56. Які результати тестування скорочувальних структур характерні для тендиніту?

- Сильне та безболісне напруження
- Сильне (відносно) та болюче напруження +
- Слабке та болюче напруження
- –
- Слабке та безболісне напруження

57. Яке втручання з метою профілактики контрактур є найефективнішим для пацієнта з наслідками хребетно- спинномозкової травми (ASIA A)?

- Позиціонування та діяльність повсякденного життя +
- Позиціонування та вправи на збільшення м'язової сили
- Пасивні рухи та позиціонування
- Масаж та діяльність повсякденного життя
- Вправи на збільшення м'язової сили та розтяг

58. При проведенні аускультатії над нижньою частиною легень не вислуховується дихання. Для якого захворювання це характерно?

- Сухого плевриту
- Пневмонії
- Муковісцидозу
- Бронхоектатичної хвороби
- Ексудативного плевриту +

59. Яка мета використання допоміжних засобів в роботі з пацієнтами?

- Тренування сили нижніх кінцівок
- Забезпечити пацієнту більшу мобільність у ході відновлення його здатності пересуватись +
- Навчити його новим навичкам, які можуть знадобитись у житті
- Зменшення проявів слабкості м'язів
- Запобігання пасивно-активної роботи з пацієнтом

60. За допомогою якого приладу вимірюється сила м'язів?

- Міографа
- Міотонметра
- С Тензоплатформи
- Гоніометра
- Динамометра +

61. У чоловіка віком 65 років з діагнозом: артеріальна гіпертензія, виявлено акцент II тону на аорті. Який об'єктивний метод обстеження застосовував лікар для визначення цього симптому?

- Огляд
- Перкусія
- Пальпація
- Ультразвукове дослідження серця
- Аускультія +

62. Для проведення реабілітації пацієнта після перенесеного інфаркту міокарда необхідно виконати оцінку толерантності до фізичного навантаження. Який діагностичний метод потрібно застосувати у цьому разі?

- Пікфлоуметрію
- Електрокардіографію
- Велоергометрію +
- Плавання
- Пульсоксиметрію

63. При проведенні перкусії, як реабілітаційного обстеження, чути тупий чи притуплений (приглушений) легеневий звук. Які з цих факторів не вказують на нього?

- В якомусь відділі легеневої тканини утворилася друга, безповітряна тканина;
- Утворення в легенях патологічної порожнини, наповненої повітрям та оточеної фіброзним валиком +
- Плевральна порожнина, заповнена рідиною
- Плевральна порожнина, заповнена твердим середовищем
- Легеня стала менш повітряною

64. Пацієнтка віком 48 років, ГМПК за шкалою Chedoke-McMaster Stroke Assessment, показники парезу верхньої кінцівки нижче 4-ї стадії. На якій стратегії відновлення для такої пацієнтки краще сфокусуватися асистенту фізичного терапевта?

- Адаптації самообслуговування
- Профілактики та стимуляції

- Відновлення та стимуляції
- Повного відновлення функцій
- Підтримування та компенсації +

65. Як має рухатися фахівець страхуючи пацієнта під час спуску зі сходів?

- Стояти позаду пацієнта та переходити після того як пацієнт зробив крок
- Стояти на рівні з пацієнтом та рухатись одночасно з ним
- Стояти двома ногами на одній і тій самій сходинці при кожному кроці пацієнта
- Стояти нижче пацієнта та переходити на сходинку нижче, після того як пацієнт зробив крок +
- Переходити одночасно з пацієнтом

66. Як називається вільний у просторі рух, що виконується дистальним сегментом кінцівки?

- Функціональна вправа
- Поступальна вправа
- Вправа з відкритим кінематичним ланцюгом +
- Вправа з закритим кінематичним ланцюгом
- Зворотна вправа

67. Пацієнт скаржиться на локальний біль у нижньому полюсі надколінка. З чим пов'язаний такий вид колінного болю?

- Тендінопатією надколінка +
- Іліотібіальним синдромом
- Травмою передньої хрестоподібної зв'язки
- Пателофеморальним больовим синдромом
- Остеоартрозом

68. У пацієнта перелом середньої третини плечової кістки. Йому накладено гіпсову пов'язку і рекомендовано курс ЛФК. На які періоди поділяється курс ЛФК цього пацієнта, залежно від етапів і термінів його лікування?

- Імобілізації, постімобілізації, відновний +
- Догоспітальний, госпітальний, загальний
- Ліжковий, напівліжковий, вільний
- Щадний, функціональний, тренувальний
- Стаціонарний, амбулаторно-поліклінічний

69. Пацієнт віком 37 років із клінічним діагнозом: нестабільний не фіксований перелом хребта на рівні Th12 – L1, забій спинного мозку, нижня параплегія. Яка амплітуда згинання прямої ноги при виконанні пасивних вправ у нижніх кінцівках такого пацієнта?

- Не більше 60° +
- Не більше 70°
- Не більше 50°
- Не більше 80°
- Не більше 90°

70. Яке втручання з метою профілактики контрактур є найефективнішим для пацієнта з наслідками хребетно- спинномозкової травми (ASIA A)?

- Позиціонування та діяльність повсякденного життя +
- Позиціонування та вправи на збільшення м'язової сили
- Пасивні рухи та позиціонування
- Масаж та діяльність повсякденного життя
- Вправи на збільшення м'язової сили та розтяг

71. Для профілактики виникнення якого патологічного стану пацієнтам з інсультом проводять дихальні вправи, вібраційні рухи, дренажні положення, стискання, ротацію грудної клітки?

- Пролежнів
- Патологічних поз
- Контрактур
- Респіраторних ускладнень +
- Тромбозів

72. У пацієнта спостерігається розлад рухової функції верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для оцінки якого показника використовуються шкала Ашворта, шкала оцінки інвалідизації та шкала стійкості до пасивних рухів у цьому разі?

- Активності у повсякденному житті
- Сили м'язів
- Точності та координованості рухів
- Діапазону рухів
- Спастичності +

73. Фізичний терапевт оцінює амплітуду рухів суглобів верхньої кінцівки та силу м'язів у пацієнта. Вкажіть загальні протипоказання до цих процедур.

- Неконсолідовані переломи, стан перед оперативним втручанням, неврит +
- Інфекційний або запальний процес, розриви м'яких тканин, гіпермобільний суглоб
- Запальний процес, остеопороз, анкілоз
- нфекційний або запальний процес, гемofilія, гематома
- Неконсолідовані переломи, післяопераційний стан, осифікуючий міозит

74. Під час стоматоскопічного та антропометричного огляду чоловіка було виявлено перевагу поздовжніх розмірів тіла над поперечними: довгі та тонкі кінцівки, довга та тонка шия, вузькі плечі, вузька та плоска грудна клітина, гострий епігастральний кут, крилоподібні лопатки, сутулувата постава, тонка, суха і бліда шкіра, слабо розвинуті м'язи та незначні жировідкладення. До якого типу тілобудови відноситься пацієнт (за Черноруцьким)?

- Нормостенічного
- Атонічного
- Гіпостенічного
- Астенічного +
- Гіперстенічного

75. У жінки віком 48 років, яка перенесла інфаркт міокарда, виникають больові відчуття під час підйому по сходах більше ніж на 1 поверх, спостерігається емоційне напруження. До якого функціонального класу стабільної стенокардії напруження відноситься ця пацієнтка?

- V
- IV
- II +
- I
- III

76. Яка проба проводиться для встановлення рухливості грудного відділу хребта?

- Адамса

- Седіна
- Ласега
- Томайєра
- Отта +

77. Що є необхідним для забезпечення безпеки та гігієни тіла пацієнта і фізичного терапевта під час мануальних маніпуляцій на відкритих поверхнях тіла пацієнта?

- Мити руки до і після роботи з пацієнтом +
- Мити руки після роботи з пацієнтом
- Використовувати хірургічні рукавиці
- Використовувати оглядові рукавиці
- Мити руки до роботи з пацієнтом

78. Яку шкалу використовують в ерготерапії для стандартизованої оцінки рівня розвитку великих моторних функцій у дітей з церебральним паралічем?

- CFCS
- MACS
- GMFCS +
- FMS
- FIM

79. Яке значення в контексті ерготерапії має глибоке переживання значення життя через участь у заняттях, що передбачають реалізацію особистих ідеологій, прагнення знайти відповіді на важливі питання про сенс життя?

- Духовності +
- Цінності особи
- Сім'ї, релігії
- Переліку особистісних переконань
- Інтересів та захоплення особи

80. Під час обстеження підлітка реабілітолог виявив асиметрію хребта: лінія плечей і нижній кут лопатки знижені в лівий бік, лопатка наближається до хребта. Яка патологія у пацієнта?

- Плоска спина
- Сколіотична постава +
- Лордоз
- Кіфоз
- Кругла спина

81. Укажіть перший етап прогресування терапевтичних вправ у закритому кінематичному ланцюгу за параметром маси тіла.

- Використання паралельних брусів
- Вправи у воді +
- Вправи з піднятими над головою руками
- Відтискання з руками на підвищенні
- Відтискання від стіни

82. Якому виду терапевтичних вправ на розтягування потрібно надати перевагу, якщо пацієнт не може виконати активний рух через відсутність нервово-м'язового контролю м'язів згиначів стегна?

- Пасивно статичним +
- Активно-пасивно статичним
- Активно статичним
- Балістичним
- Вибірково статичним

83. Для пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) характерною ознакою є щоденна задишка. Який засіб реабілітації є найефективнішим для зменшення проявів задишки в пацієнтів із ХОЗЛ?

- Вправи на баланс
- Функціональне тренування м'язів черевної стінки та грудної клітки +
- Фізіотерапія грудної клітки
- Вправи на розтягнення
- Силові тренування для великих груп м'язів

84. Виберіть чутливу ділянку на яку потрібно звернути увагу при огляді транстібіальної кукси після зняття протезу.

- Медіальна область великогомілкової кістки
- Супрапателлярна область
- Гребінь великогомілкової кістки +
- Латеральна область малогомілкової кістки
- Надвиросткова область

85. При проведенні тесту 6-ти хвилинної ходьби, на 2-й хвилині тестування, пацієнт різко зблід. Що потрібно зробити у цьому разі?

- –
- Підбадьорити пацієнта, щоб він пройшов весь тест
- Запропонувати зробити пацієнтові відпочинок та продовжити тест

- Порадити пацієнтові знизити швидкість ходьби
- Зупинити тестування +

86. У чоловіка раптово виникли сильний біль у лівій половині грудної клітки, кашель, рясне кровохаркання, температура тіла підвищилася до 38,2°C. Під час обстеження встановлено, що ліва половина грудної клітки дещо відстає в акті дихання. Під час аускультатії прослуховується крепітація і шум тертя плеври. Установіть попередній діагноз.

- Бронхіальна астма
- Хронічний бронхіт
- Гострий бронхіт
- Емфізема
- Пневмонія +

87. Пацієнт віком 63 роки з лівостороннім геміпарезом знаходиться в палаті інтенсивної терапії з приводу гострого порушення мозкового кровообігу. У яких випадках потрібно позиціонувати пацієнта в положенні лежачи на спині?

- Для проведення медичних маніпуляцій +
- Для зручності соціальних контактів
- Для зниження негативного впливу шийних тонічних рефлексів
- Для зниження ризику аспірації
- Для зменшення труднощів із ковтанням

88. Під час оцінки постави пацієнта віком 18 років було виявлено викривлення хребта у фронтальній площині. Який тест доцільно провести у цьому разі для деталізації діагнозу?

- Патріка
- Філіпса
- Ласега
- Ловетта
- Адамса +

89. Яке положення є оптимальним для хворого, який дихає спонтанно, з двостороннім ураженням легені та серцевою недостатністю 2 ступеня?

- Лежачи на спині
- Лежачи з припіднятим ніжним кінцем ліжка
- Напівсидячи (напівлежачи) +
- Лежачи на правому боці

- Лежачи на лівому боці

90. Вкажіть неправильний підхід у роботі з пацієнтом з ЧМТ (черепно-мозковою травмою) IV рівня за шкалою Ранчо Лос Амігос.

- Використання спокійного та розміреного темпу виконання повсякденних занять
- Встановлення передбачуваного графіку та розпорядку дня для повернення додому
- Навчання пацієнта працювати у тихому середовищі з мінімальними відволікаючими факторами
- Використання підказок
- Незважаючи на збудження клієнта тренувати толерантності до відволікаючих факторів під час виконання завдання+

91. Яку з вищих мозкових функцій можна оцінити, якщо запропонувати пацієнту назвати поточну дату?

- Орієнтацію +
- Абстракцію
- Увагу
- Мову
- Пам'ять

92. Жінці віком 75 років після перелому великої гомілкової кістки лівої ноги накладено гіпсову пов'язку для іммобілізації та зростання. Після 5-ти тижнів гомілка лівої ноги значно зменшилася у об'ємі. Визначте вид атрофії, що виникла у пацієнтки.

- Дистрофія
- Нейрогенна атрофія
- Атрофія від тривалого здавлювання
- Дегенерація
- Атрофія внаслідок бездіяльності +

93. За якою шкалою оцінюють суб'єктивне сприйняття пацієнтом фізичного навантаження?

- Берга
- Борга +
- Брадена
- Бека

- Брока

94. Під час дослідження моделі ходи в пацієнта спостерігається втрата природного замаху руки та перетягування ураженої ноги півколом. Який це тип аномальної ходи?

- Геміплегічний +
- Невропатичний
- Паркінсонічний
- Міопатичний
- Атактичний

95. Пацієнту встановлено діагноз: стан після перенесеного інфаркту головного мозку, помірний лівобічний геміпарез. Заплановані ерготерапевтичні втручання для пацієнта включають зорове сканування та сенсорну стимуляцію кінцівок з лівого боку тіла. Про наявність якого синдрому свідчать заплановані втручання?

- Апраксії
- Неглекту +
- Геміанопсії
- Диплопії
- Анестезії

96. Пацієнт віком 56 років у стані спокою мав ЧСС – 80/хв та АТ – 120/80 мм рт. ст. Відразу після виконання стандартного навантаження «20 присідань за 30 секунд» спостерігається: ЧСС — 165/хв, АТ — 175/0 мм рт. ст. Яким є тип реакції серцево-судинної системи на навантаження у цього пацієнта?

- Дистонічний +
- Нормотонічний
- Гіпотонічний
- Гіпертонічний
- Східчастий

97. Як називається захисний рефлекс розтягування, що запобігає перерозтягуванню м'язів?

- Аутогенне гальмування
- Тонічний рефлекс
- Сегментарний рефлекс
- Міотатичний рефлекс +

- Сухожильний рефлекс

98. Жінці віком 27 років після перенесеної гострої пневмонії призначено курс масажу грудної клітки. Вкажіть правильну послідовність прийомів лікувального дренажного масажу.

- Погладження, вібрація, розминання, розтирання
- Вібрація, розминання, погладження, розтирання
- Погладження, розминання, розтирання, вібрація
- Розтирання, погладження, вібрація, розминання
- Погладження, розтирання, розминання, вібрація +

99. Займаючись з пацієнтом дихальними вправами, яке із зазначених нижче положень не потрібно займати безпосередньо біля пацієнта?

- Ззаду і збоку
- Спереду і збоку
- Спереду +
- Ззаду
- Збоку

100. У пацієнта віком 46 років діагностовано гіпертермічний синдром через недотримання техніки безпеки на виробництві. Яка ланка патогенезу гіпертермії є підґрунтям для використання фізіотерапевтичного методу охолодження?

- Активація скоротливого термогенезу
- Розширення периферичних судин +
- Звуження периферичних судин
- Перебудова центру терморегуляції
- Активація нескоротливого термогенезу

