

1. Які заходи фізичної терапії доцільно використати з метою відновлення стереогнозу?

- a. Впізнання предмета шляхом його обмацування із заплющеними очима +
- b. Відчуття пасивних рухів у пальцях верхніх і нижніх кінцівок
- c. Визначення із заплющеними очима цифри, що накреслена на шкірі
- d. Визначення здатності сприймати відокремлено два подразники одночасно
- e. Визначення напрямку руху шкірної складки

Під час огляду грудної клітини пацієнта асистент фізичного терапевта встановив, що ребра розташовані майже горизонтально, міжреберні проміжки широкі, передньо-задній та поперечний розміри практично однакові, нижня апертура грудної клітки широка, епігастральний кут тупий. Обидві половини грудної клітки симетрично беруть участь у диханні. Для якої форми грудної клітки характерні виявлені ознаки?

Question 2 Answer

- a. Циліндричної
- b. Плоскої
- c. Астенічної
- d. Конічної +
- e. Діжкоподібної

Яку шкалу використовують в ерготерапії для стандартизованої оцінки рівня розвитку великих моторних функцій у дітей із церебральним паралічем?

Question 3 Answer

- a. FIM
- b. GMFCS +
- c. MACS
- d. CFCS
- e. FMS

Постінсультному пацієнту віком 60 років діагностовано: спастичний геміпарез, спастичність м'язів-згиначів верхньої кінцівки становить 3-4 бали за шкалою Ашфорта, больовий синдром. Яке втручання ерготерапії є оптимальним для пацієнта з урахуванням ступеня спастичності?

Question 4 Answer

- a. Тривале статичне розтягнення м'язів
- b. Теплові процедури
- c. Ботулінотерапія +
- d. Вібраційний масаж
- e. Ортезування

У пацієнта віком 48 років - лівобічний гонартроз 2 ступеня, пошкодження медіального меніска лівого колінного суглоба. Виражений больовий синдром. Який метод обстеження дозволить визначити обсяг активних рухів у пошкодженному суглобі?

Question 5 Answer

- a. Комп'ютерна томографія
- b. Пальпація
- c. Гоніометрія +
- d. Рентгенографія

е. Мануально-м'язове тестування

Пацієнтка віком 61 рік скаржиться фізичному терапевту на задишку під час ходьби, що змушує її зупинятися для відновлення дихання, після проходження дистанції до 100 м. Із анамнезу відомо, що 8 тижнів тому вона була виписана з кардіологічного стаціонару, де перебувала через інфаркт міокарда. Фізичний терапевт для оцінювання використав Шкалу вираженості задишки (modified Medical Research Council (mMRC), рекомендовану МОЗ України. Яким є рівень задишки в цієї пацієнтки?

Question 6Answer

- a. 2
- b. 3 +
- c. 4
- d. 1
- e. 0

Укажіть метод фізичної терапії, який доцільно застосовувати при пневмонії з метою збільшення надходження антибіотиків до легеневої тканини.

Question 7Answer

- a. Точковий масаж
- b. Спелеотерапія
- c. Інгаляції з морською сіллю
- d. Бальнеотерапія
- e. Дихальні вправи +

Укажіть, у якому випадку проводиться протинабрякова терапія та терапія, спрямована на покращення трофіки тканин, особливо м'язів, збереження амплітуди рухів у проксимальному суглобі, зняття больового синдрому, наявності трофічних розладів, тренування на опірність тканин, профілактика контрактур.

Question 8Answer

- a. Закритої травми периферійних нервів
- b. Несформованої кукси +
- c. Сформованої кукси
- d. Фантомної кінцівки
- e. Фантомного болю

До фізичного терапевта звернулася пацієнтка віком 61 рік за повторною консультацією. Вона 2 тижні виконувала призначену програму кардіореабілітації за післягострим періодом після інфаркту міокарда. Пацієнтка зазначила, що стала почувати себе краще, може проходити більшу дистанцію та виконувати значний обсяг побутових навантажень без задишки. Яку динаміку функціонального показника роботи серця, найімовірніше, буде встановлено під час обстеження у цьому разі?

Question 9Answer

- a. Збільшення активності синусового вузла правого передсердя
- b. Збільшення фракції викиду лівого шлуночка +
- c. Збільшення частоти серцевих скорочень у спокої
- d. Зменшення максимального споживання кисню
- e. Збільшення кінцево-діастолічного об'єму лівого шлуночка

Пацієнта віком 56 років шпиталізовано зі скаргами на інтенсивний пекучий біль за грудниною, який іррадіює в ліву руку, лопатку, нижню щелепу, триває більше години та не знімається нітроглицерином. Встановлено діагноз: інфаркт міокарда. Якою буде основна мета першого (стаціонарного) етапу реабілітації для цього пацієнта?

Question 10 Answer

- a. Підготовка пацієнта до повернення до професійної діяльності, зниження факторів ризику
- b. Протидія негативним впливам тривалого ліжкового режиму та підготовка пацієнта до повернення до нормальної повсякденної діяльності +
- c. Покращення функціонального стану серцево-судинної системи, формування адекватного колатерального кровообігу в міокарді
- d. Поступове підвищення рівня функціональної здатності, зниження факторів ризику серцево-судинних захворювань
- e. Забезпечення психологічної підтримки пацієнта, повернення до професійної діяльності

Фізичний терапевт проводить мануальне м'язове тестування привідних м'язів стегна. Який принцип є основним правилом тестування та оцінювання м'язової сили?

Question 11 Answer

- a. Напруження та розслаблення
- b. -
- c. Розслаблення та подолання
- d. Розслаблення та напруження
- e. Напруження та подолання +

Військовослужбовець віком 30 років отримав вогнепальне поранення нижньої кінцівки, що призвело до порушення ходьби та необхідності використання допоміжних засобів. Під час реабілітації фізичний терапевт проводить оцінку стану пацієнта. Він урахує не тільки обсяг рухів у суглобах та м'язову силу, а й емоційний стан пацієнта, рівень соціальної підтримки, архітектурну доступність житла та доступність транспорту для відвідування реабілітаційного центру. Який принцип використовує терапевт у цій ситуації відповідно до МКФ?

Question 12 Answer

- a. Соціальну модель
- b. Медичну модель
- c. Лише психологічну модель
- d. Біопсихосоціальний підхід +
- e. Діагностичний підхід

Пацієнту віком 27 років, який хворіє на бронхіальну астму, сімейний лікар призначив 20 профілактичних сеансів переривчастої гіпоксичної терапії на стадії ремісії захворювання. Який очікуваний ефект дозованих інтервальних гіпоксичних тренувань сприятиме попередженню виникнення наступного загострення хвороби?

Question 13 Answer

- a. Зниження тонуусу гладеньких м'язів мікросудин
- b. Підвищення тонуусу гладеньких м'язів мікросудин
- c. Зниження тонуусу гладеньких м'язів бронхіол +
- d. Підвищення ефективності мукоциліарного кліренсу
- e. Підвищення тонуусу гладеньких м'язів бронхіол

Які дії має виконувати фізичний терапевт для підвищення ефективності дренажної позиції в разі накопичення мокротиння і гною в бронхах у пацієнта?

Question 14Answer

- a. Під час видиху натискати на відповідну ділянку грудної клітки, виконуючи вібраційний масаж *
- b. Під час затримки дихання виконувати легке постукування на відповідній ділянці грудної клітки
- c. Під час затримки дихання виконувати вібраційний масаж
- d. Під час затримки дихання натискати на відповідну ділянку грудної клітки
- e. Під час вдиху натискати на відповідну ділянку грудної клітки, виконуючи вібраційний масаж

У пацієнтки віком 67 років гостре порушення мозкового кровообігу, виражений геміпарез. В анамнезі: цукровий діабет, нестабільна гемодинаміка, високий ризик утворення пролежнів. Який проміжок часу є оптимальним для зміни положення тіла пацієнтки для профілактики пролежнів?

Question 15Answer

- a. Кожні 2 години +
- b. 2 рази на добу
- c. Кожні 4 години
- d. Кожні 6 годин
- e. 1 раз на добу

Під час обстеження пацієнта з наслідками ЧМТ за тестом "Встань та йди" було отримано результат - 15 с. Яка здатність до переміщення у цього пацієнта?

Question 16Answer

- a. Обмежена здатність до переміщення
- b. Переважно обмежена здатність до переміщення
- c. Порушена здатність до переміщення
- d. Переважно незалежна здатність до переміщення +
- e. Вільна здатність до переміщен

У чоловіка раптово виникли сильний біль у лівій половині грудної клітки, кашель, рясне кровохаркання, температура тіла підвищилася до $38,2^{\circ}\text{C}$. Під час обстеження встановлено, що ліва половина грудної клітки дещо відстає в акті дихання. Під час аускультатії прослуховується крепітація і шум тертя плеври. Установіть попередній діагноз.

Question 17Answer

- a. Гострий бронхіт
- b. Пневмонія +
- c. Хронічний бронхіт
- d. Бронхіальна астма
- e. Емфізема

Пацієнт через місяць після черепно-мозкової травми демонструє ознаки 4 рівня когнітивного функціонування Ранчо. Яке втручання буде оптимальним для цього пацієнта?

Question 18Answer

- a. Заняття з гучним звуковим супроводженням тривалістю 30 хв
- b. Заняття тривалістю 40 хв з виконанням простих команд
- c. Заняття тривалістю до 20 хв у спокійному оточенні з виконанням простих команд +
- d. -
- e. Заняття тривалістю 20 хв з виконанням подвійних завдань

Пацієнту віком 45 років встановлено діагноз: негоспітальна лівобічна нижньодольова пневмонія. Укажіть дренажне положення, яке буде сприяти відходженню мокротиння.

Question 19Answer

- a. Зміна положення тіла не вплине на відходження мокротиння
- b. На правому боці з піднятим головним кінцем
- c. На лівому боці з піднятим головним кінцем
- d. На лівому боці з опущеним головним кінцем
- e. На правому боці з опущеним головним кінцем +

Пацієнтка віком 35 років перебуває в терапевтичному відділенні з приводу пневмонії. Загальний стан задовільний, єдине, що турбує жінку, це погане відходження мокротиння під час кашлю, що створює для неї дискомфорт. Який елемент масажу необхідно застосувати, щоб полегшити відходження мокротиння?

Question 20Answer

- a. Розтирання
- b. Вібрацію +
- c. Розминання
- d. Погладжування
- e. Вижимання

Пацієнт віком 62 роки перебуває на підгострому періоді реабілітації після перенесеного інсульту в басейні середньої мозкової артерії. Яка шкала є оптимальною для визначення можливості здійснення самостійної діяльності пацієнта та формування цілей ФТ?

Question 21Answer

- a. Ренкіна
- b. Освестрі
- c. Функціональної незалежності (FIM)+
- d. Візуальна аналогова шкала (VAS)
- e. Хокінса

У пацієнта перелом середньої третини плечової кістки. Йому накладено гіпсову пов'язку й рекомендовано курс ЛФК. На які періоди поділяється курс ЛФК цього пацієнта, залежно від етапів і термінів його лікування?

Question 22Answer

- a. Імобілізація, постімобілізація, відновний +
- b. Догоспітальний, госпітальний, загальний
- c. Щадний, функціональний, тренувальний
- d. Стаціонарний, амбулаторно-поліклінічний
- e. Ліжковий, напівліжковий, вільний

Як правильно зробити вимір сили кисті методом динамометрії?

Question 23Answer

- a. У відведеній убік зігнутій у лікті руці, тричі
- b. В опущеній вниз руці, одноразово
- c. У відведеній убік прямій руці, одноразово
- d. У відведеній убік прямій руці, тричі +
- e. У піднятій руці, різко

Військовослужбовець віком 42 роки переніс вогнепальне поранення нижньої кінцівки, що спричинило обмеження в пересуванні. Після виписки з лікарні він мав розпочати курс фізичної терапії, але зіткнувся з труднощами. Реабілітаційний центр розташований за 10 км від його місця проживання, а чоловік не має власного транспорту. Громадський транспорт у його районі відсутній, а таксі коштує дорого. Водночас він мотивований до реабілітації та має високий рівень фізичної витривалості. Який із нижченаведених аспектів є "фактором середовища" (е) за МКФ, що впливає на реабілітацію пацієнта?

Question 24Answer

- a. Обмеження рухів у суглобі
- b. Його фізична витривалість
- c. Больовий синдром у нозі
- d. Рівень мотивації до реабілітації
- e. Відсутність доступного громадського транспорту +

Пацієнт віком 64 роки після ендопротезування кульшового суглоба тренує навички ходьби сходами. Де повинен перебувати фізичний терапевт під час страхування пацієнта?

Question 25Answer

- a. Позаду від пацієнта, притримуючи пояс для страхування двома руками
- b. -
- c. Позаду і збоку від пацієнта, притримуючи пояс для страхування однією рукою, а іншою - руку пацієнта
- d. Дещо позаду і збоку від пацієнта, притримуючи пояс для страхування однією рукою, а іншою - надпліччя пацієнта +
- e. Дещо позаду і збоку від пацієнта, притримуючи пояс для страхування двома руками

Постізометричну релаксацію використовують для ліквідації міогенних контрактур. Після закінчення ізометричного напруження м'язів пацієнта фізичний терапевт легко й повільно виконує пасивне розтягування м'язів. Упродовж скількох секунд він це робить?

Question 26Answer

- a. 21-25
- b. 6-10 +
- c. 10-15
- d. До 5
- e. 16-20

Які дії виконує фізичний терапевт при маніпуляційному втручанні "мануальна вібрація"?

Question 27Answer

- a. Вібрацію високої частоти на стінку грудної клітки під час вдиху пацієнта
- b. Вібрацію високої частоти на стінку грудної клітки під час видиху пацієнта +
- c. Вібрацію середньої частоти на грудну клітку під час видиху пацієнта

- d. Вібрацію низької частоти на грудну клітку під час вдиху пацієнта
- e. Вібрацію низької частоти на стінку грудної клітки під час видиху пацієнта

Яке положення потрібно надати суглобу під час оцінки пасивних додаткових рухів?

Question 28 Answer

- a. Нещільно укладене +
- b. Вимушене
- c. Щільно укладене
- d. Анатомічне
- e. Індивідуальне

Після перенесеної травми пацієнт не може зігнути праве плече в плечовому суглобі та привести його до тулуба. Який м'яз було травмовано?

Question 29 Answer

- a. Малий круглий
- b. Дзубо-плечовий +
- c. Великий круглий
- d. Підлопатковий
- e. Плечовий

У постінсультного пацієнта з геміпарезом за результатами мануально-м'язового тестування сила двоголового м'яза стегна становить 1 бал. Якому кваліфікатору МКФ для функцій організму відповідає зазначений показник сили м'язів?

Question 30 Answer

- a. 1
- b. 2
- c. 0
- d. 3 +
- e. 4

Пацієнт віком 37 років із клінічним діагнозом: нестабільний нефіксований перелом хребта на рівні Th12-L1, забій спинного мозку, нижня параплегія. Яка амплітуда згинання прямої ноги при виконанні пасивних вправ у нижніх кінцівках такого пацієнта?

Question 31 Answer

- a. Не більше 90°
- b. Не більше 50°
- c. Не більше 80°
- d. Не більше 70°
- e. Не більше 60° +

Під час оцінювання рівня спастичності двоголового м'яза плеча за шкалою Ашфорта фізичний терапевт відчуває опір м'яза протягом усього руху, але пасивний рух виконано в повній амплітуді. Якою кількістю балів за шкалою Ашфорта можна оцінити спастичність м'яза в цьому разі?

Question 32 Answer

- a. 1
- b. 2 +

- c. 0
- d. 4
- e. 3

З якого положення треба починати вертикалізацію пацієнта, який тривалий час перебував у ліжку після гострого порушення мозкового кровообігу?

Question 33Answer

- a. Латерального або бокового положення лежачи
- b. Положення стоячи
- c. Дорсально лежачи
- d. Положення Фаулера +
- e. Положення лежачи на животі

Після поранення в ділянці пахвової ямки пацієнт відчуває труднощі з розгинанням і приведенням плеча до тулуба, а також обертанням його досередини. Який м'яз ушкоджено в пацієнта?

Question 34Answer

- a. Великий круглий +
- b. Надостьовий
- c. Дельтоподібний
- d. Двоголовий м'яз плеча
- e. Триголовий м'яз плеча

Чому на початку реабілітації травм плечового суглоба надається перевага вправам у закритому кінематичному ланцюзі?

Question 35Answer

- a. Менша стимуляція пропріоцептивної чутливості
- b. Менша швидкість руху, але більша стабільність +
- c. Залучення в роботу м'язів-антагоністів та синергістів
- d. Відтворення певних схем рухів
- e. Ізольована робота певних м'язових груп

Укажіть особливості позиціонування пацієнтів, які перенесли ендопротезування кульшового суглоба, у перші дні.

Question 36Answer

- a. У положенні лежачи на спині, оперована нога в положенні відведення +
- b. У зручному положенні, немає значення, на якому боці
- c. У положенні на неоперовану сторону тіла, між колінами розміщений валик
- d. Таких рекомендацій немає
- e. У положенні на оперованому боці, щоб суглоб набув правильної позиції

Під час проведення проби з фізичним навантаженням реакція серцево-судинної системи характеризувалася підвищенням систолічного артеріального тиску більше ніж на 70 мм рт. ст., а показник діастолічного становив більше 95 мм рт. ст. Який із нижченаведених типів реакцій спостерігається в пацієнта?

Question 37Answer

- a. Астенічний
- b. Дистонічний
- c. Гіпертонічний +

- d. Гіпотонічний
- e. Нормотонічний

Новонародженій дитині виконується погладжування щоки праворуч. Оберіть рефлекторну відповідь, яка буде вказувати на зрілий пошуковий рефлекс.

Question 38Answer

- a. Поворот голови праворуч та закривання рота
- b. Поворот голови праворуч та відкривання рота +
- c. Поворот голови ліворуч та закривання рота
- d. Поворот голови ліворуч та відкривання рота
- e. —

Що є протипоказанням до постурального дренажу?

Question 39Answer

- a. Субфебрильна температура
- b. Артеріальна гіпертензія
- c. Емфізема легень
- d. Наявність бронхоектазів
- e. Легенева кровотеча +

Для проведення реабілітації пацієнта після перенесеного інфаркту міокарда необхідно оцінити толерантність до фізичного навантаження. Який діагностичний метод потрібно застосувати в цьому разі?

Question 40Answer

- a. Пікфлоуметрію
- b. Велоергометрію +
- c. Плавання
- d. Електрокардіографію
- e. Пульсоксиметрію

Під час огляду пацієнта з бронхіальною астмою фізичний терапевт встановив, що передньо-задній розмір грудної клітки збільшений переважно у верхній частині, ребра мають горизонтальне положення, міжреберні проміжки розширені, над- та підключичні ямки згладжені. Для якої форми грудної клітки характерні виявлені ознаки?

Question 41Answer

- a. Конічної
- b. Обструктивної
- c. Астматичної
- d. Циліндричної
- e. Емфізематозної +

Пацієнт з тяжкою травмою головного мозку в післягострому періоді реабілітації самостійно не переміщується, є ризик аспірації. Який з варіантів позиціонування після приймання їжі доцільно обрати в цьому разі?

Question 42Answer

- a. -
- b. Латеральне або бокове положення лежачи
- c. Лежачи на спині
- d. Напівлежачи на спині з піднятим узголів'ям ліжка принаймні на 30-45° +

е. Напівлежачи на животі

Фізичний терапевт працює у клініці з високим навантаженням. Через нестачу персоналу він змушений часто залишатися після зміни, пропускати перерви та відчуває емоційне виснаження. Останнім часом у нього знизилася концентрація, з'явилися проблеми зі сном і дратівливість. Який підхід найбільш ефективно сприятиме його психологічній безпеці?

Question 43Answer

- a. Формування стійкості до стресу шляхом прийняття високого темпу роботи як неминучого професійного виклику без надмірного фокусування на власному самопочутті
- b. Використання стратегій емоційного дистанціювання у взаємодії з пацієнтами та колегами для зниження психологічного навантаження
- c. Оптимізація робочого графіка з поступовим упровадженням чітких меж між роботою та відпочинком, включаючи раціональне планування перерв +
- d. Посилена концентрація на виконанні професійних обов'язків із максимальним залученням у робочий процес, що сприятиме підтримці дисципліни та ефективності
- e. —

Під час вибору допоміжних засобів пересування орієнтуються на величину кута в ліктьовому суглобі. Який кут згинання в ліктьовому суглобі рекомендований при виборі тростини (ходунків, милиць, паралельних брусів)?

Question 44Answer

- a. 20-25°
- b. 15-20°
- c. 10-15°
- d. 25-30°
- e. 5-10°

Пацієнт віком 56 років проходить ранній етап реабілітації після тотального ендопротезування кульшового суглоба. Яку модель ходьби необхідно застосовувати в цьому разі?

Question 45Answer

- a. Чотириточкову з милицями
- b. З ходунками
- c. Двоточкову з милицями
- d. Триточкову з милицями +
- e. З шестипроменевими палками

Яка мета використання допоміжних засобів у роботі з пацієнтами?

Question 46Answer

- a. Забезпечити пацієнту більшу мобільність під час відновлення його здатності пересуватися +
- b. Навчити його нових навичок, які можуть знадобитися в житті
- c. Зменшення проявів слабкості м'язів
- d. Запобігання пасивно-активній роботі з пацієнтом
- e. Тренування сили нижніх кінцівок

Пацієнт за призначенням фізичного терапевта виконує вправу "планка". Укажіть характерну особливість статичної роботи м'язів у цьому разі.

Question 47Answer

- a. Наявне переміщення
- b. Значне напруження +
- c. Незначне напруження
- d. Значне скорочення м'яза
- e. Відносно пізніє настання втоми

Укажіть допоміжний засіб, який у разі неправильного використання може викликати компресійну нейропатію у зв'язку з паховою, передплечовою або зап'ястною компресією серединного нерва.

Question 48Answer

- a. Ходунки
- b. Милиці +
- c. Тростини
- d. Крісло колісне
- e. Реабілітаційні бруси

У пацієнтки віком 56 років, яка хворіє на бронхіальну астму, об'єктивно спостерігається: обличчя ціанотичне, шийні вени набухлі, кашляє, під час дихання чути свистячі хрипи, жінка налякана. Яке положення необхідно надати пацієнтці для полегшення стану?

Question 49Answer

- a. Лежачи на животі
- b. Ортопное +
- c. Лежачи з піднятим головним кінцем
- d. Стоячи
- e. Лежачи з піднятими ногами

Виконуючи з пацієнтом вправи для розтягування м'язів кульшового суглоба, фізичний терапевт звернув увагу на патологічні зміни, які є протипоказанням до виконання таких вправ. Укажіть це протипоказання.

Question 50Answer

- a. Патологічно стягувальні рубці
- b. Укорочення сухожилків
- c. Порушення постави
- d. Обмежений діапазон рухів
- e. Гіпермобільність суглоба +

Які клінічні ознаки свідчатимуть про погіршення стану пацієнта, що хворіє на бронхіальну астму?

Question 51Answer

- a. Експіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи +
- b. Інспіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи
- c. Експіраторна задишка з подовженим видихом, крепітація
- d. Інспіраторна задишка, клекочуче дихання
- e. Експіраторна задишка з подовженим видихом, вологі хрипи

Для встановлення толерантності до фізичних навантажень та складання програми реабілітації для пацієнта після перенесеного інфаркту міокарда фізичний терапевт запланував проведення тредмілргометрії. Який тип навантаження при тредмілргометрії найчастіше застосовують у цьому разі?

Question 52Answer

- a. З рівномірним навантаженням
- b. Зі східчастим збільшенням навантаження без періодів відпочинку +
- c. Зі східчастим збільшенням навантаження з періодами відпочинку
- d. З постійно зростаючим навантаженням
- e. Зі східчастим зменшенням навантаження

Укажіть неврологічний рівень пошкодження спинного мозку, за якого прогностично пацієнт з ASIA A-B буде здатний до навчання ходьби за допомогою ортезів і милиць.

Question 53Answer

- a. L1-Th11
- b. L1-L2
- c. L2-L3 +
- d. L4-S1
- e. S2-S4

Пацієнт скаржиться на експіраторну задишку. Об'єктивно виявлено: чутно дистанційні хрипи, положення ортопное, лице набрякле, ціанотичне, допоміжна мускулатура грудної клітки бере участь в акті дихання. Грудна клітка збільшена, у стані максимального вдиху, екскурсія її різко зменшена. Під час пальпації грудна клітка ригідна, голосове тремтіння ослаблене по всіх полях. При порівняльній перкусії відчувається гучний коробковий перкуторний звук у всіх полях, при топографічній - екскурсія нижнього краю легень різко обмежена. Аускультативно: ослаблене везикулярне дихання з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи різної тональності (високі, низькі). Укажіть наявний синдром ураження системи дихання.

Question 54Answer

- a. Синдром емфіземи
- b. Синдром гідротораксу
- c. Синдром бронхоспазму +
- d. Синдром порожнини в легені
- e. Синдром пневмотораксу

У постінсультного пацієнта з помірним лівобічним геміпарезом у післягострий період реабілітації спостерігається порушення селективного рухового контролю, згинальна синергія в руці, розгинальна - у нозі, спастичність м'язів 2-3 бали за шкалою Ашфорта. Який із тестів є оптимальним для оцінювання сили м'язів нижніх кінцівок пацієнта з урахуванням зазначених проявів?

Question 55Answer

- a. Тест 4-ох квадратного кроку
- b. Тест 6-и хвилинної ходьби
- c. Моторний контроль вертикалізації +
- d. Мануальний м'язовий тест
- e. Time Up and Go Test

Пацієнт скаржиться на затерплість та оніміння безіменного пальця та мізинця правої кисті. Під час огляду виявлено: порушення згинання та шкірної чутливості цих пальців, долонного згинання кисті, зведення і розведення пальців кисті, а також приведення великого пальця кисті. Міжкісткові, а також м'язи підвищення мізинця частково атрофовані (починає формуватися "пазуриста лапа"). Який нерв уражений в пацієнта?

Question 56Answer

- a. Серединний
- b. Ліктьовий +
- c. М'язово-шкірний
- d. Променевий
- e. Присередній шкірний нерв передпліччя

Під час оцінки результатів проби Мартіне-Кушелевського виявилось, що в пацієнта збудливість пульсу більше 80%, час відновлення пульсу 5 хв. Визначте тип реакції, якщо артеріальний тиск до навантаження - 120/80 мм рт. ст., а після навантаження - систолічний значно підвищився, діастолічний значно знизився (180/50 мм рт. ст.).

Question 57Answer

- a. Дистонічний +
- b. Астенічний
- c. Нормотонічний
- d. Східчастий
- e. Гіпертонічний

Передчасно народжене немовля досягло координації в моделі "смоктання-ковтання-дихання". Соску якої форми буде рекомендовано для збереження смоктального рефлексу?

Question 58Answer

- a. Округлої +
- b. Циліндричної
- c. -
- d. Симетричної плоскої
- e. Асиметричної плоскої

Які вправи доцільно рекомендувати пацієнтам, що хворіють на гіпертонічну хворобу в різних стадіях, з метою зниження артеріального тиску?

Question 59Answer

- a. Ізометричні
- b. Ритмопластичні
- c. Дихальні із затримкою дихання на видиху +
- d. Дихальні із затримкою дихання на вдиху
- e. Ізотонічні

Передчасно народжене немовля (скоригований вік 36 тижнів) має підвищений рівень розвитку апное. Укажіть позиціонує положення для здійснення орального годування через соску.

Question 60Answer

- a. Альтернативне положення "живіт до живота"
- b. Вертикальне положення (сидячи)
- c. Альтернативне положення на спині +

- d. Горизонтальне положення на спині
- e. -

Як називається захисний рефлекс розтягування, що запобігає перерозтягуванню м'язів?

Question 61Answer

- a. Міотатичний рефлекс +
- b. Сегментарний рефлекс
- c. Тонічний рефлекс
- d. Аутогенне гальмування
- e. Сухожильний рефлекс

Чоловіку віком 38 років, у результаті воєнної травми виконано трансфеморальну ампутацію лівої кінцівки. Функціонування верхніх кінцівок значних обмежень не має, проживає у приватному секторі, де середовище не безбар'єрне. Який допоміжний засіб реабілітації доцільно обрати на період передпротезної реабілітації?

Question 62Answer

- a. Рама для ходьби
- b. Милиці пахвові +
- c. Ролатор
- d. Палиця
- e. Крісло колісне

Фізичний терапевт вимірює амплітуду рухів у надп'яtkово-гомілковому суглобі пацієнта. Навколо якої вісі відбувається згинання та розгинання стопи із загальним обсягом до 60-70°?

Question 63Answer

- a. Поздовжньої
- b. Горизонтальної
- c. Поперечної
- d. Фронтальної +
- e. Сагітальної

Упродовж якого часу рекомендовано позиціонувати пацієнта з ішемічним інсультом в одному положенні для профілактики контрактур?

Question 64Answer

- a. 9-10 год
- b. 3-4 год
- c. 1-2 год +
- d. 5-6 год
- e. 7-8 год

У пацієнта спостерігається розлад рухової функції верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для оцінки якого показника використовують шкалу Ашфорта, шкалу оцінки інвалідизації та шкалу стійкості до пасивних рухів у цьому разі?

Question 65Answer

- a. Активності в повсякденному житті
- b. Спастичності +

- c. Діапазону рухів
- d. Сили м'язів
- e. Точності та координованості рухів

Пацієнту віком 37 років встановлено діагноз: повне ушкодження спинного мозку на рівні T5. Під час занять у ліжку раптово почервонів та поскаржився на різкий головний біль і серцебиття, розпливчатість перед очима, сильну пітливість. Під час обстеження артеріальний тиск становив 185/100 мм рт. ст. Які дії повинен здійснити фізичний терапевт як домедичну допомогу в цьому разі?

Question 66Answer

- a. Залишити пацієнта в положенні лежачи без подушки та повідомити лікаря
- b. Швидко забезпечити доступ свіжого повітря та повідомити лікаря
- c. Вдягнути на ноги еластичні панчохи та стискальний корсет на живіт
- d. Виконати з пацієнтом дихальну гімнастику та повідомити лікаря
- e. Надати пацієнту положення сидячи та повідомити лікаря +

Пацієнту віком 65 років діагностовано COVID-19. SpO₂ - 70%. Яке позиціонування може посприяти значному підвищенню показників сатурації?

Question 67Answer

- a. Напівсидячи
- b. На спині
- c. На лівому боці
- d. На животі +
- e. На правому боці

Пацієнтка віком 66 років перебуває на консультації у фізичного терапевта після нещодавно перенесеного гострого інфаркту міокарда. Під час обстеження виявлено: ЧСС - 88/хв, АТ - 148/89 мм рт. ст., тест "встань та йди" - 22 с. Які вправи протипоказані для цієї пацієнтки?

Question 68Answer

- a. На витривалість на велотренажері
- b. На координацію рухів
- c. Зі статичним напруженням +
- d. На розтягнення м'яких тканин
- e. Дихальні вправи із подовженням видиху

Пацієнт скаржиться на біль та оніміння в ділянці передпліччя та кисті правої руки, які посилюються вночі та під час роботи за комп'ютером. Фізичний терапевт провів два тести: запропонував пацієнту зігнути кисть максимально вниз та утримувати в такому положенні руку протягом 30–60 с; виконав постукування в ділянці зап'ястя та середини передпліччя. Про компресію якого нерва свідчитимуть позитивні результати цих тестів?

Question 69Answer

- a. Дистальної гілки плечового нерва
- b. Променевого
- c. Міжкісткового нерва передпліччя
- d. Серединного +
- e. Ліктьового

Пацієнт скаржиться, що не може розігнути верхню кінцівку в ліктьовому, променево-зап'ястковому та п'ястково-фалангових суглобах, відвести великий палець, а також здійснити супінацію передпліччя та кисті. Який нерв, найімовірніше, пошкоджено?

Question 70Answer

- a. Присередній шкірний нерв передпліччя
- b. Ліктьовий
- c. Серединний
- d. М'язово-шкірний
- e. Променевий +

Чоловіку віком 60 років два дні тому виконано ендопротезування правого кульшового суглоба. Укажіть обмеження, яких повинен дотримуватися пацієнт упродовж 3-х місяців.

Question 71Answer

- a. Відводити пряму нижню кінцівку більше ніж на 30°
- b. Лягати на здоровий бік із подушкою між ногами
- c. Сідати під кутом більше ніж на 90° між тулубом та нижніми кінцівками +
- d. Підніматися сходами
- e. Піднімати пряму кінцівку на 30° при розігнутому коліні

Чоловік віком 62 роки переніс ішемічний інсульт у басейні середньої мозкової артерії правої півкулі 3 місяці тому. Об'єктивно спостерігається: виражена спастичність у лівій верхній кінцівці, особливо у згиначах кисті та лікті (за шкалою Ашфорт - 3 бали). Пацієнт має труднощі в розгинанні руки, утриманні предметів та виконанні функціональних рухів. Яка техніка фізичної терапії є найбільш ефективною для зменшення спастичності в цьому разі?

Question 72Answer

- a. Позиціонування в середньофізіологічному положенні
- b. Використання методики повільного розтягування спазмованих м'язів +
- c. Виконання швидких і різких рухів у суглобах
- d. Застосування холодних компресів на спастичні м'язи
- e. Тренування сили тільки в ураженій кінцівці без участі здорової

Яку стратегію потрібно вибрати для реалізації завдання із вдосконалення навичок пересідання на рівновисокі поверхні особою з наслідками хребетно-спинномозкової травми на рівні C7 (ASIA C)?

Question 73Answer

- a. Пересідання з повною допомогою фізичного терапевта
- b. Пересідання з частковою допомогою фізичного терапевта
- c. Пересідання з вербальною допомогою фізичного терапевта
- d. Пересідання з відпрацюванням належного рівня рівноваги тіла
- e. Пересідання за допомогою ковзкої поверхні +

Чоловік віком 46 роки з індексом маси тіла - 30,2 кг/м² скаржиться на зниження фізичної та розумової працездатності. Професійна діяльність пов'язана з роботою за комп'ютером. Інші скарги відсутні. Вправи якої спрямованості та інтенсивності доцільно рекомендувати пацієнту?

Question 74Answer

- a. Аеробні, субмаксимальної інтенсивності
- b. Анаеробні, великої інтенсивності
- c. Аеробні, помірної інтенсивності +
- d. Анаеробні, помірної інтенсивності
- e. Анаеробні, субмаксимальної інтенсивності

Які заходи рекомендовано комбінувати з метою виховання координаційних навичок і відновлення тактильної, м'язової та суглобової чутливості в решті кінцівки під час стояння та ходіння з протезом?

Question 75Answer

- a. Масаж, вправи на опір і витривалість, загартовування
- b. Масаж, вправи на розвиток рівноваги, догляд за шкірою кукси +
- c. Вправи на координацію та спротив, апаратна фізіотерапія, загартовування
- d. Силкові вправи, вправи на тренування дрібної моторики, бальнеопроцедури
- e. Вправи на тренажерах, вправи зі складною координацією, гігієнічні процедури

Який клінічний інструмент використовується для оцінювання тяжкості та рівня пошкодження спинного мозку?

Question 76Answer

- a. Шкала SCIM
- b. Шкала COVS
- c. Шкала FIM
- d. Шкала ASIA +
- e. Шкала VFM

Постінсультний пацієнт віком 62 роки: післягострий період реабілітації, вертикалізований у положення сидячи, труднощі з утриманням балансу. Яке тренування для покращення самостійного сидіння є оптимальним для такого пацієнта?

Question 77Answer

- a. Тренування опорної функції рук, сидячи
- b. Вправи з підйомом таза, лежачи в ліжку
- c. Тренування з дотягуванням випрямленою рукою, сидячи +
- d. -
- e. Вправи з імітації ходьби, сидячи

Який основний метод проведення інструктажу з правильного користування допоміжним засобом?

Question 78Answer

- a. Фасилітація
- b. Підтримка позитивного психоемоційного стану
- c. Страхування
- d. Демонстрація +
- e. Підбадьорювання

Укажіть метод функціональної діагностики, що досліджує електричні потенціали, які виникають в міокарді з їх подальшим графічним зображенням.

Question 79Answer

- a. Фонокардіографія
- b. Електрокардіографія +

- c. Ультразвукове дослідження серця
- d. Полікардіографія
- e. Ехокардіографія

Яку здатність людини ерготерапевту дозволяє оцінити універсальний опитувальник "активності у повсякденному житті" (Activities of Daily Living-ADL)?

Question 80Answer

- a. Заняттєву активність
- b. Задоволеність від виконання певної діяльності
- c. Інструментальну активність повсякденного життя
- d. Діяльність в аспекті її важливості для пацієнта
- e. До самостійного існування +

Укажіть найефективніший спосіб профілактики пролежнів у пацієнтів з хребетно-спинномозковою травмою.

Question 81Answer

- a. Повноцінне харчування
- b. Протипролежневі матраци та подушки
- c. Гігієна тіла
- d. Часта зміна положення тіла +
- e. Мазі з трофічностимулювальними властивостями

Пацієнтці віком 16 років після перенесеної гострої правосторонньої пневмонії для запобігання розвитку спайок призначено лікувальний масаж. Укажіть правильну послідовність прийомів проведення лікувального масажу при захворюваннях органів дихання.

Question 82Answer

- a. Вібрація, розминання, погладжування, розтирання
- b. Погладжування, розминання, розтирання, вібрація
- c. Погладжування, вібрація, розминання, розтирання
- d. Погладжування, розтирання, розминання, вібрація +
- e. Розтирання, погладжування, розтирання, вібрація

Які завдання фізичної терапії будуть пріоритетними в перші три дні хребетно-спинномозкової травми?

Question 83Answer

- a. Навчання навичок переміщення
- b. Профілактика ускладнень +
- c. Відновлення втрачених функцій
- d. Сприяння процесам нейропластичності
- e. Навчання навичок самообслуговування

Які функції нижньої кінцівки будуть порушені при розриві двоголового м'яза стегна, що виник у результаті падіння з висоти?

Question 84Answer

- a. Розгинання стегна та гомілки
- b. Згинання стегна та гомілки

- c. Супінація стопи
- d. Розгинання стегна та згинання гомілки +
- e. Згинання та пронація гомілки

Завданням комплексних реабілітаційних програм фізичної терапії пацієнтів хворих на ішемічну хворобу серця є покращення метаболічного забезпечення міокардіальних функцій через зниження потреби міокарда в кисні й адекватну його доставку. Завдяки чому реалізується сприятливий вплив індивідуально спланованих систематичних фізичних навантажень на гемодинаміку?

Question 85Answer

- a. Зростанню артеріального тиску й розширенню коронарних артерій
- b. Зростанню частоти серцевих скорочень і розширенню коронарних артерій
- c. Зниженню артеріального тиску і звуженню коронарних артерій
- d. Зменшенню частоти серцевих скорочень і розширенню коронарних артерій +
- e. Зростанню артеріального тиску і звуженню коронарних артерій

Оберіть один зайвий пункт зі шкали повсякденної активності Бартел.

Question 86Answer

- a. Приймання їжі, одягання, ходьба по сходах, біг по рівній поверхні +
- b. Користування туалетом, ходьба по сходах, одягання та купання
- c. Приймання їжі, купання, вмивання, одягання
- d. Купання, одягання, користування туалетом, приймання їжі
- e. Приймання їжі, купання, вмивання, акт дефекації, сечопускання

Під час обстеження пацієнта виявлено спастичність двоголового м'яза верхньої кінцівки з оцінкою 1+ за модифікованою шкалою Ашфорта. Що буде демонструвати двоголовий м'яз з такою оцінкою під час пасивного розгинання передпліччя?

Question 87Answer

- a. Значне підвищення м'язового тону, пасивні рухи утруднені
- b. Помірне підвищення м'язового тону, що проявляється хапанням, з незначним опором протягом подальшої (більше половини) амплітуди руху
- c. Незначне підвищення м'язового тону, що проявляється хапанням, з подальшим розслабленням або мінімальним опором в кінці амплітуди руху
- d. -
- e. Незначне підвищення м'язового тону, що проявляється хапанням, з мінімальним опором протягом подальшої (менше половини) амплітуди руху +

Після родової травми в новонародженій дитини спостерігається: обмеження руху верхньої кінцівки, гіпорексія, м'язова атрофія. До якого виду рухових порушень належать ці зміни нервової системи?

Question 88Answer

- a. Порушення нижнього мотонейрона +
- b. Бульбарні розлади
- c. Пірамідальні порушення
- d. Порушення верхнього мотонейрона
- e. Міастенія

Асистенту фізичного терапевта необхідно оцінити рівень задишки під час фізичного навантаження в пацієнта віком 50 років з хронічним обструктивним захворюванням

легень, який амбулаторно проходить реабілітацію. Який тест або шкалу треба застосувати для суб'єктивної оцінки задишки під час фізичних навантажень?

Question 89Answer

- a. Шкалу Борга +
- b. Шкалу NYHA
- c. Тест 2-хвилинної ходьби
- d. Тест 6-хвилинної ходьби
- e. Шкалу Берга

Пацієнту віком 66 років, який хворіє на ішемічну хворобу серця, з метою розроблення ефективної комплексної програми фізичної терапії призначено проведення функціональної проби для оцінки швидкості його адаптаційних можливостей на фізичне навантаження з визначенням часу відновлювальних процесів. Якою пробой визначається здатність серцево-судинної системи відновлюватися після занять фізичними вправами?

Question 90Answer

- a. Генчі
- b. Штанге
- c. Руф'є
- d. Вальсальви
- e. Мартіне-Кушелевського +

Укажіть найбільш ефективне положення для зменшення болю та полегшення екскурсії грудної клітки для пацієнта з плевритом на ліжковому режимі.

Question 91Answer

- a. На спині
- b. На здоровому боці
- c. На хворому боці +
- d. Напівсидячи
- e. На животі

Жінка віком 49 років, викладач, скаржиться на біль у попереку та скутість у поперековому відділі хребта під час здійснення побутової діяльності. Яке доступне функціональне дослідження доцільно застосувати, щоб дослідити амплітуду руху хребта в цьому разі?

Question 92Answer

- a. Тест Шобера +
- b. Проба підборіддя-груднина
- c. Тест Отта
- d. Тест з 6-хвилинною ходьбою
- e. Тест Форестьє

Що з нижченаведеного є протипоказанням для фізичної терапії при гастриті в підгострій стадії?

Question 93Answer

- a. Зниження секреторної функції
- b. Підвищення секреторної функції
- c. Диспептичні явища
- d. Зміна апетиту

е. Виражений больовий синдром +

Пацієнт віком 72 роки потрапив до лікувального закладу внаслідок гіпертонічного кризу. Після проведеного лікування його стан частково поліпшився. Укажіть одне з основних завдань терапевтичних вправ при гіпертонічній хворобі.

Question 94Answer

- a. -
- b. Покращення діяльності ЦНС, усунення порушень процесів регуляції артеріального тиску +
- c. Стимулювання психоемоційного стану пацієнта і зниження рухового режиму
- d. Пригнічення обміну речовин у міокарді та колатерального кровообігу
- e. Попередження екстракардіальних чинників кровообігу

У пацієнта віком 67 років під час огляду виявлено: відсутність пропріоцептивної та тактильної чутливості шкіри верхньої кінцівки та верхньої половини тулуба. Про ураження якого провідного шляху це свідчить?

Question 95Answer

- a. Спинномозково-покрівельного
- b. Клиноподібного пучка Бурдаха +
- c. Переднього спинномозково-мозочкового Говерса
- d. Спинномозково-оливного
- e. Тонкого пучка Голля

Пацієнтка віком 32 роки має в анамнезі: рецидивно-ремітуючий розсіяний склероз. Під час обстеження виявлено: дискоординація рухів, порушення балансу та хитання при ходьбі. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

Question 96Answer

- a. Афазія
- b. Атаксія +
- c. Анозогнозія
- d. Апраксія
- e. Астереогнозія

Під час огляду фізичний терапевт оцінює амплітуду рухів у груднинно-ключичному суглобі пацієнта. Навколо якої вісі можливе піднімання та опускання ключиці?

Question 97Answer

- a. Сагітальної +
- b. Горизонтальної
- c. Фронтальної
- d. Поперечної
- e. Вертикальної

Під час проведення аускультції над нижньою частиною легень не вислуховується дихання. Для якого захворювання це характерно?

Question 98Answer

- a. Сухого плевриту
- b. Пневмонії
- c. Муковісцидозу

- d. Ексудативного плевриту +
- e. Бронхоектатичної хвороби

Пацієнт скаржиться на змішану задишку. Об'єктивно виявлено: тахіпное, відставання однієї половини грудної клітки в акті дихання та згладженість міжреберних проміжків на цьому боці. У нижньому відділі цього боку грудної клітки під час пальпації не визначається голосове тремтіння, при порівняльній перкусії виявляється притуплений звук, а при топографічній - обмеження рухомості нижнього краю легені. Під час аускультації над зоною притуплення перкуторного звуку везикулярне дихання відсутнє, а вище цієї зони - ослаблене. Який наявний синдром ураження системи дихання?

Question 99Answer

- a. Синдром гідротораксу +
- b. Синдром емфіземи
- c. Синдром пневмотораксу
- d. Синдром бронхообструкції
- e. Синдром порожнини в легені

Пацієнт із обмеженою рухливістю, який проходить реабілітацію після травми, перебуває на етапі відновлення ходьби. Під час одного з сеансів він починає відчувати невпевненість у рухах і може впасти. Як потрібно організувати процес, щоб уникнути падінь?

Question 100Answer

- a. Страхувати пацієнта лише в кінці заняття, коли він наближається до завершення вправ
- b. Проводити заняття лише в присутності медичного персоналу, щоб мати додаткову підтримку за необхідності
- c. Дозволити пацієнту рухатися без обмежень, щоб стимулювати його самостійність і впевненість
- d. -
- e. Використовувати спеціальний пояс для страхування пацієнта під час ходьби, щоб знизити ризик падінь +

Під час обстеження виявлено, що пацієнт не може здійснити підшовове згинання стопи та пальців, але при цьому він може стояти на п'ятках, але не може стояти на пальцях. Який нерв, найімовірніше, пошкоджено?

Question 101Answer

- a. Бічний підшововий
- b. Загальний малогомілковий
- c. Великогомілковий +
- d. Задній шкірний нерв стегна
- e. Сідничний

Пацієнт віком 69 років за 6 місяців після ендопротезування правого колінного суглоба перебуває на довготривалій реабілітації. Який тест доцільно застосувати фізичному терапевту для оцінки швидкості ходьби?

Question 102Answer

- a. Тест Ласега
- b. 6-хвилинний тест ходьби
- c. Тест Філіпса

- d. 10-метровий тест ходьби +
- e. Тест "Встань та йди"

Після оперативного лікування колінного суглоба в пацієнта сформувалася післяімобілізаційна м'язова контрактура. Для збільшення амплітуди руху пацієнт самостійно розгинає колінний суглоб, утримуючи його у крайній можливій точці амплітуди за допомогою напруження чотириголового м'яза. Як називається цей тип розтягнення?

Question 103 Answer

- a. Активний +
- b. Постізометричний
- c. Пасивний
- d. Динамічний
- e. Балістичний

Що є протипоказанням для проведення тесту на толерантність до фізичного навантаження?

Question 104 Answer

- a. Артеріальна гіпертензія
- b. Синусова тахікардія
- c. Серцева недостатність I ступеня
- d. Поодинокі екстрасистоли
- e. Коронарна недостатність із частими нападами стенокардії +

Постінсультному пацієнту діагностовано: лівобічний геміпарез, виражений у руці, помірний у нозі. Після обстеження ерготерапевтом верхньої кінцівки пацієнту призначено такі втручання: компресійний одяг, електростимуляцію, тривале виконання пасивних рухів у підвищеному положенні, підняття кінцівки під час відпочинку. Про наявність якого ускладнення паретичної кінцівки свідчать призначені втручання?

Question 105 Answer

- a. Набряку +
- b. Сублюксації
- c. Болю
- d. Контрактури
- e. Спастичності

У пацієнта в анамнезі гостре порушення мозкового кровообігу. Об'єктивно виявлено: правобічний геміпарез. На досягнення якої цілі в довготривалому реабілітаційному періоді буде спрямовувати програму фізичний терапевт?

Question 106 Answer

- a. Профілактика виникнення контрактур
- b. Покращення самопочуття
- c. Профілактика болю
- d. Удосконалення дихальних рухів +
- e. Удосконалення навичок самообслуговування

Пацієнтка віком 65 років із діагнозом: остеопороз - має високий ризик падінь та переломів. Які з нижченаведених терапевтичних вправ є найбільш ефективним для профілактики падінь та зменшення ризику переломів?

Question 107Answer

- a. Вправи на силу та для розтягнення
- b. Вправи для розслаблення та аеробні вправи
- c. Вправи для рівноваги та для розслаблення
- d. Вправи для рівноваги та сили +
- e. Вправи для розтягнення та аеробні вправи

У чоловіка під час дослідження встановлено відсутність усіх видів чутливості на правій половині тіла. Який вид порушення чутливості спостерігається в пацієнта?

Question 108Answer

- a. Анестезія +
- b. Гіпестезія
- c. Каузалгія
- d. Гіперестезія
- e. Парестезія

У дворічного хлопчика діагностовано периферичний параліч Дюшена-Ерба праворуч, зумовлений травматичним ураженням верхнього стовбура плечового сплетення. Під час об'єктивного обстеження пацієнта виявлено: значне зниження згинально-ліктьового та п'ястково-променевого рефлексів праворуч, розлади поверхневої чутливості на зовнішній поверхні плеча і передпліччя, болючість у надключичній ямці праворуч при натисканні. Які ще порушення спостерігатимуться в пацієнта?

Question 109Answer

- a. Приведення плеча та розгинання в ліктьовому суглобі
- b. Приведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі
- c. Відведення плеча та розгинання в ліктьовому суглобі
- d. -
- e. Відведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі +

Які індивідуальні соціальні чинники потрібно враховувати під час опитування пацієнта?

Question 110Answer

- a. Професія, хобі, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип і поверх помешкання +
- b. Професія, сімейний стан, хобі, хороші побутові умови
- c. Соціальний статус, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип помешкання
- d. Професія, матеріальне становище, сімейний стан, наявність домашніх тварин
- e. -

Під час стоматоскопічного та антропометричного огляду чоловіка виявлено перевагу поздовжніх розмірів тіла над поперечними: довгі та тонкі кінцівки, довга та тонка шия, вузькі плечі, вузька та плоска грудна клітка, гострий епігастральний кут, крилоподібні лопатки, сутулість, тонка, суха і бліда шкіра, слабо розвинені м'язи та незначні жировідкладення. До якого типу тілобудови належить пацієнт (за Черноруцьким)?

Question 111Answer

- a. Астенічного +
- b. Гіперстенічного

- c. Атонічного
- d. Гіпостенічного
- e. Нормостенічного

Який спірографічний показник вважається найкращим для оцінки ступеня обструкції дихальних шляхів?

Question 112Answer

- a. Функціональна залишкова ємність легень (ФЗЄ)
- b. Хвилинний об'єм дихання (ХОД)
- c. Максимальна вентиляція легень (МВЛ)
- d. Форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ)
- e. Об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) +

Передчасно народжена дитина щоденно отримує до 10-12 стресових процедур догляду, зокрема забір крові. Яку шкалу застосовують для вимірювання процедурного болю недоношених і доношених немовлят?

Question 113Answer

- a. N-PASS
- b. NBAS
- c. Шкалу ВАШ
- d. -
- e. NIPS +

Який метод обстеження пацієнтів із патологією органів дихання використовують під час перевірки голосового тремтіння, визначення тургору, вологості шкіри, тону м'язів, товщини підшкірного жирового шару та периферичних лімфатичних вузлів?

Question 114Answer

- a. Ларингоскопію
- b. Аускультацию
- c. Пальпацію +
- d. Мануально-м'язове тестування
- e. Перкусію

Пацієнт віком 45 років скаржиться фізичному терапевту на біль у спині та обмеження рухів у грудному відділі хребта. В анамнезі: травма спини 5 років тому. Для оцінки рухливості хребта фізичний терапевт вирішив провести тест Отта. Під час виконання тесту фізичний терапевт відзначив нормальну рухливість хребта. На скільки сантиметрів збільшується відстань під час виконання тесту Отта при нормальній рухливості хребта?

Question 115Answer

- a. 3,5-5 +
- b. 1-2
- c. 7-10
- d. 0,5-3
- e. 8-9,5

Чоловік віком 25 років потрапив до лікувального закладу внаслідок гіпотонічного кризу. Після надання допомоги і проведення лікування його стан поліпшився. Які терапевтичні вправи найбільш доцільно призначити для цього пацієнта?

Question 116Answer

- a. Швидкісно-силові вправи та вправи з невеликим обтяженням +
- b. Вправи з швидкою зміною положення тіла у просторі
- c. Пасивні фізичні вправи для великих м'язових груп
- d. Активні фізичні вправи для малих м'язових груп
- e. Дихальні вправи із затримкою дихання на видиху

Пацієнтка віком 27 років перебуває 5 день у неврологічному відділенні після операції зі стабілізації хребта на рівні хребців T11-L1. З анамнезу відомо, що місяць тому, після дорожньо-транспортної пригоди, жінка була шпиталізована до лікарні з діагнозом перелом хребта на рівні T12 з повним пошкодженням спинного мозку. Фізичний терапевт планує на занятті навчити пацієнтку техніці самостійної стимуляції кашлю. Яке вихідне положення протипоказане для пацієнтки під час проведення цієї процедури?

Question 117Answer

- a. Сидячи
- b. Лежачи на правому боці
- c. Лежачи на животі
- d. Лежачи на лівому боці
- e. Лежачи на спині +

Пацієнт із травмою спинного мозку на рівні Th6 після стабілізації стану проходить реабілітацію. Він має параплегію, збережену силу м'язів верхніх кінцівок і труднощі з підтриманням рівноваги в сидячому положенні. Тренування якої навички першочергово необхідне пацієнту для самостійного пересаджування в крісло колісне?

Question 118Answer

- a. Нахилу тулуба вперед без опори на руки
- b. Утримання положення стоячи у вертикалізаторі протягом 5 хв
- c. Переміщення в різних напрямках в положенні сидячи з опорою на руки +
- d. Переносу ваги тіла на нижні кінцівки в положенні сидячи
- e. Утримання балансу сидячи без опори на руки протягом 1 хв

Постінсультний пацієнт у післягострий період реабілітації скаржиться на зниження чутливості, виражену слабкість м'язів у руці та помірний біль у плечі. Якої доказової стратегії втручання необхідно дотримуватися з метою попередження сублюксації та болю в плечі пацієнта?

Question 119Answer

- a. Сидіння в кріслі з підлокотниками, ортез на променево-зап'ястковий суглоб, масаж руки
- b. Обмеження усіх рухів в плечовому суглобі, підтримування руки за два суглоби, носіння бандажа
- c. Правильне позиціонування кінцівки, підтримувальні пов'язки, щадне ставлення до руки +
- d. -
- e. Тейпування плеча, пасивні вправи, розтирання плеча здоровою рукою

Укажіть причину виникнення дефекту ходьби "підйом на носок" у пацієнта із протезом на трансфеморальному рівні.

Question 120Answer

- a. Приймальна гільза в зігнутому положенні
- b. Слабкість м'язів задньої поверхні стегна
- c. Контрактура відвідних м'язів стегна
- d. Занадто довгий протез +
- e. Жорсткий протез стопи

Рентгенологічно в пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути насамперед травмований уламками кістки в цьому разі?

Question 121Answer

- a. Великого грудного м'яза
- b. Двоголового м'яза плеча +
- c. Найширшого м'яза спини
- d. Дельтовидного м'яза
- e. Великого круглого м'яза

Яку концептуальну модель практики використовує у своїй професійній діяльності ерготерапевт, коли аналізує заняттєву активність та важливі для особи заняття з метою їх покращення, враховуючи вплив середовища та наратив самої особи?

Question 122Answer

- a. Модель процесу ерготерапевтичного втручання (OTIPM)
- b. Модель "Особа-середовище-заняття-виконання" (PEOP) +
- c. Модель заняттєвої активності людини (МОНО)
- d. Канадська модель виконання заняття та залучення (CMOP-E)
- e. Модель KAWA "Річка"

Пацієнт після інсульту має порушення ходьби, часто спотикається через слабкість ураженої ноги, відзначається обмежена активна дорсальна флексія стопи (проявляється "падінням стопи" під час кроку). Який підхід у фізичній терапії буде найбільш ефективним у цьому разі?

Question 123Answer

- a. Використання ортеза для стопи та тренування правильного патерна ходьби +
- b. Повна відмова від ходьби, щоб уникнути падінь
- c. Надання пацієнту милиць без навчання техніки ходьби
- d. Вправи виключно на верхні кінцівки, оскільки відновлення ходьби можливе пізніше
- e. Виконання вправ лише в положенні лежачи для збільшення сили м'язів

Під час дослідження моделі ходи в пацієнта спостерігається втрата природного замаху руки та перетягування ураженої ноги півколом. Який це тип аномальної ходи?

Question 124Answer

- a. Геміплегічний +
- b. Атактичний
- c. Міопатичний
- d. Паркінсонічний
- e. Невропатичний

Чим зумовлений мінімальний час кардіотренування незалежно від рівня здоров'я?

Question 125Answer

- a. Адаптацією дихальної та серцево-судинної систем до фізичного навантаження +

- b. Зростанням інтенсивності обміну речовин під час кардіотренування
- c. Поступовим утворенням достатньої кількості енергії для роботи на витривалість
- d. Функціональним станом дихальної та серцево-судинної систем
- e. Дотриманням загальних умов застосування аеробних терапевтичних вправ у фізичній терапії

Що дозволяє оцінити Бартел Індекс (BI) у пацієнтів, які перенесли інсульт?

Question 126Answer

- a. Силу м'язів
- b. Тонус м'язів
- c. Короткотривалу пам'ять
- d. Рівень самообслуговування +
- e. Когнітивні функції

Фізичний терапевт проводить обстеження колінного суглоба пацієнта з підозрою на пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки. Пацієнт лежить на спині, коліно зігнуте під кутом приблизно 30° . Фізичний терапевт однією рукою стабілізує стегно, а іншою намагається змістити великогомілкову кістку вперед. Який тест використовується в цьому разі для оцінки надмірного зміщення великогомілкової кістки?

Question 127Answer

- a. Тест передньої висувної шухлядки
- b. Тест МакМюррея
- c. Тест Патріка
- d. Тест Лахмана +
- e. Тест Х'юстона

Як називається вільний у просторі рух, що виконується дистальним сегментом кінцівки?

Question 128Answer

- a. Вправа з відкритим кінематичним ланцюгом +
- b. Функціональна вправа
- c. Зворотна вправа
- d. Поступальна вправа
- e. Вправа із закритим кінематичним ланцюгом

Укажіть правильну позицію рук фізичного терапевта при страхуванні пацієнта під час ходьби.

Question 129Answer

- a. Одна рука страхує за пояс, інша тримає за плече +
- b. Одна рука тримає за плече
- c. Одна рука розміщена на стегнах, інша тримає за плече
- d. Обидві руки страхують за пояс
- e. Одна рука розміщена на куприку, інша - попереду грудей

Пацієнт з бронхіальною астмою перебуває на стаціонарному етапі лікування. Після завершення бронхоспазму асистент фізичного терапевта рекомендує використовувати терапевтичні дихальні вправи. Укажіть ці вправи.

Question 130Answer

- a. Дихання з форсованим вдихом
- b. Дихальні вправи з промовою звуків на подовженому видиху +

- c. Повільне дихання без вольового керування
- d. Дихання з форсованим видихом
- e. Швидке глибоке дихання

Жінка віком 35 років має синдром зап'ясткового каналу. Скаржиться на те, що не може друкувати більше 10 хв, перш ніж біль стане непереборним. Які заходи фізичної терапії та ерготерапії застосовуватимуться з метою зменшення больових відчуттів у перші 5 днів?

Question 131Answer

- a. Розтягування м'язів передпліччя почергово з ортезуванням
- b. Ортезування почергово з вправами з полегшених вихідних положень
- c. Покращення мобільності променево-зап'ясткового суглоба та ергономіка робочого місця
- d. Ортезування та зміцнення м'язів передпліччя +
- e. Покращення нейром'язового контролю

Пацієнт віком 73 роки хворіє на хворобу Паркінсона, акінетико-регідну форму. Після тестування визначена IV стадія хвороби за модифікованою шкалою Хена та Яра. Якому рівню рухової активності відповідає ця стадія хвороби в пацієнта?

Question 132Answer

- a. Легке обмеження рухової активності, пацієнт не потребує сторонньої допомоги
- b. Істотне обмеження рухової активності, але залишається можливим самостійне пересування +
- c. Істотне обмеження рухової активності, пацієнт не може самостійно пересуватися
- d. Помірне обмеження рухової активності, пацієнт потребує істотної сторонньої допомоги в повсякденному житті
- e. Помірне обмеження рухової активності, легка залежність пацієнта від сторонньої допомоги в повсякденному житті

Під час опитування ерготерапевтом пацієнтка надала таку інформацію: "Я працюю бібліотекаркою та навчаюся на курсах медсестринства...". До якого домену МКФ належить отримана інформація про пацієнтку?

Question 133Answer

- a. Фактори середовища
- b. Активність
- c. Участь +
- d. Особистісні фактори
- e. Функції

Який із нижченаведених варіантів відповідей характеризує фізичні вправи у відкритому кінематичному ланцюгу?

Question 134Answer

- a. Більш вільний та швидкий рух, але менша стабільність +
- b. Багатосуглобові вправи із залученням декількох м'язових груп
- c. Відтворення функціональних схем рухів
- d. Збільшення компресійних сил стосовно сил зсуву
- e. Залучення в роботу м'язів - агоністів, синергістів та антагоністів

У разі ураження якого рівня спинного мозку пацієнту надається повна допомога під час прийому їжі?

Question 135Answer

- a. C1-C4 +
- b. T1-T2
- c. C7-C8
- d. C6-C7
- e. C5-C6

Як має рухатися фахівець, страхуючи пацієнта під час спуску зі сходів?

Question 136Answer

- a. Стояти двома ногами на одній і тій самій сходинці при кожному кроці пацієнта
- b. Переходити одночасно з пацієнтом
- c. Стояти на рівні з пацієнтом та рухатись одночасно з ним
- d. Стояти нижче пацієнта та переходити на сходинку нижче, після того як пацієнт зробив крок +
- e. Стояти позаду пацієнта та переходити після того як пацієнт зробив крок

Фізичному терапевту необхідно визначити структуру походження за характером болю в пацієнта. Який біль має такі характеристики: глибокий, свердлячий, локалізований?

Question 137Answer

- a. Фасціальний
- b. М'язовий
- c. Кістковий +
- d. Судинний
- e. Нервовий

Жінка віком 42 роки після підняття важкого предмета відчула різкий біль у попереково-крижовому відділі хребта з іррадіацією в сідницю та по передній поверхні стегна і внутрішній поверхні гомілки праворуч. Об'єктивно спостерігається: напружені м'язи поперекової ділянки, сколіоз, випрямлення поперекового лордозу, обмеження рухів у поперековому відділі хребта та болючість під час глибокої пальпації паравертебральних точок L4-S1 праворуч. Симптом Ласега позитивний з правого боку. Ахіловий рефлекс праворуч не викликається. Гіпестезія по зовнішньому краю правої стопи. Який найімовірніший діагноз?

Question 138Answer

- a. Люмбоішіалгія
- b. Радикулопатія L5
- c. Радикулопатія S1 +
- d. Люмбаго
- e. Люмбалгія

У передчасно народженої дитини оцінюється здатність до орального годування. Укажіть фазу ковтання, під час якої будуть активно задіяні нижня щелепа, язик, м'яке та тверде піднебіння з частковим залученням губ.

Question 139Answer

- a. -
- b. Фарингеальна

- c. Початкова езофагеальна
- d. Езофагеальна
- e. Ротова +

Фізичний терапевт проводить прийом пацієнтів, серед яких є особи з ознаками респіраторних захворювань. Він хоче мінімізувати ризик інфікування та дотримуватися правил індивідуального захисту. Який засіб індивідуального захисту він має обов'язково використовувати під час контакту з пацієнтом?

Question 140Answer

- a. Респіратор або маску для захисту дихальних шляхів +
- b. Будь-який елемент захисту, який терапевт вважає достатнім
- c. -
- d. Захисний екран або окуляри як єдиний засіб захисту
- e. Гумові чоботи та спеціальний ізоляційний костюм

Оберіть мобілізаційний прийом, який використовується при згинальній контрактурі в променево-зап'ястковому суглобі, з урахуванням правила опуклості-вгнутості.

Question 141Answer

- a. Ковзання вниз +
- b. Ковзання медіально
- c. Ковзання латерально
- d. Ковзання вгору
- e. —

Пацієнтка віком 67 років, проходить повторний курс реабілітації після ішемічного інсульту в басейні правої середньої мозкової артерії. Скаржиться на обмеженість рухів у лівих кінцівках, слабкість та порушення рухів у кінцівках, головний біль, коливання АТ, хиткість під час ходьби. Який тест доцільно застосувати для виміру функціональної рухливості та ризику падінь у пацієнтки, що не вимагає спеціального обладнання та багато часу?

Question 142Answer

- a. "2-хвилинний тест ходьби" (2MWT)
- b. "10-метровий тест ходьби" (10MWT)
- c. Динамічний індекс ходьби (DGI)
- d. "Встань та йди" (TUG) +
- e. Шкала рівноваги Берга (BBS)

Із якою метою проводиться профілактика респіраторних ускладнень в осіб із ураженням шийного відділу хребта в гострому періоді хребетно-спинномозкової травми?

Question 143Answer

- a. Забезпечення вентиляції легень +
- b. Збільшення екскурсії грудної клітки
- c. Видалення мокротиння з трахіобронхіального дерева
- d. Попередження ателектазу
- e. Збільшення екскурсії діафрагми

Правильне положення пацієнта під час мануально-м'язового тестування дозволяє запобігти включенню в рух інших м'язів при оцінюванні сили відповідного м'яза. Яке вихідне положення пацієнта передбачено для оцінювання сили чотириголового м'яза на 4 бали?

Question 144Answer

- a. Лежачи на животі з зігнутою ногою, яка тестується
- b. Лежачи на спині, ноги розігнуті
- c. Лежачи на боці, зверху розігнута нога, яка тестується
- d. Сидячи на кушетці зі звисеними ногами +
- e. Сидячи на кушетці з витягнутими ногами

Чоловік віком 45 років скаржиться на задишку, що посилюється під час незначного фізичного навантаження та малопродуктивний кашель. В анамнезі: ХОЗЛ. Укажіть найбільш інформативний метод для визначення дихальної недостатності в пацієнта.

Question 145Answer

- a. Бронхографія
- b. Бронхоскопія
- c. Комп'ютерна томографія легень
- d. Рентгенографія органів грудної клітки
- e. Спірографія +

Після проведення фізичної терапії пацієнту з дорсопатією шийного відділу хребта дано рекомендації і продемонстровано виконання вправ із самоопором для м'язів шиї. Як активуються м'язи при виконанні таких вправ?

Question 146Answer

- a. Напруження м'язів-синергістів без включення м'язів-антагоністів
- b. Розслаблення м'язів-синергістів та напруження м'язів-антагоністів
- c. -
- d. Напруження м'язів-синергістів та розслаблення м'язів-антагоністів
- e. Одночасне напруження м'язів-синергістів та м'язів-антагоністів +

У пацієнта віком 34 роки під час заняття терапевтичними вправами спостерігається: прискорене дихання, невисока пітливість та незначне почервоніння шкіри. Чоловік не має ніяких скарг та безпомилково виконує вказівки. Укажіть рівень втоми в пацієнта.

Question 147Answer

- a. Незначний +
- b. Виражений
- c. Різкий
- d. Значний
- e. Втома відсутня

Пацієнт скаржиться на змішану задишку. Об'єктивно виявлено: тахіпное, відставання однієї половини грудної клітки в акті дихання та згладженість міжреберних проміжків на цьому боці. Під час пальпації цього боку грудної клітки не визначається голосове тремтіння, при порівняльній перкусії виявляється тимпанічний звук. Аускультативно - над зоною тимпанічного перкуторного звуку везикулярне дихання відсутнє. Укажіть наявний синдром ураження системи дихання.

Question 148Answer

- a. Синдром гідротораксу
- b. Синдром порожнини в легені
- c. Синдром пневмотораксу +
- d. Синдром бронхообструкції
- e. Синдром емфіземи

У чоловіка віком 68 років - геморагічний інсульт, бал за шкалою ком Глазго - 8. Який із заходів фізичної терапії застосовують у перші 4 дні в реанімаційному відділенні?

Question 149Answer

- a. Дренажні положення та динамічні вправи
- b. Активні динамічні вправи
- c. Позиціонування та пасивні вправи +
- d. Активні дихальні вправи
- e. Позиціонування та активні вправи

До фізичного терапевта звернувся військовослужбовець після перелому правої великогомілкової кістки. Наразі права нижня кінцівка знерухомлена гіпсовою іммобілізацією до нижньої третини стегна. Які вправи можна призначити пацієнту?

Question 150Answer

- a. Пасивні вправи для колінного суглоба
- b. Активні динамічні вправи для колінного суглоба
- c. Пасивні вправи для гомілковостопного суглоба
- d. Ізометричні вправи для м'язів гомілки +
- e. Ізотонічні вправи для м'язів гомілки

