

Крок 2 Фізична терапія (UA)

Розпочатовівторок 1 липня 2025 20:04 PM

СтанЗавершено

Завершеновівторок 1 липня 2025 21:38 PM

Витрачено

часу1 година 33 хв

Балів137,00/150,00

Оцінка9,13 з можливих 10,00 (91,33%)

Питання 1

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка віком 22 роки, термін вагітності 12 тижнів, страждає на ожиріння II ступеня. Який лабораторний аналіз має бути обов'язково призначений для цієї вагітної?

Питання 1Відповідь

a.

Аналіз крові на ВІЛ

b.

Аналіз крові на ревмапроби

c.

Загальний аналіз сечі

d.

Глюкотолерантний тест

e.

Загальний аналіз крові

Коментар

Правильна відповідь: + Глюкотолерантний тест

Питання 2

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про наявність тахікардії?

Питання 2Відповідь

a.

Подовження сегменту Q-T

b.

Вкорочення інтервалу P-Q

c.

Подовження комплексу QRS

d.

Вкорочення інтервалу R-R

e.

Подовження інтервалу R-R

Коментар

Правильна відповідь: + Вкорочення інтервалу R-R

Питання 3

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Чому перед початком фізичного навантаження обов'язково треба визначати рівень глюкози в крові пацієнта?

Питання 3Відповідь

a.

Може змінюватися осматичний тиск

b.

Може знижуватися сечовидільна функція

c.

Може підвищуватися сечовидільна \\\ функція

d.

Може виникнути гіперглікемія

e.

Може виникнути гіпоглікемія

Коментар

Правильна відповідь: + Може виникнути гіпоглікемія

Питання 4

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час дослідження чутливості пацієнт сидить у зручному положенні, очі закриті. Йому проводять бавовною (пензликом, пером або м'якою тканиною) по невеликій ділянці (3 см) оголеної шкіри. Який вид чутливості

досліджується у цьому разі?

Питання 4Відповідь

a.

Поверхнева

b.

Глибока

c.

Пропріорецепція

d.

Кінестезія

e.

Больова

Коментар

Правильна відповідь: + Поверхнева

Питання 5

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Які з нижченаведених визначень не належать до підрозділів МКФ?

Питання 5Відповідь

a.

Інвалідність і реабілітація

b.

Структура

c.

Функція

d.

Активність і участь

e.

Фактори навколишнього середовища

Коментар

Правильна відповідь: + Інвалідність і реабілітація

Питання 6

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Двомісячній дитині встановлено діагноз: вада розвитку ЦНС, мієломенінгоцеле грудного відділу хребта, spina bifida Th8-Th11. Який імовірний прогноз щодо набуття рухових навичок у цьому разі?

Питання 6Відповідь

a.

Сидіти незалежно та перевертатися навчиться вчасно, до 2-3 років навчиться повзати, до 4 років може навчитися ходити в ортезах AFO або KAFO

b.

Із затримкою навчиться сидіти з опорою на руки, зможе навчитися повзати тільки по-пластунськи, до 5 років може навчитися ходити в ортезах KAFO або HKAFO з використанням ходунків або милиць

c.

Із затримкою навчиться сидіти за умови підтримки тулуба, можливе опанування перекачування, основний спосіб пересування - крісло колісне

d.

Сидіти незалежно, перевертатись і повзати навчиться вчасно, до 2 років навчиться ходити, потребуватиме тренувань на витривалість і зміцнення м'язів, використання ортопедичних устілок

e.

Сидіти незалежно, перевертатися, повзати та ходити навчиться вчасно
Коментар

Правильна відповідь: + Із затримкою навчиться сидіти за умови підтримки тулуба, можливе опанування перекачування, основний спосіб пересування - крісло колісне

Питання 7

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 30 років, офісний працівник, проблеми зі здоров'ям не має. Скаржиться на швидке стомлювання під час помірного фізичного навантаження. Які заходи фізичної терапії варто застосувати пацієнту?

Питання 7Відповідь

a.

Дозовану ходьбу з ЧСС --- 50--60% від максимального протягом 40 хвилин

b.

Дозовану ходьбу з ЧСС --- 70--80% від максимального протягом 30 хвилин

c.

Ходьбу вгору під кутом 30° протягом 40 хвилин

d.

Дозовану ходьбу з ЧСС --- 40--50% від максимального протягом 80 хвилин

e.

Ходьбу вгору під кутом 30° протягом 20 хвилин

Коментар

Правильна відповідь: + Дозовану ходьбу з ЧСС --- 50--60% від максимального протягом 40 хвилин

Питання 8

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час виписки пацієнта з реабілітаційного неврологічного відділення, його результати оцінювання рівноваги за шкалою балансу Берга --- 38 балів. Які рекомендації доцільно надати пацієнту щодо безпечного самостійного пересування?

Питання 8Відповідь

a.

Ходьба без допоміжних засобів пересування та допомоги іншої особи

b.

Ходьба без допоміжних засобів лише по рівній поверхні

c.

Ходьба під контролем іншої особи

d.

Ходьба з опорою на допоміжні засоби або з підтримкою іншої особи

e.

Переміщення на візку

Коментар

Правильна відповідь: + Ходьба з опорою на допоміжні засоби або з підтримкою іншої особи

Питання 9

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

З урахуванням яких 3-х послідовних фаз треба планувати програму кардіореабілітації з фізичними тренуваннями на витривалість?

Питання 9Відповідь

a.

Початкової, проміжної, контролю

b.

Адаптації, поліпшень і підтримуючої

c.

Стабілізації стану, поліпшень, контролю

d.

Початкової, поліпшень і підтримуючої

e.

Стабілізації стану, проміжної, підтримуючої

Коментар

Правильна відповідь: + Початкової, поліпшень і підтримуючої

Питання 10

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

До компонентів первинного оцінювання стану пацієнта в програмах легеневої реабілітації не входить:

Питання 10Відповідь

a.

Оцінювання стану харчування

b.

Психосоціальне оцінювання

c.

Оцінювання стану опорно-рухового \\\ апарату

d.

Оцінювання рівня знань пацієнта

e.

Оцінювання вегетативної нервової \\\ системи

Коментар

Правильна відповідь: + Оцінювання вегетативної нервової \\\ системи

Питання 11

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

До якої групи відносяться симптоми Ласега, Нері, Вассермана?

Питання 11Відповідь

a.

Симптоми орального автоматизму

b.

Симптоми випадіння

c.

Стопні патологічні симптоми

d.

Менінгеальні симптоми

e.

Симптоми натягу периферичних нервів і нервових корінців

Коментар

Правильна відповідь: + Симптоми натягу периферичних нервів і нервових корінців

Питання 12

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Що характерно для контрактури суглоба?

Питання 12Відповідь

a.

Біль в спокої

b.

Перерозгинання

c.

Гойдальні рухи

d.

Обмеження рухів

e.

Розхитаність

Коментар

Правильна відповідь: + Обмеження рухів

Питання 13

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Одна метаболічна одиниця відповідає:

Питання 13Виберіть одну відповідь:

A.

Витраті енергії і споживанню кисню, виміряного у спокої, і становить 3,5 л/хв.

B.

Витраті енергії і споживанню кисню, виміряного під час ходьби зі швидкістю 5 км/год., і становить 3,5 мл/кг/хв.

C.

Витраті енергії і споживанню кисню, виміряного у спокої, і становить 3,5 мл/кг/хв

D.

Витраті енергії і споживанню кисню, виміряного під час ходьби зі швидкістю 5 км/год., і становить 3,5 л/кг/хв.

E.

Витраті енергії і споживанню кисню, виміряного під час ходьби зі швидкістю 5 км/год., і становить 3,5 л/хв.

Коментар

Правильна відповідь: + Витраті енергії і споживанню кисню, виміряного у спокої, і становить 3,5 мл/кг/хв

Питання 14

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Які терапевтичні вправи допомагають поліпшити роботу діафрагми у пацієнтів із хронічними захворюваннями органів дихання?

Питання 14Відповідь

a.

Силові вправи для м'язів черевного \\\ пресу

b.

Силові вправи для зовнішніх міжреберних м'язів

c.

Силові вправи для м'язів грудної клітки

d.

Силові вправи для м'язів спини

e.

Силові вправи для інспіраторних \\\ дихальних м'язів

Коментар

Правильна відповідь: + Силкові вправи для м'язів черевного \\\ пресу

Питання 15

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Яку модель ходьби потрібно використовувати на ранніх етапах реабілітації після оперативного втручання з приводу ендопротезування кульшового суглоба?

Питання 15Відповідь

a.

Чотирьохточкову модель ходьби з милицями

b.

Модель ходьби з ролатором

c.

Триточкову модель ходьби з милицями

d.

Модель ходьби з ходунками

e.

Двоточкову модель ходьби з милицями

Коментар

Правильна відповідь: + Триточкову модель ходьби з милицями

Питання 16

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Для розрахунку, регулювання і контролю інтенсивності тренувань у рамках програми кардіореабілітації використовуються:

Питання 16Відповідь

a.

Аеробні тренування на витривалість, силові тренування помірної інтенсивності

b.

Показники частоти серцевих скорочень, максимальне фізичне навантаження, показники споживання кисню, шкала Борга

c.

Заняття на велоергометрі або тредмілі, піші прогулянки, скандинавська ходьба

d.

Теренкур, аеробні та силові тренування, дихальні вправи

e.

Тривалість, частота, інтенсивність \\\ тренувать, тип вправ

Коментар

Правильна відповідь: + Показники частоти серцевих скорочень, максимальне фізичне навантаження, показники споживання кисню, шкала Борга

Питання 17

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

На скільки градусів має бути виконана абдукція плечового суглоба, для розтягування міжреберних м'язів?

Питання 17Відповідь

a.

30--60°

b.

90--120°

c.

120--150°

d.

60--90°

e.

150--170°

Коментар

Правильна відповідь: + 90--120°

Питання 18

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Оберіть, що з нижченаведеного відноситься до теплолікувальних чинників.

Питання 18Відповідь

a.

Пелоїди, торф, глина, бальнеотерапія, парафін

b.

Пелоїди, глина, пісок, парафін, озокерит

c.

Грязі, торф, глина, вода, парафін

d.

Грязі, торф, глина, гідротерапія, парафін, озокерит

e.

Пелоїди, глина, баротерапія, парафін, озокерит

Коментар

Правильна відповідь: + Пелоїди, глина, пісок, парафін, озокерит

Питання 19

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Скільки електрокардіографічних відведень найчастіше використовують у клінічній практиці під час виконання ЕКГ?

Питання 19Відповідь

a.

9

b.

12

c.

6

d.

10

e.

3

Коментар

Правильна відповідь: + 12

Питання 20

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

До якого виду вправ відноситься <<напівприсід на балансувальній платформі>>?

Питання 20Відповідь

a.

Вправи на витривалість

b.

Вправи для розвитку динамічної рівноваги

c.

Вправи для розслаблення

d.

Вправи на гнучкість

e.

Вправи для розвитку статичної рівноваги

Коментар

Правильна відповідь: + Вправи для розвитку статичної рівноваги

Питання 21

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Які з нижченаведених фізичних вправ не можна виконувати при переломах хірургічної шийки плеча в ранній післяімобілізаційний період?

Питання 21Відповідь

a.

Полегшені вправи, які виконуються самостійно з укороченням важеля (напівзігнута рука)

b.

Рухи, які виконуються рукою в умовах звичайного навантаження (стоячи, лежачи)

c.

Полегшені рухи в плечовому суглобі

d.

Махові рухи в плечовому суглобі

e.

Вправи пасивного характеру зі сторонньою допомогою

Коментар

Правильна відповідь: + Махові рухи в плечовому суглобі

Питання 22

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт віком 62 роки перебуває на реабілітації у зв'язку з перенесеним ішемічним інсультом. Фізичний терапевт проводить втручання для корекції тіла пацієнта, оскільки наявний синдром "відштовхування" (push-синдром). Яка мета такого втручання?

Питання 22Відповідь

a.

Дотягнутися паретичною рукою до здорової ноги

b.

Дотягнутися паретичною ногою до здорової руки

c.

Дотягнутися здоровою рукою та здоровою ногою до здорового боку

d.

Дотягнутися здоровою рукою та здоровою ногою до ураженого боку

e.

Дотягнутися паретичною рукою та паретичною ногою до здорового боку

Коментар

Правильна відповідь: + Дотягнутися здоровою рукою та здоровою ногою до здорового боку

Питання 23

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

За якою шкалою проводиться оцінка індивідуального сприйняття навантаження?

Питання 23Відповідь

a.

Бреса

b.

Берса

c.

Брюса

d.

Берга

e.

Борга

Коментар

Правильна відповідь: + Борга

Питання 24

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт віком 52 роки з наслідками ЧМТ. Неврологічний статус: відсутність активних рухів у дистальних відділах лівих кінцівок, підвищений м'язовий тонус у згиначах лівого передпліччя (3 бали) та розгиначах лівої гомілки (4 бали), гіперрефлексія, порушення селективного довільного моторного контролю. Який інструментальний метод оцінки для функціональної сили м'язів нижніх кінцівок треба застосовувати в цьому разі?

Питання 24Відповідь

a.

Оцінка за тестом п'яти присідань

b.

Оцінка сили м'язів за шкалою Лаветта

c.

Моторний контроль вертикалізації

d.

Оцінка сили м'язів (нижня проба Баре)

e.

Оцінка сили м'язів (нижня проба Менгацціні)

Коментар

Правильна відповідь: + Моторний контроль вертикалізації

Питання 25

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Який тест є важливим елементом під час підготовки до реабілітації, тому що дає можливість визначити готовність пацієнта до початку фізичних навантажень?

Питання 25Відповідь

a.

Тест балансу Берга

b.

Тест 2--хвилинної ходьби

c.

Чотирьохетапний тест балансу

d.

Тест 4-х квадратів

e.

Функціональний тест м'язів стегна

Коментар

Правильна відповідь: + Тест 2-хвилинної ходьби

Питання 26

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Фізіологічними передумовами для тестування загальної фізичної працездатності є зв'язок з:

Питання 26Відповідь

a.

Комплексом антропометричних показників

b.

Механізмами компенсаторних пристосувань

c.

Потужністю м'язів

d.

Аеробними можливостями організму, продуктивністю системи транспортування кисню

e.

Реакціями адаптації організму

Коментар

Правильна відповідь: + Аеробними можливостями організму, продуктивністю системи транспортування кисню

Питання 27

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Недостатня секреція якого гормону в дитячому віці, викликає затримку росту та непропорційний розвиток?

Питання 27Відповідь

a.

Паратгормону

b.

Трийодтіроніну

c.

Інсуліну

d.

Соматотропіну

e.

Прогестерону

Коментар

Правильна відповідь: + Соматотропіну

Питання 28

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Жінці віком 38 років діагностовано безпліддя та спайки органів малого таза.

Після обстеження у лікаря-гінеколога їй рекомендовано санаторно-курортне лікування. Який природний чинник використовується під час проведення процедури цій пацієнтці?

Питання 28Відповідь

a.

Парафін

b.

Нагрітий пісок

c.

Глина

d.

Грязь

e.

Озокерит

Коментар

Правильна відповідь: + Грязь

Питання 29

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

На які тканинні структури діє прийом масажу -- погладжування?

Питання 29Виберіть одну відповідь:

A.

Епідерміс, власне шкіра

B.

Суглоб, фасції

C.

Сухожилля

D.

М'язовий шар

E.

Підшкірна основа

Коментар

Правильна відповідь: + Епідерміс, власне шкіра

Питання 30

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Розрахуйте тренувальну частоту серцевих скорочень за формулою

Карвонена, враховуючи, що частота серцевих скорочень у стані спокою

становить 80/хв, максимальна частота серцевих скорочень --- 140/хв,

заплановане використання резервної частоти серцевих скорочень --- 50%.

Питання 30Відповідь

a.

117/хв

b.

120/хв

c.

110/хв

d.

100/хв

e.

95/хв

Коментар

Правильна відповідь: + 110/хв

Питання 31

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на те, що у нього <<перекосило>> обличчя. Він помітив, що не може утримувати воду в роті, надути щоку, втратив смак. Захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно встановлено: очна щілина зліва розширена, око не заплющується, пацієнт не може наморщити лоба, складки на лобі не утворюються, лівий кут рота опущений, слюзотеча з очей, надбрівний рефлекс зліва не викликається, чутливість не порушена. Який нерв найімовірніше уражений у пацієнта?

Питання 31Відповідь

a.

Під'язиковий

b.

Окоруховий

c.

Трійчастий

d.

Язикоглотковий

e.

Лицьовий

Коментар

Правильна відповідь: + Лицьовий

Питання 32

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Визначте проблему, яка є причиною зміни альвеолярної вентиляції у пацієнта з обструктивним бронхітом.

Питання 32Відповідь

a.

Набряк слизової бронхів, наявність запального мокротиння у бронхах

b.

Напад задухи внаслідок бронхоспазму, набряку слизової бронхів, гіперсекреції бронхів

c.

Бронхоспазм, набряк легень, гіперсекреція бронхів

d.

Бронхоспазм, набряк слизової бронхів, гіперсекреція бронхів

e.

Бронхоспазм, наявність запального мокротиння у бронхах

Коментар

Правильна відповідь: + Бронхоспазм, набряк слизової бронхів, гіперсекреція бронхів

Питання 33

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час дослідження чутливості пацієнт сидить у зручному положенні, очі закриті. Терапевт використовує гумку на олівці для сильного натискання на невелику ділянку шкіри. Тиск має бути досить сильним, щоб вдавнити шкіру. Який вид чутливості досліджується у пацієнта?

Питання 33Виберіть одну відповідь:

A.

Глибокий

B.

Поверхневий

C.

Пропріорецепцію

D.

Кінестезію

E.

Больовий

Коментар

Правильна відповідь: + Глибокий

Питання 34

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка віком 42 роки звернулася до фізичного терапевта з проханням призначити візок. Із анамнезу відомо, що пацієнтка 3 роки тому травмувала хребет на рівні L2-L3 під час автодорожньої пригоди. Об'єктивно

спостерігається: зріст пацієнтки - 165 см, вага - 68 кг, міжвертельний розмір - 63 см, довжина верхньої кінцівки - 65 см, довжина нижньої кінцівки від підлоги до лобкового симфізу - 87 см, довжина до вертлюга стегнової кістки - 91 см, довжина стегна до краю сідниці - 40 см, довжина гомілки - 30 см.

Надайте рекомендації для виготовлення довжини сидіння візка.

Питання 34Відповідь

- a.
42 см
- b.
40 см
- c.
30 см
- d.
45 см
- e.
38 см

Коментар

Правильна відповідь: + 42 см

Питання 35

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Яку мету відповідно до принципу SMART можна вважати короткотривалою для пацієнта зі спинномозковою травмою в гострому реабілітаційному періоді?

Питання 35Відповідь

- a.
Досягнення повної незалежності в догляді за сечовим міхуром і кишечником
- b.
Самостійна купівля пляшки води
- c.
Участь у місцевому адаптивному спортивному заході
- d.
Регулярна участь у громадських заходах
- e.

Опанування техніки переміщення з ліжка на візок і навпаки

Коментар

Правильна відповідь: + Опанування техніки переміщення з ліжка на візок і навпаки

Питання 36

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Що з нижченаведеного є зайвим у класифікації вправ?

Питання 36Відповідь

a.

Спортивно-прикладні

b.

Ігрові (ігри)

c.

Оздоровчі вправи

d.

Дихальні

e.

Гімнастичні

Коментар

Правильна відповідь: + Оздоровчі вправи

Питання 37

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Який інструмент оцінювання доречно використати для оперативного контролю за рівнем задишки у пацієнта з ХОЗЛ під час заняття з фізичної терапії?

Питання 37Відповідь

a.

Діаграма вартості кисню (OCD)

b.

Модифікована шкала Медичної дослідницької ради (mMRC)

c.

Вихідний індекс задишки (BDI)

d.

Динамічний індекс задишки (TDI)

е.

Шкала задишки Борга (BORG scale)

Коментар

Правильна відповідь: + Шкала задишки Борга (BORG scale)

Питання 38

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Вкажіть ускладнення, що часто виникають у лежачих пацієнтів, які перебувають у такому стані понад три тижні.

Питання 38Відповідь

а.

Біль у суглобах, остеопороз, судоми, непрохідність кишечника

б.

Остеопороз, судоми, пролежні, зниження сили м'язів

с.

Біль у суглобах, спазмування шлунку, ателектази, контрактури

д.

е.

Пневмонії, пролежні, тромбоемболії, зниження сили м'язів

Коментар

Правильна відповідь: + Пневмонії, пролежні, тромбоемболії, зниження сили м'язів

Питання 39

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Фізичний терапевт оцінює силу трапецієподібного м'яза. Пацієнт, у положенні сидячи, самостійно піднімає плечі вгору з максимальною амплітудою, але не може виконати рух, якщо фізичний терапевт чинить невеликий опір руховій дії. Визначте максимальний бал за ММТ.

Питання 39Відповідь

а.

3

б.

4

c.

2

d.

1

e.

5

Коментар

Правильна відповідь: + 3

Питання 40

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Укажіть найбільш важливий аспект під час здійснення практичної діяльності мультидисциплінарної команди (МДК) та один із основних компонентів мультидисциплінарного підходу.

Питання 40Відповідь

a.

Формулювання клініко-реабілітаційного діагнозу

b.

Створення реабілітаційного плану

c.

Дотримання принципів деонтології

d.

Залучення до постановки цілей пацієнта чи опікунів

e.

Спільна постановка командних цілей реабілітації

Коментар

Правильна відповідь: + Спільна постановка командних цілей реабілітації

Питання 41

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Які преформовані засоби (методи) належать до 2 групи лікування електричним струмом низької напруги?

Питання 41Виберіть одну відповідь:

A.

Гальванізація, медикаментозний електрофорез, електроміостимуляція, діадинамотерапія, мікрохвильова терапія, електросон

B.

Гальванізація, медикаментозний електрофорез, електроміостимуляція, індуктотермія, ампліпульстерапія, електросон

C.

Гальванізація, медикаментозний електрофорез, електроміостимуляція, діадинамотерапія, ампліпульстерапія, електросон

D.

Гальванізація, медикаментозний електрофорез, електроміостимуляція, діадинамотерапія, ампліпульстерапія, УВЧ-терапія

E.

Гальванізація, медикаментозний електрофорез, електроміостимуляція, діадинамотерапія, ампліпульстерапія, магнітотерапія

Коментар

Правильна відповідь: + Гальванізація, медикаментозний електрофорез, електроміостимуляція, діадинамотерапія, ампліпульстерапія, електросон

Питання 42

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Вкажіть протипоказання до призначення заходів фізичної терапії при патології печінки та жовчовивідних шляхів.

Питання 42Відповідь

a.

Постхолецистектомічний синдром

b.

Хронічний безкам'яний холецистит

c.

Хронічний холангіт

d.

Дискінезія жовчовивідних шляхів

e.

Гострий гепатит

Коментар

Правильна відповідь: + Гострий гепатит

Питання 43

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У спортсмена спостерігається пошкодження м'язів, спричинене фізичним навантаженням (EIMD). Який метод доцільно застосувати в практичній діяльності, заснований на доказах?

Питання 43Відповідь

a.

Термотерапію

b.

Кріотерапію

c.

Електрофорез

d.

Постізометричну релаксацію

e.

Тейпування

Коментар

Правильна відповідь: + Кріотерапію

Питання 44

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

За яких умов під час фізичного навантаження спостерігається міогенний еритроцитоз?

Питання 44Відповідь

a.

Під час короткочасної роботи малої \\\ інтенсивності

b.

Під час тривалого аеробного навантаження

c.

Під час короткочасної інтенсивної \\\ роботи

d.

Під час короткочасного помірного \\\ навантаження

e.

Під час тривалої інтенсивної роботи

Коментар

Правильна відповідь: + Під час короткочасної інтенсивної \\\ роботи

Питання 45

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Спортсмен після загострення остеоартрозу колінного суглоба отримав рекомендації фізичного терапевта щодо розвитку кардіореспіраторної витривалості. Фізичний терапевт рекомендував тренування за допомогою аеробних вправ від 20 до 30 хв зі збільшенням інтенсивності до діапазону 60-85% максимального ЧСС. На якій стадії розвитку кардіореспіраторної витривалості перебуває спортсмен?

Питання 45Відповідь

a.

Вдосконалення

b.

Відновлення

c.

Підтримання

d.

Початковій

e.

Впрацювання

Коментар

Правильна відповідь: + Вдосконалення

Питання 46

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Скільки резерву частоти серцевих скорочень використовують вправи середньої інтенсивності?

Питання 46Відповідь

a.

Від 40% до 60%

b.

Від 60% до 80%

с.

Від 20% до 40%

d.

Від 40% до 80%

е.

Від 20% до 60%

Коментар

Правильна відповідь: + Від 40% до 60%

Питання 47

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

При якому типі порушення постави спостерігається гіперлордоз поперекового відділу?

Питання 47Відповідь

a.

Сутула спина

b.

Плоска спина

с.

Кругло-увігнута спина

d.

Кіфосколиоз

е.

Сколиотична постава

Коментар

Правильна відповідь: + Кругло-увігнута спина

Питання 48

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту після ГПМК треба обстежити ризик падіння. Який тест буде оптимальним для використання, якщо у доступі є коридор довжиною 5 метрів?

Питання 48Відповідь

a.

Тест 20 присідань

b.

Динамічний індекс ходи

c.

Тест <<Встань та йди>>

d.

6-хвилинний тест ходи

e.

Тест Френчай

Коментар

Правильна відповідь: + Тест <<Встань та йди>>

Питання 49

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

До молодого фізичного терапевта звернувся чоловік віком 26 років зі скаргами на ушкодження правого коліна. У процесі опитування фізичний терапевт сформулював 2 ймовірні гіпотези порушення рухливості в колінному суглобі. Одна з них: порушення цілісності передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Який діагностичний тест має більшу чутливість і специфічність, ніж інші, для підтвердження або спростування цієї гіпотези?

Питання 49Відповідь

a.

Задньої висувної шухляди

b.

Лахмана

c.

Передньої висувної шухляди

d.

Еплі

e.

Мак-Мюррея

Коментар

Правильна відповідь: + Лахмана

Питання 50

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У чому полягає одна з ролей фізичного терапевта в нейрореабілітації військовослужбовців із легкою ЧМТ?

Питання 50Відповідь

a.

Пояснення щодо адаптації нервової системи та її потреби в дозованому навантаженні для полегшення процесу одужання

b.

Надання психоемоційної підтримки та психологічного супроводу

c.

Пояснення щодо особливостей тренування загальної фізичної підготовки та інтеграція в спорт вищих досягнень

d.

Пояснення щодо медикаментів і важливості медикаментозної підтримки

e.

Пояснення важливості силових тренувань через біль і втому для вдосконалення фізичних функцій

Коментар

Правильна відповідь: + Пояснення щодо адаптації нервової системи та її потреби в дозованому навантаженні для полегшення процесу одужання

Питання 51

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту з діагнозом: 4 ст. хронічного панкреатиту (ХП), необхідно обстежити функціональну силу м'язів нижніх кінцівок. Який тест буде оптимальним для використання, якщо у доступі є стілець зі спинкою та секундомір?

Питання 51Відповідь

a.

Тіннеті

b.

Встань та йди

c.

Мотрісіті

d.

Берга

е.

П'яти присідань

Коментар

Правильна відповідь: + П'яти присідань

Питання 52

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Синдром неглекту характерний для осіб із гострим порушенням мозкового кровообігу. У якій частці кори головного мозку локалізована зона ураження?

Питання 52Відповідь

a.

У скроневій

b.

У тім'яній

c.

У лобовій

d.

У мозочку

е.

У потиличній

Коментар

Правильна відповідь: + У тім'яній

Питання 53

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Чоловіку віком 54 роки встановлено діагноз: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, III ФК. Проходить постстаціонарну фізичну терапію в кардіологічному санаторії. Йому показані аеробні фізичні навантаження. Яку форму і дозу аеробного навантаження має призначити фізичний терапевт, відповідно до функціонального класу, на початку проведення санаторного курсу кардіореабілітації?

Питання 53Відповідь

а.

Дозована ходьба в помірному темпі (110 кроків/хв.) з короткочасним прискоренням по 3--5 хв. в темпі 120--30 кроків/хв.

б.

Дозована ходьба в середньому темпі (90 кроків/хв.)

с.

Дозована ходьба в повільному темпі (70--80 кроків/хв.) із зупинками через кожні 100--200 м

д.

Біг в помірному темпі

е.

Дозована ходьба в темпі 90--100 кроків/хв. з короткочасним прискоренням по 2--3 хв. в темпі 120--30 кроків/хв.

Коментар

Правильна відповідь: + Дозована ходьба в середньому темпі (90 кроків/хв.)

Питання 54

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Якими основними методами визначаються показники зовнішнього дихання?

Питання 54Відповідь

а.

Пневмографією, пікфлоуметрією

б.

Спірометрією, спірографією

с.

Спірографією, пікфлоуметрією

д.

Спірометрією, пневмографією

е.

Статографією, пікфлоуметрією

Коментар

Правильна відповідь: + Спірометрією, спірографією

Питання 55

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Визначте інтенсивність планованого кардіонавантаження (робочий пульс) для чоловіка віком 65 років.

Питання 55Відповідь

a.

145--155/хв.

b.

100--110/хв.

c.

116--124/хв.

d.

125--135/хв.

e.

130--140/хв.

Коментар

Правильна відповідь: + 116--124/хв.

Питання 56

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Яку тактику необхідно використати для лікування пацієнта з правобічним спастичним геміпарезом зі збереженими селективними рухами пальців і кисті, щоб уникнути "навченого невикористання" верхньої кінцівки?

Питання 56Відповідь

a.

Кінезіотерапія, вправи на амплітуду руху

b.

Обмеження неушкодженої руки та посилення тренування/використання ураженої руки

c.

Вправи на силу та координацію м'язів ураженої кінцівки

d.

Посилення тренування/використання ураженої руки

e.

Розвиток координаторних якостей верхньої кінцівки

Коментар

Правильна відповідь: + Обмеження неушкодженої руки та посилення

тренування/використання ураженої руки

Питання 57

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час тестування фізичним терапевтом 80-річного чоловіка, виявлено, що пацієнту складно сконцентруватися та зрозуміти поточну ситуацію, є проблеми з пам'яттю та іншими когнітивними здібностями. Для якого захворювання характерні такі клінічні показники?

Питання 57Відповідь

a.

Гостре порушення мозкового кровообігу

b.

Деменція

c.

Хвороба Паркінсона

d.

Деадаптація

e.

Депривація

Коментар

Правильна відповідь: + Деменція

Питання 58

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Для якої патології ефекторно-вольової сфери характерні такі симптоми: повна відсутність активних рухів кінцівки або кінцівок, збільшення м'язового тону, гіперрефлексія, синкінезія, позитивні патологічні рефлекси, збережена трофіка м'язів?

Питання 58Відповідь

a.

Центрального мотонейрона

b.

Хореатичного синдрому

c.

Палеоцеребрального синдрому

d.

Периферійного мотонейрона

e.

Неоцеребрального синдрому

Коментар

Правильна відповідь: + Центрального мотонейрона

Питання 59

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Які зміни дихальних шумів можна виявити у пацієнта з плевральним випотом під час аускультції легень?

Питання 59Відповідь

a.

Бронхіальне дихання

b.

Сухі хрипи

c.

Крепітацію

d.

Відсутність дихальних шумів

e.

Вологі хрипи

Коментар

Правильна відповідь: + Відсутність дихальних шумів

Питання 60

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Який критерій є кращим для прогнозування потенціалу навчальної спроможності пацієнтів із черепно-мозковою травмою?

Питання 60Відповідь

a.

Тривалість втрати свідомості пацієнта після отримання травми

b.

Тривалість надання реабілітаційних заходів

c.

Тривалість після травматичної амнезії

d.

Тривалість афазії

e.

Тривалість перебування пацієнта в комі

Коментар

Правильна відповідь: + Тривалість після травматичної амнезії

Питання 61

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Виконання фізичних вправ при клімактеричному синдромі сприяє:

Питання 61Відповідь

a.

Зменшенню психогенних симптомів

b.

Зменшенню вазомоторних симптомів

c.

Покращенню сну і сексуальної функції

d.

Зменшенню гінекологічних симптомів

e.

Покращенню якості життя, когнітивних і фізичних функцій

Коментар

Правильна відповідь: + Покращенню якості життя, когнітивних і фізичних функцій

Питання 62

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я розглядає:

Питання 62Виберіть одну відповідь:

A.

Не саму хворобу, а функціональні розлади і обмеження життєдіяльності, пов'язані з хворобою або перенесеною травмою

B.

C.

Зміни здоров'я (хвороба, розлад, травма, тощо) з точки зору етіології, патогенезу, клінічних симптомів, основних принципів лікування

D.

Хворобу та дозволяє підібрати вправи і вид активності, який підходить даному пацієнтові

E.

Юридичні основи для захисту та підтримки пацієнтів із різними захворюваннями

Коментар

Правильна відповідь: + Не саму хворобу, а функціональні розлади і обмеження життєдіяльності, пов'язані з хворобою або перенесеною травмою

Питання 63

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт віком 65 років має лівобічне ураження довгастого мозку внаслідок перенесеного ішемічного інсульту. Період від початку захворювання --- 3 дні.

Під час обстеження виявлено: невиразне і <<змазане>> мовлення, в'ялий параліч жувальних і мимічних м'язів, рухові та чутливі розлади з правої сторони тіла. Який вид дизартрії визначив фізичний терапевт у пацієнта?

Питання 63Відповідь

a.

Бульбарна

b.

Псевдобульбарна

c.

Мозочкова

d.

Кіркова

e.

Екстрапірамідна

Коментар

Правильна відповідь: + Бульбарна

Питання 64

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Яке основне завдання фізичної терапії у період загострення хронічного холециститу у пацієнта?

Питання 64Відповідь

a.

Зменшення запального процесу у \ жовчному міхурі

b.

Покращення обміну речовин

c.

Покращення функції жовчного міхура

d.

Зменшення температури тіла

e.

Зменшення дискінетичних розладів \ жовчовивідної системи

Коментар

Правильна відповідь: + Зменшення запального процесу у \ жовчному міхурі

Питання 65

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

З якою метою застосовують валик під стегна та нижню частину живота виконуючи позиціонування лежачи на животі?

Питання 65Відповідь

a.

Для збільшення черевного тиску

b.

Для зменшення черевного тиску

c.

Для усунення лордозу поперекового відділу хребта

d.

Для тренування м'язів живота

e.

Для зменшення напруження м'язів плечового пояса та ротаторів

Коментар

Правильна відповідь: + Для зменшення черевного тиску

Питання 66

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка віком 32 роки госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії з діагнозом: гостре порушення мозкового кровобігу. Пацієнт знаходиться у нестабільному стані. Коли фізичний терапевт має розпочати реабілітаційні заходи з цим пацієнтом?

Питання 66Відповідь

a.

Після переводу пацієнта до палати \\\ стаціонару

b.

Відразу після госпіталізації

c.

Після стабілізації стану пацієнта у \\\ відділенні інтенсивної терапії

d.

У відділенні інтенсивної терапії через 7 днів

e.

Після виписки пацієнта у реабілітаційний центр або відділення

Коментар

Правильна відповідь: + Після стабілізації стану пацієнта у \\\ відділенні інтенсивної терапії

Питання 67

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Який вид масажу виконується на окісті?

Питання 67Відповідь

a.

Гігієнічний

b.

Періостальний

c.

Рефлекторний

d.

Косметичний

e.

Сегментарний

Коментар

Правильна відповідь: + Періостальний

Питання 68

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Якою має бути висота ручки 4-х опірної палиці як допоміжного засобу пересування для особи із ГПМК?

Питання 68Відповідь

a.

На висоті 1/3 передпліччя

b.

На висоті середини передпліччя

c.

На висоті кінчиків пальців

d.

На висоті згину зап'ястка

e.

На висоті ліктя

Коментар

Правильна відповідь: + На висоті згину зап'ястка

Питання 69

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Гідротерапевтичні процедури при порушенні функцій метаболізму та ендокринної системи --- це:

Питання 69Виберіть одну відповідь:

A.

Засіб тренування й загартовування організму до дії холодових подразників

B.

Засіб тренування й загартовування організму до дії високотермічних подразників

C.

Засіб тренування організму до дії холодкових та високотермічних подразників

D.

Засіб тренування й загартовування організму до дії холодкових та високотермічних подразників

E.

Засіб загартовування організму до дії холодкових та високотермічних подразників

Коментар

Правильна відповідь: + Засіб тренування й загартовування організму до дії холодкових та високотермічних подразників

Питання 70

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

З віком у людини знижується секреція статевих гормонів і гормону роста. Рівень кортизону, інсуліну, гормонів епіфізу та щитоподібної залози зазвичай не змінюється з віком. Рівень норадреналіну і паратиреоїдного гормону може підвищуватись в геронтологічному віці. Для якого процесу морфологічних змін в організмі людини це характерно?

Питання 70Відповідь

a.

Гетерохронності

b.

Гетерокінетичності

c.

Гетерокафтенності

d.

Гетеротопності

e.

Гетерогенності

Коментар

Правильна відповідь: + Гетерокафтенності

Питання 71

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Фізичну працездатність пацієнтів хворих на бронхіальну астму оцінюють шляхом індивідуальної можливості витримувати фізичне навантаження методом:

Питання 71Відповідь

a.

Купера

b.

Спірометрії

c.

Велоергометрії

d.

Стрельникової

e.

Спірографії

Коментар

Правильна відповідь: + Велоергометрії

Питання 72

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У військовослужбовця з легкою ЧМТ спостерігається порушення під час одночасного виконання двох дій. Які завдання має рекомендувати фізичний терапевт у цьому разі?

Питання 72Відповідь

a.

У дедалі складніших умовах

b.

Силового навантаження

c.

На виконання великої кількості повторень

d.

Поділені на підзавдання, для кращого усвідомлення виконання

e.

На швидкість виконання

Коментар

Правильна відповідь: + У дедалі складніших умовах

Питання 73

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт віком 75 років знаходиться на стаціонарному лікуванні перший день. Діагноз: виразкова хвороба шлунка, період загострення. Призначено фізичну терапію. Укажіть, які вправи не рекомендовані пацієнту.

Питання 73Відповідь

a.

Ідіомоторні

b.

Дихальні вправи

c.

Динамічні для дистальних відділів

d.

Статичні для середніх груп м'язів

e.

Для м'язів передньої черевної стінки

Коментар

Правильна відповідь: + Для м'язів передньої черевної стінки

Питання 74

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

З якою метою виконуються пасивні вправи на розтяг м'язів у пацієнтів із спастичністю, що викликана травмою чи захворюванням центральної нервової системи?

Питання 74Відповідь

a.

Для венозного відтоку у спазмованих м'язах

b.

Для тренування сили м'язів

c.

Для профілактики контрактур

d.

Для зменшення спастичності і тону м'язів

e.

Для формування рухових навичок

Коментар

Правильна відповідь: + Для профілактики контрактур

Питання 75

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт віком 40 років два роки тому потрапив у ДТП та отримав травму спинного мозку. Після цього у чоловіка розвинувся спастичний парепарез нижніх кінцівок. Неврологічний рівень ураження Th-8. Сила м'язів нижче рівня ураження не перевищує 1--2 бали. Присутнє крижове збереження. Визначте важкість пошкодження за шкалою ASIA)

Питання 75Відповідь

a.

C

b.

A

c.

B

d.

E

e.

D

Коментар

Правильна відповідь: + C

Питання 76

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Ви навчаєте підйому по східцях пацієнта з ГПМК. Яку ногу треба навчити його ставити першою на сходинку?

Питання 76Відповідь

a.

Протилежну тій що ставиться першою при спуску

b.

Не паретичну

c.

Немає різниці

d.

Паретичну

e.

Ту саму що і при спуску

Коментар

Правильна відповідь: + Не паретичну

Питання 77

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час обстеження у пацієнта м'язів задньої поверхні стегна за шкалою Ашворт при здійсненні швидкого пасивного згинання гомілки відзначається мінімальний опір наприкінці амплітуди руху. На що вказує така симптоматика?

Питання 77Відповідь

a.

Значне підвищення м'язового тону

b.

Незначне підвищення м'язового тону

c.

М'язову ригідність

d.

Легке підвищення м'язового тону

e.

Помірне підвищення м'язового тону

Коментар

Правильна відповідь: + Легке підвищення м'язового тону

Питання 78

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Зі скількох етапів складається програма фізичної реабілітації пацієнтів з інфарктом міокарда?

Питання 78Відповідь

a.

Дві

b.

П'ять

c.

Це єдиний безперервний процес

d.

Три

e.

Одна

Коментар

Правильна відповідь: + Три

Питання 79

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час проведення спеціальних досліджень для об'єктивного визначення м'язової сили опорно-рухового апарату використовують:

Питання 79Відповідь

a.

Магнітно-резонансну томографію

b.

Ультразвукову діагностику

c.

Рентгенографію

d.

Динамометр

e.

Комп'ютерну томографію

Коментар

Правильна відповідь: + Динамометр

Питання 80

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 4 дні тому розвинувся ішемічний інсульт із вираженою дисфагією, лівобічний геміпарез. Яка позиція пацієнта під час позиціонування в ліжку провокує аспіраційну пневмонію?

Питання 80Відповідь

a.

Лежачи на лівому боці

b.

Сидячи з опущеними вниз ногами

c.

Лежачи на правому боці

d.

Лежачи на спині

e.

Положення Фаулера

Коментар

Правильна відповідь: + Лежачи на спині

Питання 81

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Одним із методів оперативного контролю фізичної терапії у довготривалому періоді реабілітації у пацієнтів з COVID-19 та реконвалесцентів є показник сатурації. Вкажіть абсолютний мінімум рівня сатурації, при якому припиняються терапевтичні вправи.

Питання 81Відповідь

a.

b.

У спокої 90%, під час фізичних навантажень абсолютний мінімум --- 80%

c.

У спокої 90%, під час фізичних навантажень абсолютний мінімум --- 85%

d.

У спокої 95%, під час фізичних навантажень абсолютний мінімум --- 85%

e.

У спокої 95%, під час фізичних навантажень абсолютний мінімум --- 80%

Коментар

Правильна відповідь: + У спокої 90%, під час фізичних навантажень абсолютний мінімум --- 85%

Питання 82

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

На якому рівні ураження спинного мозку пацієнти з хребетно-спинномозковою травмою, потребуватимуть використання ортезів UFO для забезпечення функції ходи?

Питання 82Відповідь

a.

L2--3

b.

L5--S2

c.

L4--S1

d.

S2--4

e.

L1--2

Коментар

Правильна відповідь: + L4--S1

Питання 83

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Яка із нижченаведених реакцій серцево-судинної системи є нормальною під час виконання аеробного навантаження пацієнтом, який раніше переніс інфаркт міокарда?

Питання 83Відповідь

a.

Зниження діастолічного артеріального тиску при зростанні систолічного тиску

b.

Підвищення діастолічного артеріального тиску при незмінному систолічному

тиску

c.

Зниження діастолічного і систолічного, і артеріального тиску

d.

Зниження систолічного артеріального тиску при незмінній частоті серцевих скорочень

e.

Зростання частоти серцевих скорочень при незмінному тиску

Коментар

Правильна відповідь: + Зниження діастолічного артеріального тиску при зростанні систолічного тиску

Питання 84

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Короткострокове планування програми фізичної терапії зосереджують на SMART цілях, які дозволяють:

Питання 84Відповідь

a.

Комплексно вирішити проблему пацієнта

b.

Вирішити досяжне завдання протягом двох тижнів

c.

У повному об'ємі досягнути мети реабілітації

d.

Вирішити відповідне завдання протягом двох місяців

e.

Якогомога швидше вирішити конкретну проблему пацієнта

Коментар

Правильна відповідь: + Вирішити досяжне завдання протягом двох тижнів

Питання 85

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Яку із нижченаведених функцій не виконує шкіра?

Питання 85Відповідь

a.

Терморегуляторну

b.

Екскреторну

c.

Захисну

d.

Дихальну

e.

Синтезу вітаміна D

Коментар

Правильна відповідь: + Дихальну

Питання 86

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Дитина з цією формою ДЦП має несвідомі, неконтрольовані, повторювані, іноді стереотипні рухи уражених частин тіла. Також ця форма характеризується патологічним зразком положення та/або руху. Вкажіть форму ДЦП.

Питання 86Відповідь

a.

Спастична диплегія

b.

Спастичний тетрапарез

c.

Атаксія

d.

Дискінетична форма

e.

Спастичний геміпарез

Коментар

Правильна відповідь: + Дискінетична форма

Питання 87

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У п'ятирічного хлопчика, розумово збереженого, ДЦП проявляється нерегулярними спонтанними швидкими змінами --- скорочення-розслаблення м'язів рук і ніг, мімічних м'язів обличчя, на тлі загального зниженого м'язового тону. Коли дитина хвилюється, рухи рук і голови посилюються. У хлопчика також є порушення артикуляції і темпу мовлення. Про яку форму ДЦП свідчать такі клінічні показники?

Питання 87Відповідь

a.

Гіперкінетичну форму

b.

Змішану форму

c.

Атонічно-астатичну форму Ферстера

d.

Спастичну диплегію

e.

Спастичну геміплегію

Коментар

Правильна відповідь: + Гіперкінетичну форму

Питання 88

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Яке основне завдання фізичної терапії у період загострення хронічного холециститу у пацієнта?

Питання 88Відповідь

a.

Зменшення дискінетичних розладів \ жовчовивідної системи

b.

Зменшення запального процесу у \ жовчному міхурі

c.

Покращення обміну речовин

d.

Зменшення температури тіла

e.

Покращення функції жовчного міхура

Коментар

Правильна відповідь: + Зменшення запального процесу у \ жовчному міхурі

Питання 89

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка віком 27 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом: гостра лівобічна нижньодольова пневмонія. Вкажіть положення тіла, яке необхідно прийняти пацієнтці, під час виконання статичного постурального дренажу.

Питання 89Відповідь

a.

Сидячи, трохи нахилитися вперед і вправо

b.

Лежачи на лівому боці, з валиком під тазом і під нижньою частиною грудної клітки, частина ліжка з боку ніг піднята на 30--40 см

c.

Лежачи на лівому боці, частина ліжка з боку голови піднята на 30 см

d.

Лежачи на правому боці, з валиком під тазом і під нижньою частиною грудної клітки, частина ліжка з боку ніг піднята на 30--40 см

e.

Лежачи на правому боці, частина ліжка з боку голови піднята на 30 см

Коментар

Правильна відповідь: + Лежачи на правому боці, з валиком під тазом і під нижньою частиною грудної клітки, частина ліжка з боку ніг піднята на 30--40 см

Питання 90

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Вкажіть оптимальний термін для досягнення однієї короткотривалої функціональної цілі під час реабілітації пацієнта в стаціонарі.

Питання 90Відповідь

a.

5--7 днів

b.

10--12 днів

c.

14--21 день

d.

12--14 днів

e.

7--10 днів

Коментар

Правильна відповідь: + 5--7 днів

Питання 91

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час тестування у вихідному положенні пацієнта лежачи на спині фізичний терапевт зігнув ліву нижню кінцівку пацієнта у кульшовому суглобі під кутом 45° і в колінному суглобі під кутом 90° . Присівши на ступню лівої нижньої кінцівки, фізичний терапевт захопив ліву гомілку пацієнта за верхню третину, потягнув на себе і встановив зміщення гомілки вперед у колінному суглобі на 7 мм. Яка структура, найімовірніше, пошкоджена у пацієнта в цьому разі?

Питання 91Відповідь

a.

Медіальна колатеральна зв'язка

b.

Задня хрестоподібна зв'язка

c.

Латеральний меніск

d.

Медіальний меніск

e.

Передня хрестоподібна зв'язка

Коментар

Правильна відповідь: + Передня хрестоподібна зв'язка

Питання 92

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Висота паралельних брусів для тренування ходи має бути відрегульована так, щоб пацієнт, стоячи між перекладинами, міг охопити їх пальцями, зігнувши руки в ліктьових суглобах на:

Питання 92Відповідь

a.

0--5°

b.

15--25°

c.

5--10°

d.

30--40°

e.

40--50°

Коментар

Правильна відповідь: + 15--25°

Питання 93

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Вживання яких продуктів треба обмежити для раціонального харчування пацієнтів із діагнозом подагра?

Питання 93Виберіть одну відповідь:

A.

Рослинних жирів

B.

Тваринних білків і продуктів, багатих пуринами

C.

Вітамінів

D.

Рідини

E.

Молочних продуктів

Коментар

Правильна відповідь: + Тваринних білків і продуктів, багатих пуринами

Питання 94

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

За яким тестом оцінюють здатність пацієнта до взаємодії з фізичним терапевтом?

Питання 94Відповідь

a.

Тест 9 отворів

b.

Шкала інсульту Національного Інституту Здоров'я (NIHSS)

c.

Шкала Берга

d.

Короткий тест для оцінки когнітивних функцій (MMSE)

e.

Тест 6-хвилинної ходьби

Коментар

Правильна відповідь: + Короткий тест для оцінки когнітивних функцій (MMSE)

Питання 95

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час формулювання реабілітаційного діагнозу фізичний терапевт обрав код b715 Функції стабільності суглоба. Що виключає цей код?

Питання 95Відповідь

a.

Порушення при вивиху суглоба

b.

Загальна стабільність суглобів

c.

Функції рухливості суглоба

d.

Функції стабільності декількох суглобів

e.

Порушення при нестабільному плечовому суглобі

Коментар

Правильна відповідь: + Функції рухливості суглоба

Питання 96

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час виписки пацієнта з реабілітаційного неврологічного відділення його результати оцінювання рівноваги за шкалою балансу Берга --- 38 балів. Які рекомендації доцільно надати пацієнту щодо безпечного самостійного пересування?

Питання 96Відповідь

a.

Переміщення на візку

b.

Ходьба без допоміжних засобів пересування та допомоги іншої особи

c.

Ходьба під контролем іншої особи

d.

Ходьба з опорою на допоміжні засоби або з підтримкою іншої особи

e.

Ходьба без допоміжних засобів лише по рівній поверхні

Коментар

Правильна відповідь: + Ходьба з опорою на допоміжні засоби або з підтримкою іншої особи

Питання 97

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт після перенесеної ЧМТ перебуває на післягострому етапі реабілітації. За результатами обстежень пацієнта констатовано п'ятий рівень за когнітивною шкалою Ранчо Лос Амігос та 40 балів за індексом Бартел. Який подальший реабілітаційний маршрут пацієнта згідно з отриманими результатами обстеження та критеріями направлення для надання реабілітаційної допомоги?

Питання 97Відповідь

a.

Телереабілітація в домашніх умовах

b.

Реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах

c.

Реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах

d.

Медсестринський догляд у відділенні неврології

e.

Паліативна допомога в умовах хоспісу

Коментар

Правильна відповідь: + Реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах

Питання 98

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час обстеження пацієнта виявлено: місяцеподібне обличчя, живіт збільшений в об'ємі, рожеві стрії на животі та стегнах. Скаржиться на сухість у роті, спрагу, головний біль, часте сечовиділення, особливо вночі, судоми в гомілкях під час ходьби. Для патології якої системи характерні такі клінічні показники?

Питання 98Відповідь

a.

Нервової системи

b.

Скелетно-м'язової

c.

Ендокринної системи

d.

Серцево-судинної системи

e.

Дихальної системи

Коментар

Правильна відповідь: + Ендокринної системи

Питання 99

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Вкажіть, яку реабілітацію рекомендовано пацієнтам після стабільно-функціонального остеосинтезу перелому шийки стегнової кістки.

Питання 99Відповідь

a.

Створити спокій для кінцівки протягом місяця на ортопедичній шині, але активні рухи у колінному суглобі проводити з 4-го дня після операції

b.

Терапевтичні вправи з 2-го дня після операції, ходьба на милицях з 5--6-го дня

c.

Суворий постільний режим протягом 2-х тижнів

d.

Пасивні рухи у колінному і кульшовому суглобах з 4-го дня після операції

e.

Щадити кульшовий і колінний суглоби, але активно застосовувати рухи здоровою ногою

Коментар

Правильна відповідь: + Терапевтичні вправи з 2-го дня після операції, ходьба на милицях з 5--6-го дня

Питання 100

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Яка основна мета застосування методів фізичної терапії при хронічних запальних гінекологічних захворюваннях?

Питання 100Відповідь

a.

Поліпшення психоемоційного стану

b.

Ліквідація порушень менструального \ цикл

c.

Ліквідація залишкових явищ запального процесу

d.

Підвищення загальної працездатності \ організму

e.

Покращення моторно-евакуаторної \ функції кишечника

Коментар

Правильна відповідь: + Ліквідація залишкових явищ запального процесу

Питання 101

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Як називаються м'язи, що прикріплені до волосяних фолікулів та обумовлюють появу <<гусячої шкіри>> при скороченні?

Питання 101Відповідь

a.

М'язи, що піднімають волосся

b.

Сосочки дерми

c.

Волосяна цибулина

d.

Зовнішня епітеліальна піхва кореня \ \ волосся

e.

Внутрішня епітеліальна піхва кореня \ \ волосся

Коментар

Правильна відповідь: + М'язи, що піднімають волосся

Питання 102

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У жінки, яка працює малярем-штукатуром, виявлено опущення стінок піхви II ступеня. Яка можлива причина цього захворювання?

Питання 102Відповідь

a.

Хронічний аднексит

b.

Важка фізична праця

c.

Порушення функції кишечника

d.

Ерозія шийки матки

е.

Пологова травма

Коментар

Правильна відповідь: + Важка фізична праця

Питання 103

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Коли можна застосовувати фізичні вправи пацієнтам з діагнозом: виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки?

Питання 103Відповідь

а.

Незалежно від часу прийому їжі

б.

За 1 годину після прийому їжі

с.

За 3 години після прийому їжі

д.

За 30 хвилин після прийому їжі

е.

За 1--1,5 год до прийому їжі

Коментар

Правильна відповідь: + За 1--1,5 год до прийому їжі

Питання 104

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Холтерівське моніторування полягає в тривалій реєстрації ЕКГ в умовах:

Питання 104Відповідь

а.

Під час проведення тредміл-тесту

б.

Щоденної активності пацієнта

с.

Помірного фізичного навантаження

д.

У стані спокою

е.

Інтенсивного фізичного навантаження

Коментар

Правильна відповідь: + Щоденної активності пацієнта

Питання 105

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Що є методичною особливістю виконання фізичних вправ на розвиток загальної витривалості?

Питання 105Відповідь

а.

Повторювані вправи низької інтенсивності протягом тривалого періоду часу

б.

Повторювані вправи низької інтенсивності протягом короткого періоду часу

с.

Високоінтенсивні вправи протягом \ короткого періоду часу

д.

Повторювані вправи будь-якої інтенсивності протягом тривалого періоду часу

е.

Повторювані вправи високої інтенсивності протягом тривалого періоду часу

Коментар

Правильна відповідь: + Повторювані вправи низької інтенсивності протягом тривалого періоду часу

Питання 106

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Які протипокази до призначення заходів фізичної терапії пацієнтам з патологією печінки та жовчовивідних шляхів?

Питання 106Відповідь

а.

Дискінезія жовчовивідних шляхів

б.

Гострий гепатит

c.

Хронічний холангіт

d.

Хронічний безкам'яний холецистит

e.

Постхолецистектомічний синдром

Коментар

Правильна відповідь: + Гострий гепатит

Питання 107

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Що рекомендовано для ефективного відтоку мокроти у пацієнта?

Питання 107Відповідь

a.

Положення при якому відбувається скелетне витяжіння

b.

Положення тіла для підвищення кров'яного тиску

c.

Постуральний дренаж

d.

Спеціальне положення при якому поліпшується відтік жовчі

e.

Затримки дихання

Коментар

Правильна відповідь: + Постуральний дренаж

Питання 108

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Виберіть оптимальну вправу для виведення запального мокротиння у пацієнта з пневмонією, якщо уражена права легень, медіальна поверхня.

Вихідне положення --- сидячи, ноги в сторони.

Питання 108Відповідь

a.

1--3 --- вдих; 4 --- нахил до лівої ноги, видих

b.

1--2 --- вдих; 3--4 --- поворот вліво, видих

c.

1 --- вдих; 2--4 --- ліву руку вгору, нахил вправо, видих

d.

1--2 --- вдих; 3--4 --- нахил до лівої ноги, видих

e.

1--2 --- вдих; 3--4 --- ліву руку вгору, нахил вправо, видих

Коментар

Правильна відповідь: + 1--2 --- вдих; 3--4 --- нахил до лівої ноги, видих

Питання 109

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Для ліквідації/зменшення яких контрактур треба використовувати постізометричну релаксацію (ПІР)?

Питання 109Відповідь

a.

Десмогенних

b.

Артрогенних

c.

Дерматогенних

d.

Капсулярних

e.

Міогенних

Коментар

Правильна відповідь: + Міогенних

Питання 110

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Легенева (респіраторна) реабілітація є доказовим, мультидисциплінарним та комплексним втручанням для пацієнтів із хронічними порушеннями легеневої патології. Що є показанням до її призначення?

Питання 110Відповідь

a.

Зниження життєвої ємності легень

b.

Необхідність хірургічного втручання

c.

Алергічний риніт

d.

ГРВІ

e.

Фарингіт

Коментар

Правильна відповідь: + Необхідність хірургічного втручання

Питання 111

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Який із видів нейропластичності буде найважливішим у реабілітації пацієнтів після ГПМК?

Питання 111Відповідь

a.

Генетична

b.

Стандартна

c.

Репаративна

d.

Адаптивна

e.

Еволюційна

Коментар

Правильна відповідь: + Репаративна

Питання 112

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Визначіть основний секреторний продукт зрілого фолікула.

Питання 112Відповідь

a.

Естроген

b.

Лютеїнстимулюючий гормон (ЛГ)

c.

Релаксин

d.

Фолікулстимулюючий гормон (ФСГ)

e.

Прогестерон

Коментар

Правильна відповідь: + Естроген

Питання 113

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Чоловік отримав передньо-нижній вивих плечової кістки. Після знеболення проведено вправлення вивиху. Яку фіксацію доцільно виконати пацієнту?

Питання 113Відповідь

a.

Скелетне витягнення за плечову кістку

b.

Торако-брахіальну гіпсову пов'язку

c.

Фіксацію косинкою

d.

Гіпсову лонгету від травмованого до променево-зап'ясткового суглоба

e.

Пов'язку Дезо

Коментар

Правильна відповідь: + Пов'язку Дезо

Питання 114

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Щільно укладене положення ліктьового суглоба спостерігається при:

Питання 114Відповідь

a.

Пронації та супінації в ліктьовому суглобі на 30°

b.

Максимальному розгинанні та супінації в ліктьовому суглобі

c.

Згинанні та пронації в ліктьовому суглобі до 90°

d.

Супінації в ліктьовому суглобі, рука зігнута в лікті 90°-100°

e.

Максимальному згинанні та супінації в ліктьовому суглобі

Коментар

Правильна відповідь: + Максимальному розгинанні та супінації в ліктьовому суглобі

Питання 115

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт віком 64 роки з діагнозом 3 стадія хвороби Паркінсона, скаржиться на зміни швидкості ходьби (уповільнення). Під час зміни напрямку ходьби та піднімання сходами періодично втрачає постуральний контроль, протягом 3--5 секунд, у вигляді стартових затримок і короткочасних зупинок, щоб не впасти. Який інструмент оцінювання функціональної мобільності пацієнта треба застосувати в цьому разі?

Питання 115Відповідь

a.

Тест <<п'яти присідань>> з обліком часу

b.

Тест <<ходьба на 10 метрів>> з обліком \\\ часу

c.

Тест <<швидких поворотів>> з обліком \\\ часу

d.

Тест <<оцінка часу підйому і ходьби>> \\\ з обліком часу

e.

Тест <<ходьба на 6 метрів>> з обліком \\\ часу

Коментар

Правильна відповідь: + Тест <<оцінка часу підйому і ходьби>> \ з обліком часу

Питання 116

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У жінки віком 50 років закритий перелом правої променевої кістки (повний, без зміщення). Під час огляду в післяімобілізаційний період виявлено контрактуру ліктьового суглоба. З метою комплексного відновлення, пацієнтка отримала направлення до реабілітаційного центру. Яку комбінацію відновних факторів фізичний терапевт має порекомендувати жінці?

Питання 116Відповідь

a.

Спеціальні вправи на покращення розгинання у ліктьовому суглобі, загальне УФО, електрофорез кальцію хлориду

b.

Ранкова гімнастика, масаж хворої кінцівки, парафін на ділянку зрощення

c.

Динамічні вправи для згиначів плеча, загальний масаж, озокерит на ділянку зрощення

d.

Пасивні вправи для плечового суглоба, магнітотерапія, йодовані ванни

e.

Циркулярний душ, масаж хворої кінцівки, парафін на ділянку зрощення

Коментар

Правильна відповідь: + Спеціальні вправи на покращення розгинання у ліктьовому суглобі, загальне УФО, електрофорез кальцію хлориду

Питання 117

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано з глибокими опіками ділянки ліктьового суглоба. Протипоказів до обстеження амплітуди рухів немає. Протягом якого терміну треба провести обстеження амплітуди рухів ліктьового суглоба?

Питання 117Відповідь

a.

24 годин з моменту отримання травми

b.

48 годин з моменту отримання травми

c.

24 годин з моменту шпиталізації

d.

36 годин з моменту шпиталізації

e.

72 годин з моменту отримання травми

Коментар

Правильна відповідь: + 72 годин з моменту отримання травми

Питання 118

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Жінка віком 35 років має синдром зап'ясткового каналу. Скаржиться на те, що не може друкувати більше 10 хвилин, біль стає нестерпним. Який тип вправ треба застосовувати з метою зменшення больових відчуттів у цьому разі?

Питання 118Відповідь

a.

На витривалість для згиначів \ передпліччя

b.

Мануальні мобілізаційні техніки

c.

На розтягування та зміцнення м'язів \ передпліччя

d.

На збільшення амплітуди

e.

З опором

Коментар

Правильна відповідь: + На розтягування та зміцнення м'язів \ передпліччя

Питання 119

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Яке місце займає рак шлунку в структурі злоякісних новоутворень у світі?

Питання 119Виберіть одну відповідь:

A.

Перше

B.

Друге

C.

Третє

D.

Не визначено

E.

Провідне

Коментар

Правильна відповідь: + Друге

Питання 120

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Для яких тренувань у рамках програми кардіореабілітації характерні:
періодичні та короткі серії навантаження зі 100% цільовою інтенсивністю, в 2
рази довші відновні періоди з дуже низьким навантаженням або без нього?

Питання 120Відповідь

a.

На велоергометрі з параболічним \\\ навантаженням

b.

На велоергометрі з рівномірним \\\ навантаженням

c.

На велоергометрі з інтервальним \\\ навантаженням

d.

На велоергометрі з ступінчасто-зростаючим навантаженням

e.

На велоергометрі з помірним навантаженням

Коментар

Правильна відповідь: + На велоергометрі з інтервальним \\\ навантаженням

Питання 121

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У геронтологічному віці в процесі ремоделювання кісткової тканини збільшується резорбція старої кістки і зменшується утворення нової кісткової тканини. Який вид вікових змін в організмі людини відбувається?

Питання 121Виберіть одну відповідь:

A.

Гетеротопність

B.

Гетерогенність

C.

Гетерокафтенність

D.

Гетерокінетичність

E.

Гетерохронність

Коментар

Правильна відповідь: + Гетерокафтенність

Питання 122

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Фізичному терапевту необхідно провести обстеження для визначення ступеня виразності феномену $\text{emph} \{<> (<<\text{навчився не використовувати}>>)$ ураженої верхньої кінцівки у пацієнта з центральним парезом. Який тест для цього доцільно використати?

Питання 122Відповідь

a.

Функціональна незалежність

b.

Мотріситі

c.

Оцінка моторики

d.

Френчай

е.

Стратегії руху

Коментар

Правильна відповідь: + Френчай

Питання 123

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

До лікаря звернулася жінка віком 42 роки зі скаргами на головний біль та періодично ниючий біль у попереку. З анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє на хронічний пієлонефрит. Визначте, із нижченаведених, основну характеристику пієлонефриту.

Питання 123Відповідь

а.

Запалення сечового міхура

б.

Запалення нирок

с.

Запалення ниркових клубочків

д.

Запалення ниркових мисок

е.

Запалення усіх органів сечовидільної \\\\ системи

Коментар

Правильна відповідь: + Запалення ниркових мисок

Питання 124

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Укажіть оптимальне антиконтрактурне положення у разі опіку стегна.

Питання 124Відповідь

а.

Нейтральне положення під кутом відведення 20°

б.

Нейтральне положення під кутом відведення 45°

с.

-

d.

Нейтральне положення під кутом відведення 30°

e.

Нейтральне положення під кутом відведення 60°

Коментар

Правильна відповідь: + Нейтральне положення під кутом відведення 20°

Питання 125

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтці віком 46 років із діагнозом: подагра в стадії ремісії, призначили вуглекислі ванни. Що є діючим чинником під час цієї процедури?

Питання 125Виберіть одну відповідь:

A.

Пухирці газу

B.

Кислота

C.

Іонізуюче випромінювання

D.

Луг

E.

Молекули кисню

Коментар

Правильна відповідь: + Пухирці газу

Питання 126

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Хлопчику віком 11 років діагностовано грудний сколіоз I ступеня (С-подібний лівобічний). Які фізичні вправи будуть переважати у програмі фізичної терапії у пацієнта?

Питання 126Відповідь

a.

Загальнорозвиваючі, дихальні, симетричні, корегувальні з нахилом вліво

b.

Асиметричні і деторсійні вправи

c.

Симетричні помірної та великої інтенсивності

d.

Загальнорозвиваючі, спеціальні асиметричні з підйомом лівої руки

e.

Коригувальні асиметричні з нахилом вправо

Коментар

Правильна відповідь: + Загальнорозвиваючі, дихальні, симетричні, корегувальні з нахилом вліво

Питання 127

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Після перенесеного COVID-19 у пацієнта спостерігається дуже низька толерантність до навантаження. Яка фізична активність рекомендована цьому пацієнтові у перші 6 тижнів після виписки?

Питання 127Відповідь

a.

Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи низької та середньої інтенсивності з короткими інтервалами

b.

Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи низької інтенсивності тричі на добу

c.

Зменшити свою повсякденну діяльність і виконувати фізичні вправи низької інтенсивності

d.

Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи середньої інтенсивності

e.

Зменшити свою повсякденну діяльність і виконувати фізичні вправи низької інтенсивності двічі на добу

Коментар

Правильна відповідь: + Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи низької та середньої інтенсивності з короткими інтервалами

Питання 128

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час обстеження пацієнта спостерігається: повне зникнення активного руху у правій кінцівці, атонія, спастичні явища відсутні, трофіка значно порушена. Який неврологічний синдром, найімовірніше, у пацієнта?

Питання 128Відповідь

a.

Центрального мотонейрона

b.

Паркінсона

c.

Гіпокінетично-ригідний

d.

Палеоцеребелярний

e.

Периферійного мотонейрона

Коментар

Правильна відповідь: + Периферійного мотонейрона

Питання 129

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Який рівень використання резервної ЧСС для розрахунку тренувальної ЧСС за формулою Карвонена рекомендований до використання в рамках програми кардіореабілітації?

Питання 129Відповідь

a.

20--30%

b.

30--40%

c.

60--90%

d.

60--80%

е.

40--60%

Коментар

Правильна відповідь: + 40--60%

Питання 130

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Які клінічні прояви характерні для повздовжньої плоскостопості?

Питання 130Відповідь

а.

Аддукція переднього відділу стопи

б.

Hallux valgus

с.

Інверсія стопи

д.

Пронація стопи

е.

Супінація стопи

Коментар

Правильна відповідь: + Пронація стопи

Питання 131

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка віком 52 роки на 6-й день після тотального ендопротезування правого кульшового суглоба стан задовільний, ускладнень не виявлено, ранню фізичну терапію розпочато в 1-й день після операції. Яка вправа допоможе розширити руховий режим пацієнта на 8-й день при такому перебігу післяопераційного періоду?

Питання 131Відповідь

а.

Тренування ходьби по східцям із милицями

б.

Тренування переходу з положення сидячи у положення стоячи

c.

Тренування ходьби по східцям без милиць

d.

Тренування стояння з підлокітною милицею

e.

Тренування ходьби з підлокітною милицею

Коментар

Правильна відповідь: + Тренування ходьби по східцям із милицями

Питання 132

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Визначте III функціональний клас стенокардії за показником подвійного добутку (індекс Робінсона), під час велоергометричного тестування.

Питання 132Відповідь

a.

Не більше ніж 150

b.

278 або більше

c.

217--151

d.

130--150

e.

277--218

Коментар

Правильна відповідь: + 217--151

Питання 133

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Визначте основні симптоми пухлин опорно-рухового апарату.

Питання 133Відповідь

a.

Підвищення загальної та місцевої \\\\ температури

b.

Порушення функції кінцівки, біль та \ кульгавість

c.

Почервоніння шкіри, локальний \ набряк

d.

Поява новоутворення, біль, порушення функції кінцівки, температура

e.

Локалізований біль у місці новоутворення

Коментар

Правильна відповідь: + Поява новоутворення, біль, порушення функції кінцівки, температура

Питання 134

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту після ГПМК обстежують ризик падіння. Який тест буде оптимальний для використання, якщо у доступі є коридор довжиною 5 метрів?

Питання 134Виберіть одну відповідь:

A.

6-ти хвилинний тест ходи

B.

Тест 20 присідань

C.

Динамічний індекс ходи

D.

Тест Френчай

E.

Тест <<Встань та йди>>

Коментар

Правильна відповідь: + Тест <<Встань та йди>>

Питання 135

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Що є протипоказанням для аеробних тренувань на витривалість для пацієнтів кардіологічного профілю?

Питання 135Відповідь

a.

Зниження життєвої ємності легень до 85% від прогнозованого значення

b.

Серцева недостатність II функціонального класу NYHA

c.

Підвищення систолічного артеріального тиску на 20 мм рт. ст. при фізичному навантаженні

d.

Виражена вторинна мітральна недостатність

e.

Гіпертонічна хвороба I ступеня

Коментар

Правильна відповідь: + Виражена вторинна мітральна недостатність

Питання 136

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Що є абсолютним протипоказанням для аеробних тренувань на витривалість пацієнтів кардіологічного профілю?

Питання 136Відповідь

a.

Стабільна стенокардія напруження

b.

Гострий коронарний синдром

c.

Серцева недостатність II функціонального класу NYHA

d.

Артеріальна гіпертензія II ступінь

e.

Недостатність мітрального клапану

Коментар

Правильна відповідь: + Гострий коронарний синдром

Питання 137

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтам для розсмоктування ексудату, ліквідації застійних явищ у легенях, зменшення розвитку спайок призначають масаж. Який масаж рекомендовано у цьому разі?

Питання 137Відповідь

a.

Спини і м'язів передпліччя

b.

Грудної клітки

c.

Грудної клітки і голови

d.

М'язів шиї і спини

e.

Грудної клітки і м'язів шиї

Коментар

Правильна відповідь: + Грудної клітки

Питання 138

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Який основний м'яз відповідає за рух розгинання в колінному суглобі?

Питання 138Виберіть одну відповідь:

A.

Чотириголовий м'яз стегна

B.

Двоголовий м'яз стегна

C.

Передній великогомілковий м'яз

D.

Клубово-поперековий м'яз

E.

Передній великогомілковий м'яз

Коментар

Правильна відповідь: + Чотириголовий м'яз стегна

Питання 139

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

На скільки відсотків маса тіла перевищує фізіологічну норму у пацієнта з II ступенем ожиріння?

Питання 139Відповідь

a.

70--80%

b.

20--25%

c.

50--60%

d.

10--15%

e.

30--49%

Коментар

Правильна відповідь: + 30--49%

Питання 140

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Для збільшення амплітуди рухів при артрогенній контрактурі колінного суглоба у пацієнта вирішили використовувати мобілізацію за методом Кальтенборна третього ступеня. Якою буде середня тривалість обраної мобілізації?

Питання 140Відповідь

a.

10-15 с

b.

50-60 с

c.

20-30 с

d.

40-50 с

e.

30-40 с

Коментар

Правильна відповідь: + 30-40 с

Питання 141

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка віком 45 років, майстер-перукар, звернулася до фізичного терапевта зі скаргами на біль у лівому плечовому суглобі, що збільшується при рухах у суглобі, у нічний час та під кінець робочої зміни. Вимушена обмежувати хатню та професійну роботу у зв'язку зі складністю при згинанні та утриманні руки. Не може розчісуватися та сушити волосся феном, обмежена можливість застібнути бретельки бюстгальтера. Проживає у власному будинку із трирічною донькою. Які скарги характеризують порушення функції?

Питання 141Відповідь

a.

Проблеми, пов'язані з проживанням у власному будинку із трирічною донькою

b.

Труднощі при згинанні руки

c.

Неможливість застібнути бретельки бюстгальтера

d.

Обмеження при виконанні хатньої роботи як хазяйки оселі

e.

Неможливість сушити волосся феном

Коментар

Правильна відповідь: + Труднощі при згинанні руки

Питання 142

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт під час ходьби сильно згинає ногу в колінному суглобі, переносаючи її вперед, спершу стає на пальці, потім спирається на латеральний край підошви і опускає п'яту. Об'єктивно спостерігаються: звисання стопи у позиції підошовного згинання з незначною ротацією до середини, парастезії та казуалгії, знижені ахіловий та підошовний рефлекси, ММТ м'язів

дорсальних згиначів стопи --- 2 бали, проприорецептивна чутливість --- змінена. Для якого патологічного процесу характерні такі результати обстеження?

Питання 142Відповідь

a.

Гонартроз колінного суглоба

b.

Плоскостопість

c.

Поліартрит

d.

Невропатія малогомілкового нерва

e.

Розрив ахілового сухожилля

Коментар

Правильна відповідь: + Невропатія малогомілкового нерва

Питання 143

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Під час оцінювання пацієнта після ГПМК функціональною шкалою рівноваги Берга, його показник становить 39 балів. Про що свідчить така кількість балів?

Питання 143Виберіть одну відповідь:

A.

Пацієнт повністю залежить від інвалідного візка, високий ризик падіння

B.

Здатність пацієнта ходити з зовнішньої підтримкою, середній ризик падіння

C.

Здатність пацієнта ходити без допоміжних засобів

D.

Незалежність пацієнта від зовнішньої підтримки, малий ризик падіння

E.

Здатність пацієнта переміщуватися з високим ризиком падіння

Коментар

Правильна відповідь: + Здатність пацієнта ходити з зовнішньої підтримкою, середній ризик падіння

Питання 144

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту із геміпарезом після перенесеного ішемічного інсульту в ранньому відновному періоді планується провести динамічну електростимуляцію. На яких м'язах потрібно розміщувати електроди під час проведення цієї процедури?

Питання 144Відповідь

a.

На антагоністах спастичних м'язів руки та ноги

b.

На м'язах агоністах

c.

На спастичних м'язах руки та ноги

d.

На синергістах спастичних м'язів руки та ноги

e.

На антагоністах спастичних м'язів руки та синергістах спастичних м'язів ноги

Коментар

Правильна відповідь: + На антагоністах спастичних м'язів руки та ноги

Питання 145

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка скаржиться на обмеження рухів у ліктьовому суглобі після зняття іммобілізації (2 тижні тому), біль відсутня. Фізичний терапевт після обстеження встановив наявність постіммобілізаційної згинально-розгинальної контрактури ліктьового суглоба. Пасивні фізіологічні рухи яких ступенів амплітуди треба використовувати для відновленні амплітуди рухів у ліктьовому суглобі?

Питання 145Відповідь

a.

III та IV ступенів амплітуди за Мейтландом

b.

I та II ступенів амплітуди за Мейтландом

c.

I, II та IV ступенів амплітуди за Мейтландом

d.

II та III ступенів амплітуди за Мейтландом

e.

I та IV ступенів амплітуди за Мейтландом

Коментар

Правильна відповідь: + III та IV ступенів амплітуди за Мейтландом

Питання 146

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Який тест можна застосувати, щоб оцінити здатність пацієнта модифікувати ходьбу, пов'язану з рухом голови, когнітивними завданнями, зміною її швидкості чи перешкод?

Питання 146Відповідь

a.

Тест Тінетті

b.

Динамічний індекс ходьби

c.

Шестихвилинний тест ходьби

d.

Шестиметровий тест ходьби

e.

Десятиметровий тест ходьби

Коментар

Правильна відповідь: + Динамічний індекс ходьби

Питання 147

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка під час обстеження виявлено: тахікардію, екзофтальм, підвищення основного обміну на 40%. Гіперфункція якої ендокринної залози викликає такі зміни?

Питання 147Відповідь

a.

Підшлункової

b.

Епіфізу

c.

Щитоподібної

d.

Паращитоподібної

e.

Нейрогіпофізу

Коментар

Правильна відповідь: + Щитоподібної

Питання 148

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт скаржиться на часті запаморочення, головокружіння під час зміни положення голови. В анамнезі: черепно-мозкова травма. Який тест потрібно провести для вестибулярного обстеження?

Питання 148Відповідь

a.

Імпульсний тест голови

b.

Тест сенсорної організації

c.

Маневр Дікса-Холпайка

d.

Тест стояння на одній нозі

e.

Міні-тест оцінки системи динамічної рівноваги

Коментар

Правильна відповідь: + Маневр Дікса-Холпайка

Питання 149

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 41 рік скаржиться на труднощі під час спускання сходами вниз. За результатами обстеження: ММТ розгиначів гомілки --- 4 бали, інших м'язів нижньої кінцівки --- 5 балів. Пацієнту рекомендовано: вправи на степ-платформі. На який м'яз скерована фізична терапія у цьому разі?

Питання 149Відповідь

а.

Двуголовий м'яз стегна

б.

Латеральну широку фасцію стегна

с.

Напівперетинчастий м'яз

д.

Прямий м'яз стегна

е.

Чотириголовий м'яз

Коментар

Правильна відповідь: + Чотириголовий м'яз

Питання 150

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У ранній післяшочковий період, до реабілітаційних втручань у пацієнта камбустіологічного профілю включають позиціювання, що передбачає викладання пацієнта у фізіологічно правильне положення. Яка мета цього втручання?

Питання 150Відповідь

а.

Зніжує ризик запалення

б.

Перешкоджає утворенню пролежнів

с.

Перешкоджає вивиху плечового \\\ суглоба

д.

Перешкоджає утворенню контрактур

е.

Покращення кровообігу

Коментар

Правильна відповідь: + Перешкоджає утворенню контрактур