

§ 3 条件分布

- 条件分布律
- 条件分布函数
- 条件概率密度

一、离散型随机变量的条件分布律

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，其分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$$

(X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律分别为
：

$$P\{X = x_i\} = p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots$$

由条件概率公式自然地引出如下定义：

定义： 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j ，若 $P\{Y = y_j\} > 0$ ，则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的**条件分布律**。

条件分布律具有分布律的以下特性：

$$1^0 \quad P\{X = x_i | Y = y_j\} \geq 0 ;$$

$$2^0 \quad \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i | Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} = \frac{1}{p_{\cdot j}} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \frac{p_{\cdot j}}{p_{\cdot j}} = 1.$$

例 1 (X, Y) 的联合分布律及边缘分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{9} = p_{0\cdot}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	$\frac{4}{9} = p_{1\cdot}$
2	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{1}{9} = p_{2\cdot}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{4}{9} = p_{\cdot 0}$	$\frac{4}{9} = p_{\cdot 1}$	$\frac{1}{9} = p_{\cdot 2}$	

则在 $Y=0$ 条件下，随机变量 X 的条件分布律为：

$$P\{X=0|Y=0\} = \frac{p_{00}}{p_{\cdot 0}} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{4}{9}} = \frac{1}{4} \quad P\{X=1|Y=0\} = \frac{p_{10}}{p_{\cdot 0}} = \frac{\frac{2}{9}}{\frac{4}{9}} = \frac{1}{2}$$

$$P\{X=2|Y=0\} = \frac{p_{20}}{p_{\cdot 0}} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{4}{9}} = \frac{1}{4}$$

同样对于固定的 i , 若 $P\{X=x_i\}>0$, 则称 §3 条件分布

$$P\{Y=y_j | X=x_i\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, j=1,2,\dots$$

为在 $X=x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律。

例 2

一射手进行射击，击中目标的概率为 p ，射击到击中目标两次为止。设以 X 表示首次击中目标所进行的射击次数，以 Y 表示总共进行的射击次数，试求 X 和 Y 的联合分布律以及条件分布

解： Y 的取值是 $2, 3, 4, \dots$ ； X 的取值是 $1, 2, \dots$ ，并且 $X < Y$ 。

第三章 随机变量及其分布

§3 条件分布

X, Y 的联合分布律为

$$P\{X = m, Y = n\}$$

$= P\{\text{第 } m \text{ 次射击时首次击中目标, 且第 } n \text{ 次射击时第二次命中目标}\}$
由独立性, 可得

$$P\{X = m, Y = n\} = q^{m-1} \cdot p \cdot q^{n-m-1} \cdot p = q^{n-2} \cdot p^2$$

(其中 $q = 1 - p$) $(n = 2, 3, \dots; m = 1, 2, \dots, n-1)$

X 的边缘分布律为

$$P\{X = m\} = \sum_{n=m+1}^{\infty} P\{X = m, Y = n\}$$

$$= \sum_{n=m+1}^{\infty} p^2 q^{n-2} = p^2 \sum_{n=m+1}^{\infty} q^{n-2} = p^2 \cdot \frac{q^{m-1}}{1-q} = pq^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots$$

第三章 随机变量及其分布

Y 的边缘分布律为

$$P\{X = m, Y = n\} = q^{n-2} \cdot p^2$$

$$\begin{aligned} P\{Y = n\} &= \sum_{m=1}^{n-1} P\{X = m, Y = n\} \\ &= \sum_{m=1}^{n-1} p^2 q^{n-2} = (n-1)p^2 q^{n-2}, n = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

在 $Y=n$ 条件下随机变量 X 的条件分布律为
当 $n=2, 3, \dots$ 时,

$$\begin{aligned} P\{X = m | Y = n\} &= \frac{P\{X = m, Y = n\}}{P\{Y = n\}} \\ &= \frac{p^2 q^{n-2}}{(n-1)p^2 q^{n-2}} = \frac{1}{n-1}, \quad m = 1, 2, \dots, n-1; \end{aligned}$$

在 $X=m$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律为

当 $m=1,2,3,\dots$ 时,

$$\begin{aligned} P\{Y = n \mid X = m\} &= \frac{P\{X = m, Y = n\}}{P\{X = m\}} \\ &= \frac{p^2 q^{n-2}}{pq^{m-1}} = pq^{n-m-1}, \quad n = m+1, m+2, \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{X = m, Y = n\} &= q^{n-2} \cdot p^2 \\ P\{X = m\} &= pq^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots \end{aligned}$$



第三章 随机变量及其分布

二、条件分布函数

条件分布

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量，由于

$$P\{X = x_i\} = 0, P\{Y = y_j\} = 0,$$

不能直接代入条件概率公

式，我们利用极限的方法来引入条件分布函数的

概念。给定 y ，设对于任意固定的正数 ε ，

$P\{y < Y \leq y + \varepsilon\} > 0$ ，若对于任意实数 x ，极限

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P\{X \leq x \mid y < Y \leq y + \varepsilon\} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq x, y < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y < Y \leq y + \varepsilon\}} \end{aligned}$$

存在，则称为在条件 $Y = y$ 下 X 的条件分布函数，
写成 $P\{X \leq x \mid Y = y\}$ ，或记为 $F_{X|Y}(x|y)$



返回主目录

第三章 随机变量及其分布

条件分布

$$F_{X|Y}(x|y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq x, y < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y < Y \leq y + \varepsilon\}}$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\int_{-\infty}^x du \int_y^{y+\varepsilon} f(u, v) dv}{\int_y^{y+\varepsilon} f_Y(v) dv}$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\int_{-\infty}^x f(u, v^*) \varepsilon du}{f_Y(v^0) \varepsilon} \quad \begin{aligned} &(y < v^* \leq y + \varepsilon, \\ &y < v^0 \leq y + \varepsilon) \end{aligned}$$

$$= \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du,$$



返回主目录

可见，当 $f_Y(y) > 0$ 时，


在条件 $Y=y$ 下 X 的条件分布函数为

:

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du,$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

称为随机变量 X 在 $Y=y$ 的条件下的条件密度函数。



三、连续型随机变量的条件密度函数

§3 条件分布

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量，其联合密度函数为

$$f(x, y)$$

又随机变量 X 的边缘密度函数为：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

随机变量 Y 的边缘密度函数为：

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

则当 $f_Y(y) > 0$ 时，可得随机变量 X 在 $Y = y$ 的条件下的条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

当 $f_X(x) > 0$ 时，可得随机变量 Y 在 $X = x$ 的条件下的条件密度函数 为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$



条件密度函数的性质

§3 条件分布

性质 1. 对任意的 x , 有

$$f_{X|Y}(x|y) \geq 0$$

性质 2.
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x|y) dx = 1$$

简言之, $f_{X|Y}(x|y)$ 是密度函数.

对于条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$ 也有类似的性质.



例 3


§3 条件分布

设二维随机变量 (X, Y) 服从圆域： $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的均匀分布，试求：

(1) 条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$. (2) $P\{X > \frac{1}{2} | Y = \frac{1}{2}\}$.

解：(1) 二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



第三章 随机变量及其分布

例 3 (续)

§3 条件分布


由此得，当 $-1 \leq y \leq 1$ 时，

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}$$

所以，随机变量 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & -1 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

由此得，当 $-1 < y < 1$ 时， $f_Y(y) > 0$



例 3 (续)

§3 条件分布

因此当 $-1 < y < 1$ 时, 且 $-\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{\pi}}{\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}} = \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}$$

所以,

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}} & -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

即当 $-1 < y < 1$ 时, X 在 $Y = y$ 下的条件分布是区间 $\left[-\sqrt{1-y^2}, \sqrt{1-y^2}\right]$ 上的均匀分布.

第三章 随机变量及其分布

例 3 (续)

§3 条件分布

所以

$$f_{X|Y}(x|y=\frac{1}{2}) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-(\frac{1}{2})^2}} & -\sqrt{1-\frac{1}{4}} \leq x \leq \sqrt{1-\frac{1}{4}} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) P\{X > \frac{1}{2} | Y = \frac{1}{2}\} &= \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} f_{X|Y}(x|y=\frac{1}{2})dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{\sqrt{3}}{3} dx = \frac{1}{2\sqrt{3}}(\sqrt{3}-1) \end{aligned}$$

例 4

§3 条件分布

设二维随机变量 (X, Y) 服从二元正态分布：

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, r)$$

则 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2(1-r^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2r(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

例 4 (续)

又随机变量 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \quad (-\infty < y < +\infty)$$

因此，对任意的 y ， $f_Y(y) > 0$ ，所以，对任意的 y ，有

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{\sigma_1^2(1-r^2)}}$$

$$\cdot \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_1^2(1-r^2)}\left[x - \left(\mu_1 + r\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2)\right)\right]^2\right\} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

这表明，二维正态分布的条件分布是一维正态分布：

$$N\left(\mu_1 + r \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1^2(1 - r^2)\right)$$

例 5

§3 条件分布

设随机变量 X 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布，当 $0 < x < 1$ 时，随机变量 Y 在 $X = x$ 的条件下服从区间 $(x, 1)$ 上的均匀分布。试求随机变量 Y 的密度函数。

解： 随机变量 X 的密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



例 5 (续)

§3 条件分布

又由题设，知当 $0 < x < 1$ 时，随机变量 Y 在条件 $X = x$ 下的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & x < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

所以，由公式

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$



例 5 (续)

§3 条件分布


$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

所以，当 $0 < y < 1$ 时，

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^y \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-y)$$

所以，随机变量 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} -\ln(1-y) & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



[返回主目录](#)

例 6

设随机变量 (X, Y) 的概率密度为


$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

试求 (1) $f_X(x), f_Y(y)$; (2) $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$;

(3) $P\{X > \frac{1}{2} | Y > 0\}.$

解：

$$(1) f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x dy = 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$



第三章 随机变量及其分布


§3 条件分布

例 6
(续)

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 dx = 1 - y, & 0 \leq y < 1, \\ \int_{-y}^1 dx = 1 + y, & -1 \leq y < 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 - |y|, & |y| < 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$(2) \text{ 当 } |y| < 1, \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1 - |y|}, & |y| < x < 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$



第三章 随机变量及其分布

例 6 (续)


§3 条件分布

$$\text{当 } 0 < x < 1, \quad f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & |y| < x \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

$$(3). P\{X > \frac{1}{2} | Y > 0\} = \frac{P\{X > \frac{1}{2}, Y > 0\}}{P\{Y > 0\}}$$

p_{85} 11,13,15

$$= \frac{(1 + \frac{1}{2}) \times \frac{1}{2} \div 2}{\frac{1}{2} \times 1 \times 1} = \frac{3}{4}$$



[返回主目录](#)