

§1 数学期望

例 1 : 某班有 N 个人, 其中有 n_i 个人为 a_i 分,

$i = 1, 2, \cdots, k$, $\sum_{i=1}^k n_i = N$, 求平均成绩。

解 : 平均成绩为 : $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^k a_i n_i = \sum_{i=1}^k a_i \frac{n_i}{N}$

若用 X 表示成绩, 则 $P\{X = a_i\} \approx \frac{n_i}{N}$

$$\sum_{i=1}^k a_i \cdot \frac{n_i}{N} \approx \sum_{i=1}^k a_i \cdot P\{X = a_i\}$$



1、数学期望定义

(1) 离散型

设离散型随机变量 X 的分布律为：

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$

的和为随机变量 X 的数学期望，记为 $E(X)$ ，

$$\text{即 } E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k \quad \circ$$

数学期望也称为均值。



说明

§1 数学期望

(1) X 的数学期望刻画了 X 变化的平均值 .

(2) 由于随机变量 X 的数学期望表示的是随机变量 X

变化的平均值 , 因此 , 只有当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n$ 绝对收敛

时 , 才能保证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n$ 的和与其级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n$

的求和顺序无关 .



(2)、连续型

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$
 则 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ 称为归一化条件
 其值为 1

记为
$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

数学期望也称为均值。

例 2

甲、乙两人射击，他们的射击水平由下表给出：
 X : 甲击中的环数； Y : 乙击中的环数；

X	8	9	10
P	0.1	0.3	0.6
Y	8	9	10
P	0.2	0.5	0.3

试问哪一个人的射击水平较高？

例 2 (续)

解：

甲、乙的平均环数可写为

$$EX = 8 \times 0.1 + 9 \times 0.3 + 10 \times 0.6 = 9.5$$

$$EY = 8 \times 0.2 + 9 \times 0.5 + 10 \times 0.3 = 9.1$$

因此，从平均环数上看，甲的射击水平要比乙的好。

例 3

设随机变量 X 服从指数分布，其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

则

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^{\infty} x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta$$



例 4

设随机变量 X 服从Cauchy分布，其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

由于

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{1+x^2} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \ln(1+x^2) \Big|_0^{+\infty} \\ &= +\infty \end{aligned}$$

这表明积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 不绝对收敛，因而 $E(X)$ 不存在。

例 5

按规定，火车站每天 8:00~9:00, 9:00~10:00 都恰有一辆客车到站，但到站的时刻是随机的，且两者到站的时间相互独立，其规律为：

到站时间	8:10,9:10	8:30,9:30	8:50,9:50
概率	1/6	3/6	2/6

- (1) 旅客 8:00 到站，求他候车时间的数学期望。
- (2) 旅客 8:20 到站，求他候车时间的数学期望。

解：设旅客的候车时间为 X (以分记)

(1) X 的分布律：

X	10	30	50
P	1/6	3/6	2/6

$$EX=10*(1/6)+30*(3/6)+50*(2/6)=33.33(\text{分})$$

(2) 旅客 8 : 20 分到达

X 的分布率为

X	10	30	50	70	90
P	3/6	2/6	$(1/6)*(1/6)$	$(3/6)*(1/6)$	$(2/6)*(1/6)$

$$EX=10*(3/6)+30*(2/6)+50*(1/36) +70*(3/36) +90*(2/36) \\ =27.22(\text{分})$$

到站时间	8:10,9:10	8:30,9:30	8:50,9:50
概率	1/6	3/6	2/6

2、随机变量函数的数学期望

定理 1 :

设 $Y=g(X)$, $g(x)$ 是连续函数,(1) 若 X 的分布率为 $p_k = P\{X = x_k\} \quad k = 1, 2, \dots$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k$ 绝对收敛, 则 $E(Y) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k$ (2). 若 X 的概率密度为 $f(x)$, 且 $\int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$ 绝对

收敛, 则

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$



定理 2 :

若 (X, Y) 是二维随机变量, (x, y) 是二元连续函数,
 $Z = g(X, Y)$

(1) 若 (X, Y) 的分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$,

且 $\sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$ 绝对收敛; 则 $E(Z) = \sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$

(2). 若 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 且

$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$ 绝对收敛,

则 $E(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$

若二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y)$, 则

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right\} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy$$

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy$$

例 6

设风速 V 在 $(0, a)$ 上服从均匀分布, 又设电线
 受到的压力 W 是 V 的函数: $W = kV^2$, ($k \geq 0$)
 求 EW .


解: $f_V(v) = \begin{cases} 1/a, & 0 < v < a; \\ 0, & \text{其它}; \end{cases}$

$$EW = \int_{-\infty}^{\infty} kv^2 f_V(v) dv = k \int_0^a v^2 (1/a) dv = \frac{1}{3} ka^2$$

例 7

设 (X, Y) 在区域 A 上服从均匀分布，其中 A 为 x 轴， y 轴和直线 $x+y+1=0$ 所围成的区域。求 $E(X)$ ， $E(-3X+2Y)$ ， $E(XY)$ 。

解： $f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in A \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$



$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x, y) dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 x \cdot 2 dy = -\frac{1}{3}$$

$$E(-3X + 2Y) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} (-3x + 2y) f(x, y) dy = \int_{-1}^0 dx \int_{-x-1}^0 2(-3x + 2y) dy = \frac{1}{3}$$

$$EXY = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 x \cdot 2y dy = \frac{1}{12}$$

例 8

设在国际市场上每年对我国某种出口商品的需求量是随机变量 X (吨), 它在 $[2000, 4000]$ 上服从均匀分布, 又设每售出这种商品一吨, 可为国家挣得外汇 3 万元, 但假如销售不出而囤积在仓库, 则每吨需浪费保养费 1 万元。
问需要组织多少货源, 才能使国家收益最大。


解: 设 y 为预备出口的该商品的数量

, 这个数量可只介于 2000 与 4000 之间

用 Z 表示国家的收益 (万元)

$$Z = \begin{cases} 3y, & X \geq y \\ 3X - (y - X), & X < y \end{cases}$$

(例 8
续)



X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2000}, & 2000 \leq x \leq 4000 \\ 0, & \text{其它;} \end{cases}$$

$$EZ = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx = \int_{2000}^y \frac{3x - (y - x)}{2000} dx + \int_y^{4000} \frac{3y}{2000} dx$$

(例 8
续)

下面求使 EZ 达到最大的 y 值，

$$\begin{aligned} EZ &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx = \int_{2000}^y \frac{3x - (y - x)}{2000} dx + \int_y^{4000} \frac{3y}{2000} dx \\ &= -\frac{1}{1000} [y^2 - 7000y + 4 * 10^6] \\ &= -\frac{1}{1000} [(y - 3500)^2 - 3500^2 - 4 * 10^4] \\ &= -\frac{1}{1000} (y - 3500)^2 + 8250 \end{aligned}$$

即，组织 3500 吨此种商品是最佳的决策。

3、数学期望的性质

I) $Ec=c$, c 是常数 , 若 $a \leq X \leq b$,

则 $a \leq EX \leq b$,

II) $EcX=cEX$, c 是常数 ,

III) $E(aX+bY)=aEX+bEY$

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i EX_i$$

IV) 若 x, y 独立 , 则 $EXY=EXEY$



例 9 对 N 个人进行验血，有两种方案：

(1) 对每人的血液逐个化验，共需 N 次化验；

(2) 将采集的每个人的血分成两份，然后取其中的一份，按 k 个人一组混合后进行化验（设 N 是 k 的倍数），若呈阴性反应，则认为 k 个人的血都是阴性反应，这时 k 个人的血只要化验一次；如果混合血液呈阳性反应，则需对 k 个人的另一份血液逐一进行化验，这时 k 个人的血要化验 $k+1$ 次；

假设所有人的血液呈阳性反应的概率都是 P ，且各次化验结果是相互独立的。

试说明适当选取 k 可使第二个方案减少化验次数。

(例 9 续)

解：设 X 表示第二个方案下的总化验次数， X_i 表示第 i 个组的化验次数，则

$$X = \sum_{i=1}^{N/k} X_i, \text{ 且 } EX = \sum_{i=1}^{N/k} EX_i$$

EX 表示第二种方案下总的平均化验次数， EX_i 表示第 i 个组的平均化验次数。

下面求 EX ：

$$P\{X_i = 1\} = q^k, \quad q = 1 - p;$$

$$P\{X_i = k + 1\} = 1 - q^k;$$

(例 9 续)

$$EX_i = q^k + (k+1)(1-q^k) = k+1-kq^k, \\ i=1,2,\cdots,N/k;$$

$$\text{所以 } EX = \frac{N}{k}(k+1-kq^k) = N(1 + \frac{1}{k} - q^k)$$

只要选 k 使 $1 + 1/k - q^k < 1$, 即 $1/k < q^k$, 就可使第二个方案减少化验次数 ; 当 q 已知时 , 若选 k 使 $f(k) = 1 + 1/k - q^k$ 取最小值 , 就可使化验次数最少。

例如 : 当 $p=0.1$, $q=0.9$ 时 , 可证明 $k=4$ 可使最小 ; 这时 ,

$$EX = N(1 + 1/4 - 0.9^4) = 0.5939N$$

工作量将减少 40%.

例 10

一民航送客车载有 20 位旅客自机场开出，旅客有 10 个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车。以 X 表示停车的次数。

求 EX （设每个旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅客是否下车相互独立）。

解：设 $X_i = \begin{cases} 0, & \text{第 } i \text{ 站没人下车} \\ 1, & \text{第 } i \text{ 站有人下车} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 10$

此时， $X_i \quad i = 1, 2, \dots, 10$ 不是相互独立的

易见 $X = X_1 + \dots + X_{10} \quad EX = \sum_{i=1}^{10} EX_i$

$$P\{X_i = 0\} = (9/10)^{20} \quad P\{X_i = 1\} = 1 - (9/10)^{20} \quad i = 1, \dots, 10$$

$$EX_i = 1 \cdot [1 - (9/10)^{20}] \quad i = 1, \dots, 10,$$

$$EX = 10[1 - (9/10)^{20}] = 8.784(\text{次})。$$

例 11

§1 数学期望

用某台机器生产某种产品，已知正品率随着该机器所用次数的增加而指数下降，即

$P\{\text{第 } k \text{ 次生产出的产品是正品}\} = e^{-\lambda k}, k = 1, 2, \dots, \lambda > 0.$
假设每次生产 100 件产品，试求这台机器前 10 次生产中平均生产的正品总数。

解：设 X 是前 10 次生产的产品中的正品数，并设

$$X_{ki} = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 次生产的第 } i \text{ 件产品是正品;} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

$k = 1, 2, \dots, 10, i = 1, 2, \dots, 100$, 则

$$X = \sum_{k=1}^{10} \sum_{i=1}^{100} X_{ki}.$$

[返回主目录](#)

例 11

(续)
而 X_{ki} 服从 $p = e^{-\lambda k}$ 的 $(0-1)$ 分布, $E(X_{ki}) = e^{-\lambda k}$.

$i = 1, 2, \dots, 100$, 所以

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{10} \sum_{i=1}^{100} E(X_{ki}) = \sum_{k=1}^{10} 100e^{-k\lambda} = 100 \sum_{k=1}^{10} e^{-k\lambda} \\ &= \frac{100e^{-\lambda}(1 - e^{-10\lambda})}{1 - e^{-\lambda}} \end{aligned}$$



例 12

§1 数学期望

对产品进行抽样，只要发现废品就认为这批产品不合格，并结束抽样。若抽样到第 n 件仍未发现废品则认为这批产品合格。

假设产品数量很大，抽查到废品的概率是 p ，试求平均需抽查的件数。

解：设 X 为停止检查时，抽样的件数，则 X 的可能取值为 $1, 2, \dots, n$ ，且

$$P\{X = k\} = \begin{cases} q^{k-1} p, & k = 1, 2, \dots, n-1; \\ q^{n-1}, & k = n. \end{cases}$$

其中 $q = 1 - p$ ，于是

$$E(X) = \sum_{k=1}^{n-1} k q^{k-1} p + n q^{n-1}$$

例 12

§1 数学期望

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{n-1} kq^{k-1}(1-q) + nq^{n-1} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} kq^{k-1} - \sum_{k=1}^{n-1} kq^k + nq^{n-1} \\ &= (1 + 2q + 3q^2 + \cdots + (n-1)q^{n-2}) - \\ &\quad - (q + 2q^2 + \cdots + (n-2)q^{n-2} + (n-1)q^{n-1}) + nq^{n-1} \\ &= 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} \\ &= \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{1-(1-p)^n}{p} \end{aligned}$$

 $p_{113-115} \quad 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15.$  [返回主目录](#)