

第三章 多维随机变量及其分布

§ 1 二维随机变量

§ 2 边缘分布

§ 3 条件分布

§ 4 相互独立的随机变量

§ 5 两个随机变量的函数的分布



§1 二维随机变量


- ♣ 二维随机变量
- ♣ 联合分布函数
- ♣ 联合分布律
- ♣ 联合概率密度



§1 二维随机变量

1 二维随机变量的定义

设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $S=\{e\}$ ，
设 $X=X(e)$ 和 $Y=Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量。
由它们构成的一个向量 (X, Y) ，叫做二维随机
向量，或二维随机变量。



§1 二维随机变量

注意事项

(1) 我们应把二维随机变量

$$(X, Y) = (X(e), Y(e)) \quad (e \in S)$$

看作一个整体，因为 X 与 Y 之间是有联系的；

(2) 在几何上，二维随机变量 (X, Y) 可看作平面上的随机点。

§1 二维随机变量

二维随机变量的例子

1. 考察某地区成年男子的身体状况，令

X ：该地区成年男子的身高；

Y ：该地区成年男子的体重；

则 (X, Y) 就是一个二维随机变量。

2. 对一目标进行射击，令：

X ：弹着点与目标的水平距离；

Y ：弹着点与目标的垂直距离；

则 (X, Y) 就是一个二维随机变量。

§1 二维随机变量

二维随机变量的例子

3. 考察某地区的气候状况，令：

X ：该地区的温度；

Y ：该地区的湿度。

则 (X, Y) 就是一个二维随机变量。

4. 考察某钢厂钢材的质量，令：

X ：钢材的含碳量；

Y ：钢材的含硫量；

则 (X, Y) 就是一个二维随机变量。

§1 二维随机变量

2 二维随机变量的联合分布函数的定义

设 (X, Y) 是一个二维随机变量，则对于任意一对实数 (x, y) ，

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$


是 (x, y) 的函数。我们称此函数为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数。

§1 二维随机变量

二维分布函数的几何意义

二维分布函数的几何意义是： $F(x, y)$ 表示平面上的随机点 (X, Y) 落在以 (x, y) 为右上顶点的无穷矩形中的概率。

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$



§1 二维随机变量


一个重要的公式

设： $x_1 < x_2$ ， $y_1 < y_2$ ，则

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\ = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$

$$\therefore P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$$

$$\begin{aligned} &= P\{X \leq x_2, Y \leq y_2\} \\ &\quad - P\left\{(X \leq x_1, Y \leq y_2) \right. \\ &\quad \left. \cup (X \leq x_2, Y \leq y_1)\right\} \end{aligned}$$



§1 二维随机变量

分布函数具有以下的基本性质：

1) $F(x, y)$ 是变量 x, y 的不减函数，即

对于任意固定的 y ，当 $x_1 < x_2$ 时，

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y);$$

对于任意固定的 x ，当 $y_1 < y_2$ 时，

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2);$$

2) $0 \leq F(x, y) \leq 1$ ，且

对于任意固定的 Y ， $F(-\infty, y) = 0$;


对于任意固定的 X ， $F(x, -\infty) = 0$;

$$F(-\infty, -\infty) = 0; \quad F(+\infty, +\infty) = 1.$$

§1 二维随机变量

3) $F(x, y) = F(x+0, y)$, $F(x, y) = F(x, y+0)$, 即
 $F(x, y)$ 关于 x 右连续, 关于 y 也右连续.

4) $F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) = 0$.



§1 二维随机变量

说 明

上述四条性质是二维随机变量分布函数的最基本的性质，即任何二维随机变量的分布函数都具有这四条性质；

更进一步地，我们还可以证明：如果某一二元函数具有这四条性质，那么，它一定是某一二维随机变量的分布函数（证明略）。

§1 二维随机变量

3 n 维随机变量

设 E 是一个随机试验， S 是其样本空间，

$$X_i = X_i(e) \quad (e \in S) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

是该样本空间上的 n 个随机变量。

则称

$$\begin{aligned} & (X_1, X_2, \dots, X_n) \\ &= (X_1(e), X_2(e), \dots, X_n(e)) \quad (e \in S) \end{aligned}$$

为样本空间 S 上的 n 维随机变量。

§1 二维随机变量

n 维随机变量的分布函数

设 (X_1, X_2, \dots, X_n) 是一个 n 维随机变量，则对于任意一 n 维实数组 (x_1, x_2, \dots, x_n) ，

$$\begin{aligned} & F(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\} \end{aligned}$$

我们称此函数为 n 维随机变量 (X_1, X_2, \dots, X_n) 的分布函数.

§1 二维随机变量

4 二维离散型随机变量

若二维随机变量 (X, Y) 的取值是有限个或可列无穷个, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量.

设 (X, Y) 二维离散型随机变量, X 的取值为

$$x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$$

Y 的取值为 $y_1, y_2, \dots, y_j, \dots$

则称

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

为二维离散型随机变量 (X, Y) 的(联合)分布律.

§1 二维随机变量

二维离散型随机变量的联合分布律

(X, Y) 的联合分布律也可以由下表表示

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash \\ X \end{array}$	y_1	y_2	\dots	y_j	\dots
x_1	p_{11}	p_{12}	\dots	p_{1j}	\dots
x_2	p_{21}	p_{22}	\dots	p_{2j}	\dots
\vdots	\vdots	\vdots		\vdots	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	\dots	p_{ij}	\dots
\vdots	\vdots	\vdots		\vdots	



[返回主目录](#)

§1 二维随机变量

二维离散型随机变量联合分布律的性质

性质 1 :

对任意的 (i, j) , $(i, j = 1, 2, \dots)$

有 $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} \geq 0$

性质 2 : $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$

§1 二维随机变量

例 1

将两个球等可能地放入编号为1,2,3的三个盒子中 .

令： X ：放入1号盒中的球数；

Y ：放入2号盒中的球数 .

试求 (X, Y) 的联合分布律 .

解： X 的可能取值为0,1,2；

Y 的可能取值为0,1,2 .

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

§1 二维随机变量

例 1 (续)

$$P\{X=0, Y=1\} = \frac{2}{3^2} = \frac{2}{9}; \quad P\{X=1, Y=2\} = P(\emptyset) = 0$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}; \quad P\{X=2, Y=0\} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$P\{X=1, Y=0\} = \frac{2}{3^2} = \frac{2}{9}; \quad P\{X=2, Y=1\} = P(\emptyset) = 0$$

$$P\{X=1, Y=1\} = \frac{2}{3^2} = \frac{2}{9}; \quad P\{X=2, Y=2\} = P(\emptyset) = 0$$

§1 二维随机变量

例 1 (续)

由此得 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

§1 二维随机变量

例 2

设随机变量 X 在 $1,2,3,4$ 四个数中等可能地取值，另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数。试求 (X,Y) 的分布律。

解： 由题意知， $X=i$ ， $Y=j$ 的取值情况是：
 $i=1,2,3,4$ ，且是等可能的；然后 j 取不大于 i 的正整数。
所以，当 $i < j$ 时， $p_{ij} = P\{X = i, Y = j\} = 0$

当 $i \geq j$ 时，由乘法公式，得

$$p_{ij} = P\{X = i, Y = j\} = P\{Y = j | X = i\}P\{X = i\} = \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{4},$$

其中 $i = 1,2,3,4$,



[返回主目录](#)

§1 二维随机变量

例 2 (续)

$Y \backslash X$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$



[返回主目录](#)

§1 二维随机变量

二维离散型随机变量的联合分布函数

设 (X, Y) 二维离散型随机变量 其(联合)分布律为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

则 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x, y_j \leq y} p_{ij}$$



[返回主目录](#)

§1 二维随机变量

5 二维连续型随机变量

对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ 如果存在非负实函数 $f(x, y)$ 使得对于任意的实数 x, y 有：

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv,$$

则称 (X, Y) 是连续型的二维随机变量，函数 $f(x, y)$ ，称为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度，或称为 X 和 Y 的联合概率密度。



§1 二维随机变量

按定义，概率密度 $f(x, y)$ 具有以下性质：

$$1^0 \quad f(x, y) \geq 0;$$

$$2^0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = F(\infty, \infty) = 1;$$

3⁰ 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续，则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$$

4⁰ 设 G 是平面上的一个区域，点 (X, Y) 落在

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

G 内的概率为：

§1 二维随机变量

$P\{(X,Y)\in G\}$ 的几何意义：

在几何上 $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面，上式

即表示 $P\{(X,Y)\in G\}$ 的值等于以 G 为底，以曲面

$z = f(x, y)$ 为顶的柱体体积

§1 二维随机变量

例 3 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(3x+4y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

(2) 求 (X, Y) 的联合分布函数 ;

(3) 求 $P\{0 < X < 1, 0 < Y < 2\}$.

解 : (1) 由密度函数的性质 , 得

§1 二维随机变量

例 3 (续)


$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = c \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(3x+4y)} dx dy$$

$$= c \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-4y} dy = \frac{c}{12}$$

所以, $c = 12$.

$$(2) \quad F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

当 $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$ 时, $F(x, y) = 0$;



返回主目录

§1 二维随机变量

例 3 (续)

当 $x > 0$ 且 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X \leq x, Y \leq y\} \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = 12 \int_0^x \int_0^y e^{-(3u+4v)} du dv \\ &= 12 \int_0^x e^{-3u} du \cdot \int_0^y e^{-4v} dv = (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}) \end{aligned}$$

$$\text{所以, } F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}) & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

§1 二维随机变量

例 3 (续)

$$(3) . P\{0 < X < 1, 0 < Y < 2\} .$$

$$= \iint_{0 < x < 1, 0 < y < 2} f(x, y) dx dy$$

$$= 12 \int_0^1 \int_0^2 e^{-(3x+4y)} dx dy$$

$$= 12 \int_0^1 e^{-3x} dx \cdot \int_0^2 e^{-4y} dy$$

$$= (1 - e^{-3})(1 - e^{-8})$$

§1 二维随机变量

二维均匀分布

设 D 是平面上的有界区域，其面积为 A

如果二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A} & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D \end{cases}$$

则称二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布。

§1 二维随机变量

二维均匀分布几何意义

如果二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布，我们可以认为随机点 (X, Y) 只落在区域 D 内；并且落在 D 内任一个子区域 D_1 内的概率与该子区域的面积成正比，而与 D_1 的形状以及 D_1 在 D 中的位置无关。

§1 二维随机变量

二维正态分布

设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

则称随机变量 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的正态分布，记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$
$$-\infty < \mu_i < +\infty \quad (i=1, 2) \quad \sigma_i > 0 \quad (i=1, 2) \quad -1 < \rho < 1$$



返回主目录

§1 二维随机变量

例 4

将一枚均匀的硬币掷3次，令：

X ：3次抛掷中正面出现的次数；

Y ：3次抛掷中正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值．

试求 (X, Y) 的联合分布律．

解： $S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$

X 的可能取值为 0, 1, 2, 3；

Y 的可能取值为 1, 3．

§1 二维随机变量

例 4 (续)

$$S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$$
$$P\{X = 0, Y = 1\} = 0; \quad P\{X = 0, Y = 3\} = \frac{1}{8};$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{3}{8}; \quad P\{X = 1, Y = 3\} = 0;$$

$$P\{X = 2, Y = 1\} = \frac{3}{8}; \quad P\{X = 2, Y = 3\} = 0;$$

$$P\{X = 3, Y = 1\} = 0; \quad P\{X = 3, Y = 3\} = \frac{1}{8}.$$

由此得随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

§1 二维随机变量

例 4 (续)

$X \backslash Y$	0	1	2	3
1	0	∞	∞	0
2	∞	0	0	∞

§1 二维随机变量

例 5 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(R - \sqrt{x^2 + y^2}) & x^2 + y^2 < R^2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) . 求常数 c ;

(2) . 求 (X, Y) 落入圆 $x^2 + y^2 \leq r^2$ ($0 < r < R$) 内的概率 .

解 : (1) . 由密度函数的性质 , 得

§1 二维随机变量

例 5 (续)

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \iint_{x^2 + y^2 < R^2} c \left(R - \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy$$

作极坐标变换 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 得

$$1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R c(R - \rho) \rho d\rho = \frac{1}{3} \pi R^3 \cdot c$$

$$\text{所以, } c = \frac{3}{\pi R^3} .$$



§1 二维随机变量

例 5

(续)

$$P\{(X, Y) \in \{x^2 + y^2 \leq r^2\}\} \\ = \iint_{x^2 + y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy = \iint_{x^2 + y^2 < r^2} \frac{3}{\pi R^3} \left(R - \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy$$

作极坐标变换 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 得

$$P\{(X, Y) \in \{x^2 + y^2 \leq r^2\}\} \\ = \frac{3}{\pi R^3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r (R - \rho) \rho d\rho = \frac{3r^2}{R^2} \left(1 - \frac{2r}{3R} \right)$$

§1 二维随机变量


例 6

设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{3}xy & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

试求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.

解：积分区域如图所示，



返回主目录

§1 二维随机变量

例 6 (续)


$$P\{X + Y \leq 1\}.$$

$$= \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_{1-x}^2 \left(x^2 + \frac{1}{3} xy \right) dy$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{5}{6} x^3 + \frac{4}{3} x^2 + \frac{1}{2} x \right) dx = \frac{65}{72}$$

p_{84} 1,2,3



返回主目录