

MAT342 - Théorie des anneaux
Donné par Juan Carlos Bustamante

Julien Houle

Automne 2026

Table des matières

1 Anneaux	1
Rappel	1
1.1 L'anneau de groupe	4
Algèbre de chemins	5

Chapitre 1 Anneaux

Rappel

- Un groupe est un ensemble avec une opération $(G, \cdot)$ qui vérifient
- associativité : $(xy)z = x(yz)$,
 - $\exists$ neutre : e_G t.q. $xe = ex = x$,
 - Tout élément est inversible : $\forall x, \exists x'$ t.q. $xx' = x'x = e$.
- De plus, G est abélien si
- commutatif : $xy = yx$.

Définition. Un anneau est un ensemble muni de 2 opérations $(A, +, \cdot)$, t.q.

1. $(A, +)$ un groupe abélien (neutre 0_A),
2. $(A, \cdot)$ un monoïde : assoc, neutre (1_A),
3. Relation de compatibilité
 - Distributivité : $x(y + z) = xy + xz$ et $(x + y)z = xz + yz$.

Remarque. 1. Certains textes ne nécessitent pas l'existence de neutre multiplicatif,
2. A est "commutatif" si l'opération $\cdot$ l'est.

Exemple. a) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ avec opérations usuelles ;

b) $\mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x], \mathbb{Z}[x, y], \dots$: polynômes ;

c) $M_n(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{n \times n}$: matrices carrées $n \times n$ avec coefficients dans $\mathbb{Z}$, $M_n(\mathbb{Q})$, $M_n(\mathbb{R})$, $M_n(\mathbb{C})$, $M_n(\mathbb{R}[x])$, $\dots$;

d) $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif,

- e) supposons G un groupe abélien : $\text{end}(G) = \left\{ G \xrightarrow{f} G \mid f \text{ homomorphisme de groupes} \right\}$, $f + g : G \rightarrow G, x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x)$, neutre 0 : la fonction constante égale à 0_G , associativité : héritée de G , "opposé" : $-f : x \mapsto -f(x) \in G$, alors $(\text{end}(G), +)$ est un groupe abélien. La composition est une autre opération dans $\text{end}(G)$,
- associativité : oui,
 - neutre : $1_G : x \mapsto x$,
 - distributivité : pour $x \in G$ arbitraire,

$$\begin{aligned} (f \circ (g + h))(x) &= f((g + h)(x)) \\ &= f(g(x) + h(x)) \end{aligned}$$

comme f est un homomorphisme de groupes

$$\begin{aligned} &= f(g(x)) + f(h(x)) \\ &= (f \circ g)(x) + (f \circ h)(x) \end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout $x \in G$, on a bien $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$ dans $\text{end}(G)$. De même, on a la distributivité de l'autre côté.

Ainsi, $\text{end}(G)$ est un anneau, généralement non commutatif.

- f) Si A, B sont des anneaux, $A \times B$ est un anneau avec $(a, b) + (a', b') := (a + a', b + b')$, $(a, b) \cdot (a', b') := (aa', bb')$, $1_{A \times B} := (1_A, 1_B)$;
- g) X un ensemble, $A = \mathbb{R}^{(X)} : \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est de support fini}\}$, c'est-à-dire $f(x) = 0$ sauf pour un ensemble fini d'éléments.
- addition dans $A : f + g : X \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) + g(x)$ fait de $(A, +)$ un groupe abélien ;
 - multiplication dans $A : f \cdot g : X \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) \cdot g(x)$ est associative et commutative. Les distributivités tiennent. Le neutre multiplicatif serait la fonction constante $x \mapsto 1_{\mathbb{R}}$ qui n'est pas à support fini.

Proposition. 1. Dans un anneau, le neutre multiplicatif est unique,
 2. Si un élément possède un inverse multiplicatif, alors cet inverse est unique. L'inverse de a est noté a^{-1} .

Démonstration. 1. Supposons $\mathbb{1}, \mathbb{1}'$ sont deux neutres multiplicatifs.

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \mathbb{1}\mathbb{1}' \\ \text{puisque } \mathbb{1}' \text{ est neutre} & \\ &= \mathbb{1}' \\ \text{puisque } \mathbb{1} \text{ est neutre} & \end{aligned}$$

2. Soit $a \in A$, a', a'' deux inverses.

$$\begin{aligned} a' &= a'\mathbb{1} \\ \text{puisque } a'' \text{ est inverse,} & \\ &= a'(aa'') \\ \text{par associativité,} & \\ &= (a'a)a'' \\ \text{puisque } a' \text{ est inverse,} & \\ &= \mathbb{1}a'' \\ &= a'' \end{aligned}$$

□

Proposition (Règles de calcul). Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau.

Pour tous $a, b, c \in A$, $m, n \in \mathbb{Z}$, on a

- i) $-(-a) = a$,
- ii) $-(a + b) = -a - b$,
- iii) $a + x = b + x \Rightarrow a = b$,
- iv)

$$\begin{aligned} (m + n)a &= ma + na \\ m(a + b) &= ma + mb \\ m(na) &= (mn)a \end{aligned}$$

- v) $a0 = 0a = 0$,
- vi) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$,
- vii)

$$\begin{aligned} a(b - c) &= ab - ac \\ (a - b)c &= ac - bc \end{aligned}$$

- viii) $(-a)(-b) = ab$,
- ix)

$$\begin{aligned} a \sum_{i=1}^n b_i &= \sum_{i=1}^n ab_i \\ \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b &= \sum_{i=1}^n a_i b \end{aligned}$$

- x) $(a^m)^n = a^{mn}$, $m, n \in \mathbb{N}$.

idée de démo. i) à iv) : Ça se passe dans le groupe abélien $(A, +)$, voir MAT141

v) : exercice

vi) :

$$\begin{aligned} a(-b) + ab &= a(-b + b) \\ &= a0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Il s'en suit que $a(-b) = -(ab)$. Idem pour l'autre égalité.

vii) : exercice

viii) :

$$\begin{aligned} (-a)(-b) &= -((-a)b) \\ &= -(-(ab)) \\ &= ab \end{aligned}$$

ix), x) : récurrences. ■

Définition. A un anneau donné. Un sous-anneau de A est un sous-ensemble B de A qui est un anneau pour les mêmes opérations, et avec le même neutre multiplicatif : $1_B = 1_A$. On écrit $B \leq A$

Exemple. 1. $\mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$.

2. $A = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ est un anneau dont le neutre multiplicatif est $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Ce n'est pas un sous anneau de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, car $1_{\mathbb{R}^{2 \times 2}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \notin A$.

3. $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{C}$. Ce sont les entiers de Gauss, avec les mêmes opérations que $\mathbb{C}$.

4. $d \in \mathbb{Z}$ pas divisible par un carré. $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \left\{ a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$ avec les opérations induites par celles de $\mathbb{R}$.
 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] \leq \mathbb{Q}[\sqrt{d}] \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$.

5. $T_n(\mathbb{R}) \leq M_n(\mathbb{R})$, les matrices triangulaires inférieures.

Proposition. Soient A un anneau et $B \subseteq A$. Alors, $B \leq A$ si, et seulement si,

1. B est un sous-groupe abélien de A ,
2. $a, b \in B \Rightarrow ab \in B$,
3. $1_A \in B$.

Démonstration. $\Rightarrow$: directe. ■

$\Leftarrow$: La multiplication est associative dans A , donc dans B aussi. De même, on a les distributivités. Le neutre 1_A est neutre dans A , donc dans B aussi. ■

□

Exemple. 1. Sous-anneaux (propres) de $\mathbb{Z}$: il n'y en a pas.

$\mathbb{Z}_n$ n'est même pas un sous-ensemble de $\mathbb{Z}$.

2. sous-anneaux de $\mathbb{Z}_m$: uniquement $\mathbb{Z}_m$.

3. A un anneau donné, $Z(A)$ est $Z(A) = \{a \in A \mid ax = xa, \forall x \in A\}$. Voyons que $Z(A) \leq A$.

— $Z(A)$ est un sous-groupe additif de A . $0_A \in Z(A)$. De plus, si $a, a' \in Z(A)$ alors pour $x \in A$ on a

$$\begin{aligned} (a - a')x &= ax - a'x \\ &= xa - xa' \\ &= x(a - a') \end{aligned}$$

Donc, $Z(A)$ est un sous-groupe additif de A .

— $a, a' \in Z(A)$.

$$\begin{aligned} (aa')x &= a(a'x) \\ &= a(xa') \\ &= (ax)a' \\ &= (xa)a' \end{aligned}$$

$$= x(aa')$$

Donc, $a, a' \in Z(A) \Rightarrow aa' \in Z(A)$.

— $1_A \in Z(A)$, directement.

(a) A commutatif $\Leftrightarrow Z(A) = A$.

(b) $A = \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Clairement, $\{\lambda I = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \in Z(A)$. Voyons que c'est tout. Si $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix} \in Z(A)$, alors

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu a & \mu b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu b & 0 \\ \mu d & 0 \end{bmatrix}$$

De même, aucune matrice $\begin{bmatrix} 0 & \mu \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ avec $\mu \neq 0$ ne se trouve dans $Z(A)$.

Par ailleurs, $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} \notin Z(A) \Leftrightarrow \lambda \neq \mu$.

Section 1.1 L'anneau de groupe

Soient A un anneau commutatif et G un groupe.

Rappel. $A^G = \{f : G \rightarrow A\}$ toutes les fonctions est un anneau pour

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

$$(f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x)$$

avec les opérations induites par A .

$A^{(G)} = \{f : G \rightarrow A \mid f \text{ est à support fini}\}$.

Définition. Pour $x \in G$, on pose $\delta_x : G \rightarrow A : y \mapsto \delta_x(y) = \begin{cases} 1_A & \text{si } x = y \\ 0_A & \text{si } x \neq y \end{cases}$. Si $f \in A^{(G)}$, alors $f(*) = \sum_{x \in G} f(x) \delta_x(*)$. En effet, pour $g_0 \in G$, $\sum_{x \in G} f(x) \delta_x(g_0) = f(g_0) \delta_{g_0}(g_0) = f(g_0)$.

Remarque. $\{\delta_x \mid x \in G\}$ est une “base” pour l'ensemble $A^{(G)}$.

Remarque. On a une injection $G \rightarrow A^{(G)} : x \mapsto \delta_x$ de sorte qu'on peut identifier δ_x de $A^{(G)}$ à x .

$A^{(G)}$ est un groupe abélien pour l'addition induite par celle de A . Posons $\delta_x \bullet \delta_y := \delta_{xy}$ et on prolonge par distributivité à $A^{(G)}$.

$$\left(\sum_{x \in G} a_x x \right) \left(\sum_{y \in G} b_y y \right) = \sum_{x, y \in G} a_x b_y (xy)$$

Exemple. 1. $A = \mathbb{Z}$, $G = \mathbb{D}_3 = \{\varepsilon, \rho, \sigma, \alpha, \beta, \gamma\}$, dont la table est présentée ci-bas.

$\circ$	ε	α	β	γ	ρ	σ
ε	ε	α	β	γ	ρ	σ
α	α	ε	ρ	σ	β	γ
β	β	σ	ε	ρ	γ	α
γ	γ	ρ	σ	ε	α	β
ρ	ρ	γ	α	β	σ	ε
σ	σ	β	γ	α	ε	ρ

TABLE 1.1 – Table de $\mathbb{D}_3$

$$\underbrace{(\rho + \sigma - \varepsilon)}_{\in \mathbb{Z}^{\mathbb{D}_3}} \underbrace{(2\alpha - \beta)}_{\in \mathbb{Z}^{\mathbb{D}_3}} = 2\rho\alpha + 2\sigma\alpha - 2\varepsilon\alpha - \rho\beta - \sigma\beta + \varepsilon\beta$$

$$= 2\gamma + 2\beta - 2\alpha - \alpha - \gamma + \beta$$

$$= \gamma + \beta - 3\alpha$$

L'élément neutre de $A^{(G)}$ est δ_e , où e est le neutre de G .

2. $A = \mathbb{R}$, $G = \langle x \rangle = \langle x^n \mid n \in \mathbb{Z} \rangle \cong \mathbb{Z}$. Les éléments de $A^{(G)}$ sont $\sum a_n x^n$, où la somme est finie. Les polynômes en x et x^{-1} , par exemple $3x^{-7} + x^{-1} + 4 + \pi x^{25}$. Le produit : $x^n x^m = x^{n+m}$ donne lieu au produit traditionnel des polynômes. En fait, $\mathbb{R}[x] \leq A^{(G)}$.
3. $A = \mathbb{R}$, $G = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \langle \omega \rangle = \{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\}$, où $\omega = e^{i2\pi/n}$. $\mathbb{R}^{(G)}$ contient des éléments de la forme $a_0 + a_1\omega + a_2\omega^2 + \dots + a_{n-1}\omega^{n-1}$.

$$\begin{aligned}
 (1 - \omega)(1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1}) &= (1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1}) - (\omega + \omega^2 + \dots + \omega^n) \\
 &= 1 - \omega^n \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Algèbre de chemins

Définition. Un *carquois* Q est un quadruplet $Q = (Q_0, Q_1, s, b)$, où Q_0, Q_1 sont des ensembles, points et flèches respectivement, et $s, b : Q_1 \rightarrow Q_0$ sont les applications “source” et “but”.

Si $\alpha \in Q_1$, on dessine $s(\alpha) \xrightarrow{\alpha} b(\alpha)$.




FIGURE 1.1 – 4 exemples de carquois

Exemple.

Définition. Un *chemin* dans Q est :

- un chemin stationnaire ε_i pour chaque $i \in Q_0$,
- une suite de flèches $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_t$ t.q. $b(\alpha_j) = s(\alpha_{j+1})$, pour $j \in \{1, 2, \dots, t-1\}$.

Exemple. Avec les carquois de l'exemple précédent,

1. $\alpha, \alpha^2, \dots$ sont des chemins dans Q^1 ,
2. $\alpha, \beta, \gamma, \beta\alpha, \gamma\alpha$ sont des chemins dans Q^2 .

Soit K un corps. KQ est le K -espace vectoriel ayant pour base l'ensemble des chemins dans Q .

Exemple. Avec les carquois de l'exemple précédent,

1. La base de KQ^1 est $\{\varepsilon_1, \alpha, \alpha^2, \dots\}$,
 $\varepsilon_1 + 3\alpha^2$ et $27\alpha^{28} - \alpha$ sont des éléments de KQ^1 ;
2. La base de KQ^2 est $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \alpha, \beta, \gamma, \beta\alpha, \gamma\alpha\}$,
 $\alpha - \beta\alpha$ et $\varepsilon_1 + \gamma + \alpha$ sont des éléments de KQ^2 ,
 $(\alpha - \beta\alpha) + (\varepsilon_1 + \gamma + \alpha) = 2\alpha - \beta\alpha + \varepsilon_1 + \gamma$.

La multiplication dans KQ est définie comme suit

Si $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ sont des chemins, alors on pose

$$(\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_t)(\beta_1 \beta_2 \dots \beta_s) = \begin{cases} \alpha_1 \dots \alpha_t \beta_1 \dots \beta_s & \text{si } b(\alpha_t) = s(\beta_1) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple. 1. $Q = Q^1$, $KQ = k[\alpha]$,

2. $Q = Q^3$, la base de KQ est $\{\varepsilon_1, \alpha, \alpha^2, \dots, \beta, \beta^2, \dots, \alpha\beta, \beta\alpha, \dots\}$. Dans KQ , $\alpha\beta \neq \beta\alpha$, donc KQ n'est pas $K[\alpha, \beta]$,
3. $Q = Q^4$, la base de KQ est $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \alpha, \beta, \beta\alpha\}$. $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ est neutre multiplicatif. En effet,

$$(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)(\alpha + \beta) = \varepsilon_1\alpha + \varepsilon_2\alpha + \varepsilon_3\alpha + \varepsilon_1\beta + \varepsilon_2\beta + \varepsilon_3\beta$$

$$\begin{aligned}
&= 0 + \alpha + 0 + 0 + 0 + \beta \\
&= \alpha + \beta
\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ K & K & 0 \\ K & K & K \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ a & e_2 & 0 \\ c & b & e_3 \end{bmatrix} \mid e_1, e_2, e_3, a, b, c \in K \right\}$$

On a une bijection

$$\begin{aligned}
&\begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ K & K & 0 \\ K & K & K \end{bmatrix} \rightarrow KQ \\
E_1 = \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \varepsilon_1 \\
&\vdots \\
A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \alpha \\
B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \beta \\
C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \beta\alpha
\end{aligned}$$

qui se comporte bien avec les produits

$$\begin{aligned}
BA &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= C
\end{aligned}$$

Définition. Soit A un anneau.

1. $a \in A_* = A \setminus \{0\}$ est un *diviseur de 0* s'il existe un autre élément $b \in A_*$ t.q. $ab = 0$,
2. A est dit *intègre* s'il est commutatif et n'a pas de diviseur de 0.

Exemple. 1. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{R}[x, y], \dots$ sont tous intègres,

2. $\mathbb{Z}_n$ est intègre si, et seulement si, n est premier.

En général, les diviseurs de 0 dans $\mathbb{Z}_n$ sont les $\bar{b}$ où $\text{pgcd}(b, n) > 1$.

Remarque. Dans un anneau non intègre, la “loi de simplification” ne tient pas.

Exemple. Dans $\mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned}
x^2 - 3x + 2 &= 0 \\
(x - 2)(x - 1) &= 0 \\
x - 2 = 0 \text{ ou } x - 1 &= 0 \\
x = 2 \text{ ou } x &= 1
\end{aligned}$$

Dans $\mathbb{Z}_6$,

$$\begin{aligned}
x^2 - \bar{3}x + \bar{2} &= 0 \\
(x - \bar{2})(x - \bar{1}) &= 0
\end{aligned}$$

On a des solutions : $x = \bar{1}, x = \bar{2}, x = \bar{4}, x = \bar{5}$.

Proposition. Soit A un anneau commutatif. Alors, A est intègre si, et seulement si, la loi de simplification tient, c'est-à-dire, $ab = ac, a \neq 0$ implique $b = c$.

Démonstration. $\Rightarrow$: Supposons que A est intègre et soient $a, b, c \in A$ t.q. $a \neq 0$ et $ab = ac$. On a alors $ab - ac = 0$, donc $a(b - c) = 0$. Comme A est intègre et $a \neq 0$, on a que $b - c = 0$, donc $b = c$. ■

$\Leftarrow$: Supposons que $a \neq 0$ et a est un diviseur de 0. Alors, $\exists b \neq 0 \in A$ t.q. $ab = 0$. Donc, $ab = a0$, alors $b = 0$, une contradiction. ■

□

Définition. Soit A un anneau. $a \in A$ est une *unité* s'il est inversible, c'est-à-dire, $\exists a' \in A$ t.q. $aa' = a'a = 1_A$. L'ensemble des unités de A est noté $\mathcal{U}(A)$.

Exemple. 1. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$,
 2. $\mathcal{U}(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}_*$,
 3. $\mathcal{U}(\mathbb{R}[x]) = \mathbb{R}_*$, les polynômes de degré 0 non nuls,
 4. Soit G un groupe et $A = K^{(G)}$, alors les éléments du groupe sont des unités de A , $G \subseteq \mathcal{U}(A)$,
 5. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) = ?$. $1, i, -1, -i \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$. Supposons que $a+bi \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$ et $c+di$ sont inverse. Alors, $(a+bi)(c+di) = 1$, alors $|a+bi| |c+di| = 1$, donc $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 1$, d'où $a^2 + b^2 = 1$, donc $a^2 = 1$ ou $b^2 = 1$, ainsi $a = \pm 1$ ou $b = \pm 1$.

Définition. Un corps est un anneau commutatif t.q. tout élément non nul est une unité.

Exemple. 1. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des corps,
 2. $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \left\{ x + y\sqrt{d} \mid x, y \in \mathbb{Q} \right\}$ est un anneau. Voyons que c'est un corps. Soit $x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]_*$. Dans $\mathbb{C}$,
 on a $\frac{1}{x + y\sqrt{d}} = \frac{x - y\sqrt{d}}{x^2 - dy^2} = \frac{x}{x^2 - dy^2} + \left(\frac{-y}{x^2 - dy^2} \right) \sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$.
 3. $\mathbb{Z}_n$ est un corps si, et seulement si, n est premier.