

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра теории функций и стохастического анализа

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (БАЗОВОЙ) ПРАКТИКЕ

студента 4 курса 451 группы

направления 38.03.05 — Бизнес-информатика

механико-математического факультета

Чайковского Петра Ильича

Место прохождения: завод "Тантал"

Сроки прохождения: с 29.06.2019 г. по 26.07.2019 г.

Оценка:

Руководитель практики от СГУ

доцент, к. ф.-м. н.

Н. Ю. Агафонова

Руководитель практики от организации

ведущий программист

Д. Э. Кнутов

Саратов 2019

Тема практики: «Правила оформления курсовых и дипломных работ»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Постановка задачи. Описание метода её решения.....	5
2 Вычисление сложности проблемы.	8
3 Программа решения на языке C++.	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Работа с матрицами и системами линейных уравнений представляет особенно большие проблемы, если пользоваться неэффективными методами решения. Поиск решений систем линейных уравнений составляет обязательную часть решения некоторых прикладных задач, поэтому на практике возникает необходимость составления эффективных методов решения систем линейных уравнений, поиска определителей, нахождения собственного значения и собственного вектора матрицы. Одним из таких эффективных методов решения является НВП-разложение.

1 Постановка задачи. Описание метода её решения.

Для того, чтобы более корректно поставить задачу вычисления определителя невырожденной матрицы и описать метод её решения, необходимо ввести несколько обязательных определений.

Определение. НВ-разложением (НВ - по первым буквам слов "нижняя" и "верхняя") $(m \times n)$ - матрицы A , $m \leq n$, называется представление её в виде $A = LU$, где L - нормированная нижняя треугольная $(m \times n)$ - матрица, а U - верхняя треугольная $(m \times n)$ - матрица.

Уравнение $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, где A - это $(n \times n)$ - матрица, \mathbf{x} - n -мерный вектор-столбец неизвестных, а \mathbf{b} - n -мерный вектор-столбец, можно решить, сначала НВ-разложив A в произведение LU в предположении, что это возможно. Затем представим $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ в виде $LU\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Чтобы получить решение \mathbf{x} , решим сначала $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ относительно \mathbf{y} , а затем $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ относительно \mathbf{x} .

Трудность применения метода заключается в том, что у матрицы A может не быть НВ-разложения, даже если она невырожденна. Однако если матрица A невырожденна, то найдётся такая матрица перестановки P , что AP^{-1} имеет НВ-разложение.

Изложим алгоритм, который по любой невырожденной матрице A находит такие матрицы L, U и P , что $A = LUP$. Матрицы L, U и P образуют НВП-разложение (НВП - по первым буквам слов "нижняя" "верхняя" и "перестановка") матрицы A :

Вход. Невырожденная $(n \times n)$ - матрица M , n - степень числа 2.

Выход. Матрицы L, U и P , для которых $M = LUP$, причём L - нормированная нижняя треугольная матрица, U - верхняя треугольная и P - матрица перестановки.

Метод. Вызываем процедуру **МНОЖИТЕЛЬ**(M, n, n), где **МНОЖИТЕЛЬ** - рекурсивная процедура, описанная ниже.

Каждый рекурсивный вызов процедуры **МНОЖИТЕЛЬ** происходит на $(m \times p)$ - подматрице A $(n \times n)$ - матрицы M . При каждом вызове m есть степень числа 2 и $m \leq p \leq n$. Выходом этой процедуры являются три матрицы L, U и P .

Опишем псевдокод процедуры **МНОЖИТЕЛЬ**:

```
1 procedure МНОЖИТЕЛЬ( $A, m, p$ ):
2   if  $m = 1$  then
3     begin
4       пусть  $L = [1]$  (т.е.  $L$  - нормированная  $(1 \times 1)$  - матрица);
5       найти, если можно, столбец с матрицы  $A$  с ненулевым
6         элементом, и пусть  $P$  будет  $(p \times p)$  - матрицей,
7         переставляющей столбцы 1 и  $s$ ;
8       пусть  $U = AP$ ;
9       return  $(L, U, P)$ 
10    end
11  else
12    begin
13      разбить  $A$  на  $((m/2) \times p)$  - матрицы  $B$  и  $C$ 
14      вызвать МНОЖИТЕЛЬ( $B, m/2, p$ ), чтобы получить  $L_1, U_1, P_1$ ;
15      вычислить  $D = CP_1^{-1}$ ;
16      вычислить  $G = D - FE^{-1}U_1$ ;
17      пусть  $G'$  - самые правые  $p - m/2$  столбцов матрицы  $G$ ;
18      вызвать МНОЖИТЕЛЬ( $G', m/2, p - m/2$ ) и получить  $L_2, U_2$  и  $P_2$ ;
19      пусть  $P_3$  будет  $(p \times p)$  - матрицей перестановки, у которой в
20        левом верхнем углу стоит  $I_{m/2}$ , а в правом нижнем  $P_2$ ;
21      вычислить  $H = U_1P_3^{-1}$ ;
22      пусть  $L$  - это  $(m \times m)$  - матрица, состоящая из  $L_1, O_{m/2}, FE^{-1}$  и  $L_2$ ;
23      пусть  $U$  - это  $(m \times p)$  - матрица, у которой в верхней части
24        стоит  $H$ , а в нижней  $O_{m/2}$  и  $U_2$ ;
25      пусть  $P$  - произведение  $P_3P_1$ ;
26      return  $(L, U, P)$ 
27    end
```

Листинг 1: Описание процедуры **МНОЖИТЕЛЬ**.

Разобравшись с формулировкой необходимых определений и демонстрации псевдокода обязательной процедуры, перейдём к рассмотрению одной из основных теорем, следствие из которой даёт оценку сложности НВП-разложения любой невырожденной $(n \times n)$ - матрицы.

Как впоследствии будет видно, задача вычисления определителя невырожденной матрицы может быть сведена к задаче умножения двух матриц.

Теорема 1. Пусть для каждого n можно умножить две $(n \times n)$ - матрицы за такое время $M(n)$, что при некотором $\varepsilon > 0$ неравенство $M(2m) \geq$

$2^{2+\varepsilon}M(m)$ выполняется для всех m (если проще, то здесь требуется, чтобы значение $M(n)$ было заключено между $n^{2+\varepsilon}$ и n^3 . Может оказаться, что $M(n) = kn^2 \log n$ для некоторой постоянной k ; тогда условие теоремы не удовлетворяется.). Тогда найдётся такая постоянная k , что алгоритм нахождения матриц L, U и P , таких что $A = LUP$, тратит не более $kM(n)$ времени для любой невырожденной матрицы.

2 Вычисление сложности проблемы.

3 Программа решения на языке C++.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

content...