

Zajęcia 1: Zbiór liczb rzeczywistych

2024-10-14

Definicja 1. Zbiór liczb rzeczywistych \mathbb{R} to zbiór spełniający następujące aksjomaty:

1. Aksjomaty ciała, czyli określamy na \mathbb{R} działania dodawania i mnożenia takie, że $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ jest ciałem.
2. Aksjomaty porządku, czyli określamy na \mathbb{R} relację silnego porządku $<$, który jest przechodni, silnie antysymetryczny i liniowy.
3. Aksjomaty zgodności działań z porządkiem, czyli

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad (x < y) \implies (x + z < y + z)$$

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad (x < y \wedge 0 < z) \implies (xz < yz).$$

4. Aksjomat ciągłości (zasada ciągłości Dedekinda), który mówi, że zbioru \mathbb{R} nie można podzielić na dwa podzbiory A, B takie, że

$$A, B \neq \emptyset$$

$$\forall a \in A, b \in B \quad a < b$$

$$\forall a \in A \quad \exists \tilde{a} \in A \quad a < \tilde{a}$$

$$\forall b \in B \quad \exists \tilde{b} \in B \quad \tilde{b} < b.$$

Uwaga. Można wykazać, że \mathbb{R} jest jedynym zbiorem spełniającym te aksjomaty z dokładnością do izomorfizmu.**Twierdzenie 1.** Niech $E \neq \emptyset$ będzie ograniczonym z góry (dołu) podzbiorem \mathbb{R} . Istnieje $\sup E$ ($\inf E$).**Dowód.** Niech B będzie zbiorem ograniczeń górnych zbioru E . Niech $A = \mathbb{R} \setminus B$. Zbiory A, B spełniają trzy pierwsze warunki z aksjomatu ciągłości (trzeci wynika z tego, że $a \in A$ nie jest ograniczeniem górnym E , a więc istnieje $x \in E$ taki, że $a < x$, a definiując $\tilde{a} = \frac{1}{2}(x + a)$ mamy $a < \tilde{a} < x$, gdzie z drugiej nierówności wynika $\tilde{a} \in A$). Zatem musi istnieć takie $b \in B$, że $\forall \tilde{b} \in B \quad b \leq \tilde{b}$. Takie b jest elementem najmniejszym zbioru B , a więc właśnie $\sup E$. Analogicznie dowodzimy drugą wersję twierdzenia. \square **Twierdzenie 2.** Niech $\emptyset \neq E \subseteq \mathbb{R}$ będzie zbiorem ograniczonym. Zachodzi

$$\inf E \leq \sup E$$

$$\inf E = \sup E \implies |E| = 1.$$

Dowód. Niech $e \in E$. Mamy $\inf E \leq e \leq \sup E$. Gdyby E miał element $\tilde{e} > e$, to byłoby $\inf E \leq e < \tilde{e} \leq \sup E$, a więc dla zbiorów wieloelementowych nie może zachodzić równość z wypowiedzi. \square **Definicja 2.** Zbiór $I \subseteq \mathbb{R}$ nazywamy przedziałem, jeśli

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad (x, z \in I \wedge x < y < z) \implies y \in I.$$

Twierdzenie 3. Każdy przedział w \mathbb{R} zalicza się do jednej z kategorii:

1. Przedział pusty \emptyset .
2. Niepusty przedział ograniczony $[a, b]$, $(a, b]$ i tak dalej (wszystkie kombinacje)
3. Niepusty przedział ograniczony z góry i nieograniczony z dołu $(-\infty, b]$, $(-\infty, b)$
4. Niepusty przedział nieograniczony z góry i ograniczony z dołu $[a, +\infty)$, $(a, +\infty)$
5. Niepusty przedział nieograniczony \mathbb{R} .

Dowód. Niech $I \subseteq \mathbb{R}$ będzie niepustym przedziałem. Jeśli jest nieograniczony z góry, to jego prawym końcem będzie $+\infty$. Jeśli jest, to niech $b = \sup I$. Zauważmy, że jeśli $x \in I$ oraz istnieje takie $b \neq y \notin I$, że $x < y < b$, to $[y, b] \not\subseteq I$, a więc cokolwiek z tego przedziału jest ograniczeniem górnym I , co daje sprzeczność z definicją b . Zatem każda liczba mniejsza od b należy do I (do kresu dolnego) i pozostaje tylko decyzja, czy przedział jest domknięty. Analogicznie dla lewego krańca. \square

Twierdzenie 4. Niech $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, $a_n \leq b_n$ dla $n \in \mathbb{N}$. Zdefiniujmy $I_n = [a_n, b_n]$. Niech $I_0 \supset I_1 \supset \dots$. Zachodzi

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset.$$

Dowód. Niech $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Weźmy $a = \sup A$. Mamy $\forall_{p \in \mathbb{N}} a_p \leq a$ oraz $\forall_{q \in \mathbb{N}} a \leq b_q$ (bo każde b_q jest ograniczeniem górnym A). Zatem $a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. \square

Twierdzenie 5 (Zasada minimum). Niech $E \subseteq \mathbb{N}$ będzie niepusty. Wtedy E ma element najmniejszy.

Dowód. E jest ograniczony z dołu przez 0, a więc ma infimum $m = \inf E \geq 0$. Musi być $[m, m+1) \cap E \neq \emptyset$, bo inaczej m nie byłoby infimum. W tym przedziale znajduje się dokładnie jedna liczba naturalna n , a więc $m = n \in E$. \square

Twierdzenie 6 (Zasada indukcji). Jeśli dla $E \subseteq \mathbb{N}$ zachodzi $0 \in E$ oraz $n \in E \implies n+1 \in E$, to $E = \mathbb{N}$.

Dowód. Przypuśćmy, że $\mathbb{N} \setminus E \neq \emptyset$. Wtedy ten zbiór ma element najmniejszy $k \neq 0$. Zatem $k-1 \in E$, a więc $k \in E$ – sprzeczność \nmid . \square

Twierdzenie 7. Zbiór \mathbb{R} jest nieprzeliczalny.

Dowód. Przypuśćmy, że $\mathbb{R} = \{c_n : n \in \mathbb{N}\}$. Wybieramy ciąg przedziałów $\{I_n\}$ taki, że

$$I_0 = [a_0, b_0], c_0 \notin I_0$$

$$\vdots$$

$$I_n = [a_n, b_n], c_n \notin I_n, I_n \subseteq I_{n-1}.$$

Możemy tak zrobić, bo jeśli $c_n \in [a_{n-1}, b_{n-1}]$, to wystarczy wziąć $b_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + c_n)$, $a_n = a_{n-1}$.

Teraz $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \emptyset$ (bo nie zawiera żadnej liczby rzeczywistej), ale wiemy, że takie przecięcie jest niepuste – \nmid . \square

Wniosek. Każdy przedział $I \subseteq \mathbb{R}$ mający co najmniej dwa elementy jest nieprzeliczalny.

Definicja 3. Przestrzenią metryczną nazywamy parę (X, d) , gdzie X jest zbiorem a funkcja

$$d : X \times X \ni (x, y) \rightarrow d(x, y) \in [0, +\infty)$$

jest nazywana metryką i spełnia własności:

1. $\forall_{x, y \in X} d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. $\forall_{x, y \in X} d(x, y) = d(y, x)$ (symetria)
3. $\forall_{x, y, z \in X} d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (nierówność trójkąta).

Definicja 4. Jeśli (X, d) jest przestrzenią metryczną oraz $a \in X$ i $r \in (0, +\infty)$, to zbiory

$$K(a, r) = \{x \in X : d(x, a) < r\},$$

$$\overline{K}(a, r) = \{x \in X : d(x, a) \leq r\},$$

$$S(a, r) = \{x \in X : d(x, a) = r\}$$

nazywamy kolejno kulą otwartą, kulą domkniętą oraz sferą o środku a i promieniu r .

Definicja 5. Ustalmy przestrzeń metryczną (X, d) . Zbiór $U \subseteq X$ nazywamy otwartym, jeśli

$$\forall a \in U \exists r > 0 \ K(a, r) \subseteq U.$$

Rodzinę wszystkich podzbiorów otwartych nazywamy topologią (X, d) i oznaczamy ją $\text{top}_d X$. Za-uważmy, że $\emptyset, X \in \text{top}_d X$.

Definicja 6. Otoczeniem punktu $a \in X$ nazywamy każdy zbiór otwarty go zawierający.

Definicja 7. Zbiór $F \subseteq X$ nazywamy domkniętym w X , jeśli F^c jest otwarty w X .

Definicja 8. Dla $A \subseteq X$ wnętrzem zbioru A nazywamy zbiór

$$\text{int } A = \bigcup \{U : U \text{ otwarty w } X, U \subseteq A\}.$$

Elementy tego zbioru to punkty wewnętrzne A .

Definicja 9. Dla $A \subseteq X$ domknięciem zbioru A nazywamy zbiór

$$\bar{A} = \bigcap \{F : F \text{ domknięty w } X, A \subseteq F\}.$$

Definicja 10. Brzegiem zbioru A nazywamy zbiór

$$\partial A = \bar{A} \setminus \text{int } A.$$

Jego elementy nazywamy punktami brzegowymi A .

Propozycja 1. Zbiór $\text{int } A$ jest otwarty, a \bar{A} i ∂A są domknięte.

Dowód. $\text{int } A$ jest otwarty jako suma zbiorów otwartych. Podobnie \bar{A} jest przecięciem zbiorów domkniętych. Mamy $\partial A = \bar{A} \cap (\text{int } A)^c$, co jest przecięciem zbiorów domkniętych. \square

Definicja 11. Podzbiór A przestrzeni metrycznej (X, d) nazywamy:

1. ograniczonym, jeśli $\exists a \in X, r > 0 \ A \subseteq \bar{K}(a, r)$
2. brzegowym, jeśli $\text{int } A = \emptyset$
3. gęstym w X , jeśli $\bar{A} = X$
4. nigdziegęstym, jeśli $\text{int } \bar{A} = \emptyset$

Propozycja 2. Jeśli A jest nigdziegęsty, to jest brzegowy.

Dowód. Mamy $A \subseteq \bar{A}$, bo \bar{A} jest przecięciem zbiorów, z których każdy zawiera A . Podobnie $\text{int } A \subseteq \text{int } \bar{A}$, bo każdy zbiór otwarty zawierający się w A zawiera się też w \bar{A} . \square

Propozycja 3. Zbiór A jest brzegowy wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór $X \setminus A$ jest gęsty.

Dowód. (\implies) Jeśli A jest brzegowy, to każde otoczenie dowolnego punktu z A zawiera punkt z A^c . Zatem \bar{A}^c zawiera też wszystkie punkty z A , bo gdyby nie zawierał jakiegoś $a \in A$, to istnieje zbiór domknięty zawierający A^c , który nie zawiera a , a więc jego otwarte dopełnienie zawiera a i istnieje otoczenie a , w którym nie ma punktu z A^c .

(\impliedby) Zbiór \bar{A}^c zawiera wszystkie punkty z A , a więc podobnie jak przedtem każde otoczenie każdego punktu z A zawiera punkt z A^c i $\text{int } A = \emptyset$. \square

Definicja 12. Element $a \in X$ nazywamy punktem skupienia zbioru A , jeśli dla każdego U będącego otoczeniem a zachodzi

$$(U \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Zbiór punktów skupienia oznaczamy A' . Punkty zbioru $A \setminus A'$ nazywamy punktami izolowanymi zbioru A .

Przykład (Metryka dyskretna). Określając na zbiorze X funkcję

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

dostajemy metrykę zwaną metryką dyskretną.

Przykład (Metryka przeniesiona przez injekcję). Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną a funkcja $\varphi : Y \rightarrow X$ injekcją. Przyjmując

$$g(x, y) = d(\varphi(x), \varphi(y))$$

dla $x, y \in Y$ dostajemy przestrzeń metryczną (Y, g) .

Przykład (Iloczyn przestrzeni metrycznych). Jeśli $(X_1, d_1), \dots, (X_m, d_m)$ są przestrzeniami metrycznymi, to dla krotek elementów z nich $x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m)$ określamy

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^m d_i(x_i, y_i)$$

i otrzymujemy przestrzeń metryczną na iloczynie kartezjańskim.

Definicja 13. Dla przestrzeni metrycznej (X, d) oraz zbioru $Y \subseteq X$ funkcja $d|_{Y \times Y}$ jest metryką na Y zwaną metryką indukowaną. Parę $(Y, d|_{Y \times Y})$ nazywamy podprzestrzenią metryczną (X, d) .

Definicja 14. Moduł liczby rzeczywistej x to funkcja

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}.$$

Definicja 15. Metrykę euklidesową na \mathbb{R} nazywamy funkcję

$$d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \ni (x, y) \rightarrow |x - y| \in [0, +\infty).$$

Jest ona metryką, a kule w niej to przedziały (odpowiednio otwarte i domknięte).

Twierdzenie 8 (O istnieniu pierwiastków). Niech $x \in [0, +\infty)$ oraz $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Istnieje jedyny taki $y \in \mathbb{R}$, że $y \geq 0$ oraz $y^n = x$.

Dowód. Dla $0 \leq y_1 \leq y_2$ mamy $y_1^n \leq y_2^n$. Zatem jedność jest oczywista. Mamy $y^n = 0 \iff y = 0$. Wystarczy rozważyć $x > 0$.

Zauważmy, że dla $0 < a < b$ jest

$$b^n - a^n = (b - a)(b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + a^{n-1}) \leq (b - a) \cdot nb^{n-1}.$$

Określmy zbiór $E = \{t \in (0, +\infty) : t^n < x\}$. Kładąc $t_x = \frac{x}{x+1} < 1$ mamy $t_x^n < t_x < x$, a więc E jest niepusty. Jednocześnie $x + 1$ jest jego ograniczeniem górnym, gdyż

$$t \in E \implies t^n < x \implies t^n < x + 1 \implies t^n < (x + 1)^n \implies t < x + 1.$$

Zatem możemy określić $y = \sup E$. Pokażemy, że $y^n = x$.

Przypuśćmy, że $y^n < x$. Pokażemy, że istnieje takie $h > 0$, że $(y+h)^n < x$, co da sprzeczność z definicją y . Mamy

$$(y+h)^n = y^n + ((y+h)^n - y^n) \leq y^n + hn(y+h)^{n-1},$$

a więc wystarczy znaleźć takie h , że

$$y^n + hn(y+h)^{n-1} < x,$$

co dla $h \in (0, 1)$ jest spełnione przez dowolne $h < \frac{x-y^n}{n(y+1)^{n-1}} \leq \frac{x-y^n}{n(y+h)^{n-1}}$, które oczywiście istnieje.

Przypuśćmy, że $y^n > x$. Pokażemy, że istnieje $h \in (0, y)$ takie, że $(y-h)^n > x$, a więc y nie jest najmniejszym ograniczeniem górnym. Podobnie jak przedtem dostajemy nierówność

$$(y-h)^n = y^n - (y^n - (y-h)^n) \geq y^n - hny^{n-1} > x,$$

a spełniające ją h na pewno istnieje. \square

Definicja 16. Liczbę $y \in [0, +\infty)$ taką, że $y^n = x$ dla $x \in [0, +\infty)$ nazywamy n -tym pierwiastkiem liczby x i oznaczamy ją $\sqrt[n]{x}$.

Zajęcia 2: Rozszerzone liczby rzeczywiste i zespolone

2024-11-04

Definicja 17. Rozszerzony zbiór liczb rzeczywistych to zbiór $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, gdzie $\pm\infty \notin \mathbb{R}$ oraz $+\infty \neq -\infty$.

Definicja 18 (Porządek na $\overline{\mathbb{R}}$). Przyjmujemy $-\infty < +\infty$ oraz $\forall_{x \in \mathbb{R}} -\infty < x, x < +\infty$. To daje naturalną definicję przedziałów $[-\infty, x)$ i innych tego typu.

Propozycja 4. Każdy zbiór w $\overline{\mathbb{R}}$ jest ograniczony o kresach w $\overline{\mathbb{R}}$.

Dowód. Jeśli jest ograniczony w \mathbb{R} , to w $\overline{\mathbb{R}}$ ma taki sam kres, a jeśli nie, to jest nim jedna z nieskończoności. \square

Uwaga. Mamy $\inf \emptyset = +\infty$ oraz $\sup \emptyset = -\infty$.

Definicja 19. Dodawanie na elementach $\overline{\mathbb{R}}$ definiujemy tak, jak podpowiada intuicja. Dodatkowo (nie jest to standardowe) zakładamy, że $+\infty + (-\infty) = 0$.

Definicja 20. Definiujemy moduł $|+\infty| = |-\infty| = +\infty$.

Definicja 21. Metrykę na $\overline{\mathbb{R}}$ definiujemy za pomocą funkcji

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x = +\infty \\ \frac{x}{1+|x|}, & x \in \mathbb{R} \\ -1, & x = -\infty \end{cases},$$

która jest bijekcją. Teraz możemy zdefiniować $\bar{d}(x, y) := d(\varphi(x), \varphi(y)) = |\varphi(x) - \varphi(y)|$ dla $x, y \in \overline{\mathbb{R}}$. W ten sposób mamy przestrzeń metryczną $(\overline{\mathbb{R}}, \bar{d})$, w której największa odległość to $\bar{d}(-\infty, +\infty) = 2$.

Definicja 22 (Liczby zespolone). W zbiorze \mathbb{R}^2 wprowadzamy strukturę ciała:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \quad z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$$

dla $z_i = (x_i, y_i)$. Trójka $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ jest ciałem o $0 := (0, 0)$ oraz $1 := (1, 0)$. Otrzymane ciało oznaczamy \mathbb{C} i nazywamy liczbami zespolonymi. Często piszemy $(x, y) = x + iy$.

Uwaga. Ciało \mathbb{R} zanurza się w \mathbb{C} za pomocą iniekcji $x \rightarrow (x, 0)$.

Propozycja 5. W \mathbb{C} zachodzi nierówność trójkąta

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

Dowód.

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (z + w)(\overline{z + w}) = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} \\ &= |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z\bar{w}| = (|z| + |w|)^2. \end{aligned}$$

□

Definicja 23. Wprowadzamy metrykę na \mathbb{C} za pomocą modułu:

$$d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \ni (z, w) \rightarrow d(z, w) = |z - w| \in [0, +\infty).$$

Moduł jest tu tożsamy z długością wektora $z \in \mathbb{C}$, a kule nazywamy często kołami, bo tak wyglądają na płaszczyźnie.

Twierdzenie 9 (Nierówność Cauchy'ego-Schwarza). Niech $z_1, \dots, z_n, w_1, \dots, w_n \in \mathbb{C}$. Zachodzi

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \bar{w}_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n |z_k|^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n |w_k|^2}.$$

Dowód. Kładziemy $A = \sum_{k=1}^n |z_k|^2$, $B = \sum_{k=1}^n |w_k|^2$, $C = \sum_{k=1}^n z_k \bar{w}_k$. Mamy

$$B = 0 \iff w_1 = \dots = w_n = 0$$

i wtedy obie strony nierówności się zerują. Teraz $B > 0$ i przekształcamy

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{k=1}^n |Bz_k - Cw_k|^2 = \sum_{k=1}^n B^2 z_k \bar{z}_k + C \bar{C} w_k \bar{w}_k - B \bar{C} z_k \bar{w}_k - B C \bar{z}_k w_k \\ &= B^2 A + |C|^2 B - B C \sum_{k=1}^n \bar{z}_k w_k - B \bar{C} \sum_{k=1}^n z_k \bar{w}_k \\ &= B^2 A + |C|^2 B - (B C \bar{C} + B \bar{C} C) = B (AB - |C|^2). \end{aligned}$$

Zatem $AB - |C|^2 \geq 0$, a to daje tezę: $|C| \leq \sqrt{A}\sqrt{B}$.

□

Definicja 24 (Sfera Riemanna). Wybieramy element $\infty \notin \mathbb{C}$ i określamy $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Taki zbiór nazywamy płaszczyzną domkniętą lub sferą Riemanna.

Definicja 25. Rozważmy zbiór $\mathbb{S} = \{(x, y, t) \in \mathbb{C} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 + t^2 = 1\}$. Jest on sferą w \mathbb{R}^3 o środku w $(0, 0, \frac{1}{2})$ i promieniu $\frac{1}{2}$. Możemy rzutować punkty płaszczyzny podporowej (zespolonej) na sferę, łącząc je z północnym biegunem sfery. Jest to odwracalne przekształcenie


$$h(z) = h(x, y) = \left(\frac{x}{1 + |z|^2}, \frac{y}{1 + |z|^2}, \frac{|z|^2}{1 + |z|^2} \right),$$

które uzupełniamy do bijekcji $H : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{S}$ kładąc $H(\infty) = (0, 0, 1)$.

Po zastosowaniu na \mathbb{S} metryki euklidesowej dostajemy na $\hat{\mathbb{C}}$ metrykę przeniesioną przez bijekcję:

$$g(z, w) = \frac{|z - w|}{\sqrt{1 + |z|^2} \sqrt{1 + |w|^2}},$$

$$g(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z|^2}}.$$



Rysunek 1: Sfera Riemanna wraz z rzutem na płaszczyznę.

Notacja. Wszędzie tam, gdzie dowód dla \mathbb{R} przebiega tak samo jak dla \mathbb{C} , będziemy pisać \mathbb{K} .

Zajęcia 3: Zbieżność

2024-12-02

Definicja 26. Ciągiem w zbiorze X nazywamy dowolną funkcję $\mathbb{N} \ni n \rightarrow a_n \in X$. Ciąg oznaczamy $\{a_n\}$ lub $\{a_n\}_1^\infty$ lub (a_n) lub $(a_n)_1^\infty$.

Definicja 27. Jeśli $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ są ciągami w zbiorze X , to mówimy, że $\{b_n\}$ jest podciągiem $\{a_n\}$, jeśli istnieje ściśle rosnąca funkcja $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ taka, że $b_n = a_{\varphi(n)}$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$.

Definicja 28. Mówimy, że ciągi $\{a_n\}$ oraz $\{b_n\}$ różnią się wyrazami początkowymi, jeśli istnieje takie $N \in \mathbb{N}$, że $\forall n \geq N \quad b_n = a_n$.

Definicja 29. Niech $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ będzie bijekcją. Mówimy, że $\{b_n\}$ jest permutacją ciągu $\{a_n\}$, jeśli $b_n = a_{\sigma(n)}$ dla $n \in \mathbb{N}$. Jest to permutacja zadana przez σ .

Definicja 30. Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną, $\{a_n\}$ ciągiem w X oraz $a \in X$. Mówimy, że a jest granicą ciągu $\{a_n\}$, jeśli

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad d(a_n, a) < \varepsilon.$$

Ciąg $\{a_n\}$ nazywamy zbieżnym do granicy a , co zapisujemy $a_n \rightarrow a$ ($n \rightarrow +\infty$) albo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

Uwaga. Warunek $d(a_n, a) < \varepsilon$ jest równoważny $a_n \in K(a, \varepsilon)$. Zatem ciąg jest zbieżny do a , jeśli w dowolnym otoczeniu a leżą prawie wszystkie jego wyrazy. To pozwala zdefiniować zbieżność w przestrzeni topologicznej.

Notacja. Napis $\exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n \geq N}$ często skraccamy do zapisu $n \gg 1$, co czytamy: dla odpowiednio dużych n .

Propozycja 6. Zachodzi $a_n \rightarrow a \iff d(a_n, a) \rightarrow 0$.

Dowód. Mamy $d(a_n, a) < \varepsilon \iff |d(a_n, a) - 0| < \varepsilon$, a więc definicje są sobie równoważne. \square

Propozycja 7. Jeśli $a_n \rightarrow a$ i wybierzemy podciąg $(a_{n_k}) \subseteq (a_n)$, to $a_{n_k} \rightarrow a$ ($k \rightarrow \infty$).

Dowód. Niech $\varepsilon > 0$. Wybierzmy takie N , że $\forall_{n \geq N} d(a_n, a) < \varepsilon$. Niech $K \in \mathbb{N} : \forall_{k \geq K} n_k \geq N$. Wtedy $\forall_{k \geq K} d(a_{n_k}, a) < \varepsilon$, a to chcieliśmy. \square

Twierdzenie 10. Ciąg w przestrzeni metrycznej (X, d) może mieć co najwyżej jedną granicę.

Dowód. Załóżmy, że dla $b_1, b_2 \in X$ takich, że $b_1 \neq b_2$ mamy $a_n \rightarrow b_1$ oraz $a_n \rightarrow b_2$. Weźmy $\varepsilon = \frac{1}{2}d(b_1, b_2)$. W każdej z kul $K(b_1, \varepsilon)$, $K(b_2, \varepsilon)$ leżą prawie wszystkie wyrazy $\{a_n\}$, ale z nierówności trójkąta jest $K(b_1, \varepsilon) \cap K(b_2, \varepsilon) = \emptyset$, co daje sprzeczność. \square

Uwaga. To twierdzenie nie działa w przestrzeniach topologicznych.

Definicja 31. Mówimy, że a jest punktem skupienia ciągu $\{a_n\}$, jeśli

$$\forall_{\varepsilon > 0, N \in \mathbb{N}} \exists_{n \geq N} d(a_n, a) < \varepsilon.$$

Słownie: dowolnie blisko a leżą dowolnie duże elementy $\{a_n\}$.

Twierdzenie 11. Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną, $\{a_n\}$ ciągiem w X , $a \in X$. Punkt a jest punktem skupienia $\{a_n\}$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $\{b_n\}$ będący podciągiem $\{a_n\}$ taki, że $b_n \rightarrow a$.

Dowód. (\implies) Zdefiniujemy $\{a_{n_k}\}$ w następujący sposób: dla każdego $k \in \mathbb{N}$ niech a_{n_k} będzie takim elementem ciągu $\{a_n\}$, że $d(a_{n_k}, a) < \frac{1}{2k}$ oraz $n_k > n_i$ dla każdego $i < k$. Taki element istnieje, bo a jest punktem skupienia. Określony ciąg oczywiście jest zbieżny do a .

(\impliedby) Jeśli podciąg $\{b_n\}$ jest zbieżny do a , to dla każdego $\varepsilon > 0$ prawie wszystkie elementy $\{b_n\}$ są odpowiednio blisko a . Zatem w szczególności istnieją dowolnie duże elementy będące odpowiednio blisko a . \square

Propozycja 8. W przestrzeni metrycznej (X, d) ciąg $\{a_n\}$ jest zbieżny do $a \in X$ wtedy i tylko wtedy, gdy z każdego jego podciągu da się wybrać podciąg zbieżny do a .

Dowód. (\implies) Jeśli $\{a_n\}$ jest zbieżny do a , to każdy jego podciąg też.

(\impliedby) Załóżmy, że $\{a_n\}$ nie jest zbieżny do a , czyli istnieje $\varepsilon > 0$ taki, że dla nieskończenie wielu elementów $\{a_n\}$ zachodzi $d(a_n, a) > \varepsilon$. Rozważmy podciąg składający się z tych elementów. Musi on mieć podciąg zbieżny do a , co daje sprzeczność, bo wszystkie jego wyrazy są oddalone od a o co najmniej ε . \square

Twierdzenie 12. Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną, niech $A \subseteq X$. A jest domknięty w X wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu $\{a_n\} \subseteq A$ o granicy a zachodzi $a \in A$.

Dowód. (\implies) Niech $\{a_n\} \subseteq A$ będzie ciągiem, a $a \in X$ jego granicą. Jeśli $a \notin A$, to $U = A^c$ jest otwartym otoczeniem a . Zatem prawie wszystkie wyrazy $\{a_n\}$ leżą w U , czyli poza A – sprzeczność.

(\impliedby) Jeśli A nie jest domknięty, to $\bar{A} \setminus A \neq \emptyset$. Wybieramy $a \in \bar{A} \setminus A$. Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy $A \cap K(a, 2^{-n}) \neq \emptyset$, bo do domknięcia należą te punkty, które mają dowolnie blisko siebie punkt z A . Wybierając $a_n \in A$ tak, by $a_n \in K(a, 2^{-n})$ dostajemy ciąg zbieżny do a , a więc powinno być $a \in A$ – sprzeczność. \square

Twierdzenie 13. Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną, $A \subseteq X$, $a \in X$. $a \in A'$ (jest punktem skupienia A) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje ciąg $\{a_n\} \subseteq A \setminus \{a\}$ taki, że $a_n \rightarrow a$.

Dowód. (\implies) a jest punktem skupienia, a więc dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$(K(a, 2^{-n}) \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Biorąc a_n jako element tego zbioru dostajemy ciąg zbieżny do a .

(\impliedby) Dla każdego otoczenia a prawie wszystkie elementy $\{a_n\}$ do niego należą. Zatem dowolne otoczenie ma niepuste przecięcie z $A \setminus \{a\}$. \square

Twierdzenie 14. Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną, $A \subseteq X$. Zachodzi $\overline{A} = A \cup A'$.

Dowód. Mamy $A \cup A' \subseteq \overline{A}$, bo jeśli $a \in A'$, to istnieje ciąg w $A \setminus \{a\}$ zbieżny do a , a zatem jest to też ciąg w A i $a \in \overline{A}$ z domkniętości \overline{A} . Biorąc $a \in \overline{A}$ możemy znaleźć ciąg $\{a_n\}$ w A zbieżny do a – mamy $K(a, 2^{-n}) \cap A \neq \emptyset$. Jeśli $a \notin A$, to jest to ciąg w $A \setminus \{a\}$, a więc $a \in A'$. Z tego wynika $\overline{A} \subseteq A \cup A'$. \square

Definicja 32. Średnicą zbioru $A \subseteq X$ nazywamy element zbioru $[0, +\infty]$ określony równością

$$\text{diam } A = \begin{cases} 0, & A = \emptyset \\ \sup d(A \times A), & A \neq \emptyset \end{cases},$$

gdzie supremum określamy w $\overline{\mathbb{R}}$.

Propozycja 9. Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną, $A \subseteq X$. Następujące warunki są równoważne:

1. A jest zbiorem ograniczonym
2. $\text{diam } A < +\infty$
3. $\forall a \in X \exists r > 0 \overline{K}(a, r) \supset A$.

Dowód. (1 \implies 2) Jeśli A jest ograniczony to zawiera się w pewnej kuli $K(b, r)$. Zatem dla dowolnych $a, a' \in A$ jest $d(a, a') \leq d(a, b) + d(a', b) \leq 2r$.

(2 \implies 3) Niech $\text{diam } A = t$. Niech $a' \in A$ (dla pustego A teza oczywista). Biorąc $r = d(a, a') + t$ dostajemy odpowiednią kulę.

(3 \implies 1) Dowolna taka kula świadczy o ograniczeniu zbioru. \square

Definicja 33. Ciąg $\{a_n\}$ w przestrzeni metrycznej (X, d) nazywamy ograniczonym, jeśli zbiór jego wyrazów $\{a_n \in X : n \in \mathbb{N}\}$ jest ograniczony.

Propozycja 10. Ciąg zbieżny w (X, d) jest ograniczony.

Dowód. Niech ciąg $\{a_n\}$ będzie zbieżny do a . Niech $N \in \mathbb{N}$ będzie takie, że $\forall n \geq N d(a_n, a) < 1$. Mamy $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \overline{K}(a, \max(1, \max_{i < N} \{d(a_i, a)\}))$. \square

Definicja 34 (Ciąg Cauchy'ego). Ciąg $\{a_n\}$ w przestrzeni metrycznej (X, d) nazywamy ciągiem Cauchy'ego, jeśli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall p, q \geq N d(a_p, a_q) < \varepsilon.$$

Mówimy o takim ciągu, że spełnia warunek Cauchy'ego.

Definicja 35 (Przestrzeń zupełna). Mówimy, że przestrzeń metryczna (X, d) jest zupełna, jeśli każdy ciąg Cauchy'ego w niej jest zbieżny.

Twierdzenie 15. Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną, a $\{a_n\}$ ciągiem w niej. Zachodzą następujące wynikania:

1. $\{a_n\}$ jest zbieżny $\implies \{a_n\}$ jest Cauchy'ego

2. $\{a_n\}$ jest Cauchy'ego $\implies \{a_n\}$ jest ograniczony

3. $\{a_n\}$ jest Cauchy'ego i ma podciąg zbieżny $\implies \{a_n\}$ jest zbieżny

Dowód. (1) Wybieramy $\varepsilon > 0$. Jeśli $a_n \rightarrow a$, to istnieje takie N , że dla $n \geq N$ jest $d(a_n, a) < \frac{\varepsilon}{2}$. Zatem dla $p, q \geq N$ jest $d(a_p, a_q) \leq d(a_p, a) + d(a, a_q) \leq \varepsilon$.

(2) Niech $N \in \mathbb{N}$ będzie takie, że dla $p, q \geq N$ jest $d(a_p, a_q) < 1$. Dla $r = 1 + \sum_{n=0}^N d(a_n, a_N)$ wyrazy $\{a_n\}$ zawierają się w $\overline{K}(a_N, r)$.

(3) Niech $\{b_n\}$ będzie podciągiem $\{a_n\}$ zbieżnym do b . Ustalmy N, \tilde{N} takie, że dla $n \geq N$ jest $d(b_n, b) < \frac{\varepsilon}{2}$ oraz dla $p, q \geq \tilde{N}$ jest $d(a_p, a_q) < \frac{\varepsilon}{2}$. Dla $p \geq M = \max\{N, \tilde{N}\}$ mamy

$$d(a_p, b) \leq d(a_p, b_M) + d(b_M, b) < \varepsilon,$$

bo $b_M = a_q$ dla pewnego $q \geq M$. □

Uwaga. Zmiana początkowych wyrazów oraz permutacja ciągu nie mają wpływu na jego zbieżność, punkty skupienia, ograniczenie i warunek Cauchy'ego.

Zajęcia 4: Zbieżność w ciele

2025-01-02

Twierdzenie 16. Dla ciągu $\{a_n\}$ w ciele \mathbb{K} zbieżnego do $a \in \mathbb{K}$ zachodzi:

1. $(-a_n) \rightarrow (-a)$
2. $|a_n| \rightarrow |a|$
3. jeśli $a \neq 0$, to $a_n \neq 0$ dla $n \gg 1$ oraz $\frac{1}{a_n} \rightarrow \frac{1}{a}$.

Dowód. (1) Wprost z $|(-a_n) - (-a)| = |a_n - a|$.

(2) Podobnie, za pomocą odwróconej nierówności trójkąta $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$, którą dowodzimy rozpisując $|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y|$ i podobnie $|y| \leq |y - x| + |x|$, a więc $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

(3) Bierzemy $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$. Mamy $|a_n - a| < \varepsilon$ dla $n \gg 1$, a więc $|a_n| \geq |a| - |a_n - a| \geq |a| - \varepsilon = \frac{|a|}{2} > 0$. Korzystając z tej nierówności $\left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a} \right| = \frac{|a_n - a|}{|a_n||a|} \leq 2 \frac{|a_n - a|}{|a|^2} \rightarrow 0$. □

Twierdzenie 17. Operacja granicy jest zgodna z czterema podstawowymi działaniami (z dzieleniem, o ile granica dzielnika nie jest zerowa).

Dowód. Pokażemy tylko $a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$. Dodawanie i odejmowanie oczywiste, dzielenie wynika z mnożenia. Mamy

$$|a_n b_n - ab| \leq |a_n b_n - a_n b| + |a_n b - ab| = |a_n| |b_n - b| + |a_n - a| |b|,$$

a że ciągi zbieżne są ograniczone, to mamy $|a_n| \leq \tilde{M}$ dla pewnego \tilde{M} . Biorąc $M = \max\{\tilde{M}, |b|\}$ dostajemy $|a_n b_n - ab| \leq M(|a_n - a| + |b_n - b|)$, co zmierza do 0. □

Twierdzenie 18 (Bolzano-Weierstrassa). Każdy ograniczony ciąg liczb rzeczywistych $\{a_n\}$ ma podciąg zbieżny.

Dowód. Z ograniczenia $\{a_n\}$ istnieje taki przedział $I_0 = [b_0, c_0]$, że $a_n \in I_0$ dla $n \in \mathbb{N}$. Mając ustalony $I_n = [b_n, c_n]$ rozważmy przedziały $[b_n, \frac{b_n + c_n}{2}]$ oraz $[\frac{b_n + c_n}{2}, c_n]$. Definiujemy jako I_{n+1} ten z nich, w którym leży nieskończenie wiele wyrazów $\{a_n\}$ (w którymś na pewno, bo początkowo w I_0 są wszystkie). Dostajemy rodzinę przedziałów zstępujących, a więc $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset$. Weźmy $a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. Łatwo zauważyć, że $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{a\}$, bo $\text{diam } I_n \rightarrow 0$. Dla ustalonego $\varepsilon > 0$ istnieje takie n , że $I_n \subseteq (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, czyli w tym przedziale jest nieskończenie wiele wyrazów ciągu. A więc w dowolnym otoczeniu a są wyrazy ciągu, czyli a jest punktem skupienia. Z tego wynika, że istnieje podciąg o granicy w a . □

Wniosek. Każdy ograniczony ciąg liczb rzeczywistych ma punkt skupienia w \mathbb{R} .

Twierdzenie 19. Przestrzeń \mathbb{R} z naturalną metryką jest przestrzenią zupełną.

Dowód. Jeśli $\{a_n\}$ jest ciągiem Cauchy'ego, to jest ograniczony. Ciąg ograniczony ma podciąg zbieżny, a ciąg Cauchy'ego ze zbieżnym podciągiem jest zbieżny. \square

Twierdzenie 20. Niech $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ będzie rosnącym (malejącym) ciągiem ograniczonym z góry (dołu). Wtedy $\{a_n\}$ jest zbieżny.

Dowód. Rosnący ciąg ograniczony z góry jest ograniczony, więc ma punkt skupienia $a \in \mathbb{R}$. Zatem mamy

$$\forall \varepsilon > 0, N \in \mathbb{N} \exists n \geq N |a_n - a| < \varepsilon,$$

a że ciąg jest rosnący, to będzie to zachodziło dla każdej liczby większej niż n (jest $a_n < a$, bo inaczej będziemy się tylko od niego oddalać i nie będzie punktem skupienia).

Inny dowód: bierzemy $a = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dla $\varepsilon > 0$ istnieje n_0 takie, że $a - \varepsilon < a_{n_0}$. Zatem dla $n \geq n_0$ jest

$$a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq a < a + \varepsilon,$$

czyli $|a - a_n| < \varepsilon$.

Dowód drugiego wariantu analogiczny. \square

Lemat 1. Niech $\{a_n\}$ będzie ciągiem w \mathbb{R} , $a \in \mathbb{R}$. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ w \mathbb{R} wtedy i tylko wtedy, gdy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ w $\overline{\mathbb{R}}$.

Dowód. (\Rightarrow) Mamy

$$\begin{aligned} \bar{d}(a_n, a) &= \left| \frac{a_n}{1 + |a_n|} - \frac{a}{1 + |a|} \right| = \left| \frac{a_n + a_n|a| - a - a|a_n|}{(1 + |a_n|)(1 + |a|)} \right| \\ &\leq |a_n - a| + |a_n| |a| - a |a_n| = |a_n - a| + |a_n| |a| - a |a| + a |a| - a |a_n| \\ &\leq |a_n - a| + |a| |a_n - a| + |a| ||a| - |a_n||, \end{aligned}$$

gdzie pierwsza nierówność to przeszacowanie mianownika przez 1 i nierówność trójkąta. Widzimy, że ostatnie wyrażenie dąży do 0.

(\Leftarrow) Zdefiniujmy funkcję $\psi(x) = \begin{cases} -\infty, & x = -1 \\ \frac{x}{1-|x|}, & x \in (-1, 1) \\ +\infty, & x = 1 \end{cases}$. Jest ona odwrotnością bijekcji φ między \mathbb{R} a $\overline{\mathbb{R}}$ pokazanej wcześniej. Zakładając, że $|\varphi(a_n) - \varphi(a)| \rightarrow 0$ można pokazać jak wcześniej, że $|\psi(\varphi(a_n)) - \psi(\varphi(a))| \rightarrow 0$. \square

Lemat 2. Niech $\{a_n\}$ będzie ciągiem w $\overline{\mathbb{R}}$. Zbieganie $a_n \rightarrow +\infty$ ($-\infty$) w $\overline{\mathbb{R}}$ jest równoważne temu, że

$$\forall C \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N C < a_n (a_n < C).$$

Dowód. Wynika wprost z wypisania wzoru na odległość w $\overline{\mathbb{R}}$ – ciąg zbiega do nieskończoności tylko, gdy przekracza każde możliwe ograniczenie górne. \square

Twierdzenie 21. Niech $\{a_n\}$ będzie ciągiem w $\overline{\mathbb{R}}$. Taki ciąg ma punkt skupienia.

Dowód. Jeśli nieskończenie wiele wyrazów $\{a_n\}$ ma wartości $\pm\infty$, to któraś z tych wartości jest jego punktem skupienia. Jeśli skończenie wiele wyrazów ma te wartości, to możemy je zamienić na liczbę 1 bez wpływu na punkty skupienia. Mamy teraz ciąg w \mathbb{R} . Jeśli jest nieograniczony z góry lub z dołu, to odpowiednia nieskończoność jest jego punktem skupienia. Inaczej jest ograniczony, a więc ma punkt skupienia w \mathbb{R} , czyli też w $\overline{\mathbb{R}}$. \square

Definicja 36. Dla ciągu $\{a_n\} \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ definiujemy jego zbiór granic częściowych jako

$$\Gamma_{\{a_n\}} = \{a \in \overline{\mathbb{R}} : a \text{ jest punktem skupienia } \{a_n\} \text{ w } \overline{\mathbb{R}}\}.$$

Lemat 3. Dla ciągu $\{a_n\} \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ zbiór $\Gamma_{\{a_n\}}$ jest niepusty i domknięty w $\overline{\mathbb{R}}$, a do tego

$$\inf \Gamma_{\{a_n\}}, \sup \Gamma_{\{a_n\}} \in \Gamma_{\{a_n\}}.$$

Dowód. Każdy ciąg w $\overline{\mathbb{R}}$ ma punkt skupienia. Dalej oznaczmy $\Gamma_{\{a_n\}}$ przez S . Jeśli $b \notin S$, to istnieje jego otoczenie U w $\overline{\mathbb{R}}$, w którym leży skończona liczba elementów ciągu. Zatem $U \subseteq S^c$, bo U jest otoczeniem każdego swojego elementu. Zatem S^c jest otwarty, czyli S jest domknięty.

Oznaczmy teraz $a = \sup S$ i przypuśćmy, że $a \notin S$. Mamy $S \neq \emptyset$, a więc $a \neq -\infty$. Do tego $[a, +\infty] \cap S = \emptyset$. Rozważamy przypadki. Jeśli $a = +\infty$, to istnieje takie $R > 0$, że $(R, +\infty] \cap S = \emptyset$ (bo S^c jest otwarty), a z tego wynika, że $\sup S \leq R$ – sprzeczność. Podobnie, jeśli $a \in \mathbb{R}$, to istnieje takie $r > 0$, że $(a - r, a + r) \cap S = \emptyset$, czyli ponownie $\sup S \leq a - r$. Analogicznie pokazujemy dla infimum. Zauważmy, że to rozumowanie działa dla dowolnego zbioru domkniętego. \square

Definicja 37. Granicą górną (dolną) ciągu $\{a_n\}$ w $\overline{\mathbb{R}}$ nazywamy $\sup \Gamma_{\{a_n\}}$ ($\inf \Gamma_{\{a_n\}}$). Oznaczamy ją $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ ($\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$).

Twierdzenie 22. Niech $\{a_n\} \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ i $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Zachodzi

1. $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$
2. $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff a_n \rightarrow a$.

Dowód. (1) Niech $m = \inf \Gamma_{\{a_n\}}$ i $M = \sup \Gamma_{\{a_n\}}$. Mamy $m \leq M$ z niepustości $\Gamma_{\{a_n\}}$.

(2) Mamy $\Gamma_{\{a_n\}} \subseteq [m, M]$.

(\implies) a jest jedynym punktem skupienia $\{a_n\}$. Gdyby istniał taki ciąg indeksów $n_1 < n_2 < \dots$, że dla otoczenia $U \ni a$ jest $a_{n_k} \notin U$, to dałoby to ciąg $\{a_{n_k}\}$ o punkcie skupienia nie będącym a – sprzeczność. Zatem w U leżą prawie wszystkie wyrazy ciągu, czyli $a_n \rightarrow a$.

(\impliedby) Jest $\Gamma_{\{a_n\}} = \{a\}$, a więc $m = M$. \square