

ПАМЯТКА

Грудное вскармливание — лучшая забота о малыше

ЧЕГО ИЗБЕГАТЬ И ПОЧЕМУ

Что нежелательно	Почему это опасно
Заранее покупать смесь «на всякий случай»	Велик соблазн докормить при первом плаче. Чем больше смеси, тем меньше стимуляции груди и тем хуже приходит молоко
Мыть грудь с мылом перед каждым кормлением	Это смывает защитную смазку и убивает полезные бактерии, которые заселяют кишечник ребёнка
Поить малыша водой или чаем	До 6 месяцев грудное молоко на 87–90% состоит из воды. Допаивание снижает аппетит и нагрузку на почки
Сцеживаться «до последней капли» после каждого кормления	Так можно заработать гиперлактацию и застой. Сцеживаться нужно только при ощущении распираания или по назначению врача
Терпеть боль при кормлении	Боль — признак неправильного прикладывания или трещин. Терпеть нельзя, нужно поправлять и просить помощи



ЧТО ПОЛЕЗНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ



Приложить малыша к груди в первый час после родов (если нет противопоказаний)	Это запускает лактацию и даёт ребёнку бесценное молозиво
Кормить по требованию, а не по часам	Ребёнок сам знает, когда голоден и когда нужен контакт
Следить за захватом груди	Рот широко открыт, нижняя губа вывернута, подбородок касается груди, нет щёлкающих звуков
Пить тёплое питьё перед кормлением	Тёплая вода или чай улучшают прилив молока (рефлекс окситоцина)
Спать и отдыхать, когда спит малыш	Усталость одна из главных причин снижения лактации

ЧТО ВАЖНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПА

Родильный зал и первые сутки: Молозиво, а не молоко. Это норма! Молозиво очень жирное и питательное, его нужно мало. Желудок новорождённого размером с вишню. Не надо ждать «приливов молока», они будут на 2–5 сутки.

Первые 2 недели: Налаживание лактации. Кормить каждые 1,5–3 часа, даже ночью. Ночные кормления самые важные — они стимулируют гормон пролактин (отвечает за выработку молока на следующий день). Не давать пустышку, пока грудь не освоена.

После 1 месяца (установленная лактация): Молоко приходит легко, кормления комфортны. Малыш может сосать 5 минут или 40 минут — оба варианта норма. Не сцеживаться без необходимости. Можно вводить кормление в слинге, чтобы освободить руки.

Главное правило: Успех грудного вскармливания на 80% зависит от спокойствия мамы и поддержки близких. Если кажется, что молока мало — проверьте количество мокрых пелёнок (норма 6–8 в сутки). Если их достаточно — всё в порядке.



Выполнила студента 43 группы колледжа РостГМУ
Специальности Лечебное дело
Гаврилова Ирина