

Assignment 1 - EE1030

ee24btech11018 - D. Swaraj Sharma

SECTION-B // JEE MAIN / AIEEE

- (a) 425 (b) -425
(c) 475 (d) -475
1. If $1, \log_9(3^{1-x} + 2), \log_3(4 \cdot 3^x - 1)$ are in A.P then x equals [2002]
(a) $\log_1 4$ (b) $1 - \log_3 4$
(c) $1 - \log_4 3$ (d) $\log_4 3$
2. l, m, n are the p^{th}, q^{th} and r^{th} term of a G.P. all positive, then $\begin{vmatrix} \log l & p & 1 \\ \log m & q & 1 \\ \log n & r & 1 \end{vmatrix}$ equals [2002]
(a) 1 (b) 2
(c) 1 (d) 0
3. The value of $2^{\frac{1}{4}} \cdot 4^{\frac{1}{8}} \cdot 8^{\frac{1}{16}} \dots \infty$ is [2002]
(a) 1 (b) 2
(c) $3/2$ (d) 4
4. Fifth term of a GP is 2, then the product of its 9 terms is [2002]
(a) 256 (b) 512
(c) 1024 (d) none of these
5. Sum of infinite number of terms of a GP is 20 and sum of their square is 100. The common ratio of GP is [2002]
(a) 5 (b) $3/5$
(c) $8/5$ (d) $1/5$
6. $1^3 - 2^3 + 3^3 - 4^3 + \dots + 9^3 =$ [2002]
7. The sum of the series $\frac{1}{1.2} - \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} \dots$ up to ∞ is equal to [2003]
(a) $\log_e(\frac{4}{e})$ (b) $2\log_e 2$
(c) $\log_e 2 - 1$ (d) $\log_e 2$
8. If $S_n = \sum_{r=0}^n \frac{1}{nC_r}$ and $t_n = \sum_{r=0}^n \frac{r}{nC_r}$, then $\frac{t_n}{S_n}$ is equal to [2004]
(a) $\frac{2n-1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}n - 1$
(c) $n - 1$ (d) $\frac{1}{2}n$
9. Let T_r be the r th term of an A.P. whose first term is a and common difference is d . If for some positive integers $m, n, m \neq n, T_m = \frac{1}{n}$ and $T_n = \frac{1}{m}$, then $a - d$ equals [2004]
(a) $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ (b) 1
(c) $\frac{1}{mn}$ (d) 0
10. The sum of the first n terms of the series $1^2 + 2 \cdot 2^2 + 3^2 + 2 \cdot 4^2 + 5^2 + 2 \cdot 6^2 + \dots$ is $\frac{n(n+1)^2}{2}$ when n is even. When n is odd the sum is [2004]
(a) $\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$ (b) $\frac{n^2(n+1)}{2}$
(c) $\frac{n(n+1)^2}{4}$ (d) $\frac{3n(n+1)}{2}$
11. The sum of series $\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \dots$ is [2004]

$$(a) \frac{(e^2-2)}{e} \quad (b) \frac{n^2(n+1)}{2}$$

$$(c) \frac{n(n+1)^2}{2e} \quad (d) \frac{(e^2-1)}{2}$$

12. If the coefficients of r th, $(r+1)$ th, and $(r+2)$ th terms in the binomial expansion of $(1+y)^m$ are in A.P., then m and r satisfy the equation [2005]

$$(a) m^2 - m(4r-1) + 4r^2 - 2 = 0 \quad (b) m^2 - m(4r+1) + 4r^2 + 2 = 0$$

$$(c) m^2 - m(4r+1) + 4r^2 - 2 = 0 \quad (d) m^2 - m(4r-1) + 4r^2 + 2 = 0$$

13. If $x = \sum_{n=0}^{\infty} a^n$, $y = \sum_{n=0}^{\infty} b^n$, $z = \sum_{n=0}^{\infty} c^n$ where a, b, c are in A.P and $|a| < 1, |b| < 1, |c| < 1$ then x, y, z are in [2005]

(a) G.P.

(b) A.P.

(c) Arithmetic

- Geometric Progression

(d) H.P.

14. The sum of the series $1 + \frac{1}{4 \cdot 2!} + \frac{1}{16 \cdot 4!} + \frac{1}{64 \cdot 6!} + \dots \infty$ is [2005]

$$(a) \frac{e-1}{\sqrt{e}} \quad (b) \frac{e+1}{\sqrt{e}}$$

$$(c) \frac{e-1}{2\sqrt{e}} \quad (d) \frac{e+1}{2\sqrt{e}}$$

15. Let a_1, a_2, a_3, \dots be terms on A.P. If $\frac{a_1+a_2+\dots+a_p}{a_1+a_2+\dots+a_q} = \frac{p^2}{q^2}, p \neq q$, then $\frac{a_6}{a_{21}}$ equals [2006]

$$(a) \frac{41}{11} \quad (b) \frac{7}{2}$$

$$(c) \frac{2}{7} \quad (d) \frac{11}{41}$$