经典力学第二次作业

姓名: 林海轩 学号: 23307110267 院系: 物理学系 专业: 物理学

L01.23

> 单摆必须振幅很小才是作谐振动. 如果要求不论振幅大小只是作谐振动, 质点应改在什么样的曲线上运动?

根据能量守恒, 可以写出以下方程, 此处设 $y=f(x)$, 有

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{1}{2}m\frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}{\mathrm{d}t^2}+mgy \\
&= \frac{1}{2}m\frac{\mathrm{d}x^2+f'^2(x)\,\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}t^2}+mgf(x) \\
&= \frac{1}{2}m\left(1+f'^2(x)\right)\dot{x}^2+\frac{1}{2}2mg\frac{f(x)}{x^2}x^2.
\end{aligned}
$$

为了使得这个方程解是简谐运动, 需要

$$
\frac{f(x)/x^2}{1+f'^2(x)}=C.
$$

所以满足这个方程的曲线都符合题意, 其中一个解是二次曲线

$$
f(x)=ax^2. \qquad \forall a>0
$$

L01.28

> 在塔顶上, 许多弹子以相同的初速率同时从同一地点向四面八方散去. 问在其后任一时刻, 此等弹子将联成怎样的曲面?

在弹子群的质心参考系上看, 每个弹子都以相同的速率远离质心, 所以看上去弹子群都分布在半径以出射速率增大的球面上. 那么在地面参考系上看也是如此.

L01.37

> 物体 A 和 B 质量相等, 通过弹簧相连, A 上 B 下坐于水平面上. 用多大的力将 A 揿下, 放手后会使 B 跳起.

考究临界情况, 设弹簧恢复系数为 k, 按压深度为 Δx, 物体质量为 m, 重力加速度为 g, 那么根据简谐运动的对称性, 物体 A 反向减速到恰好静止时, 弹簧的伸长量为

$$\Delta x' = \Delta x - mg/k.$$

所以只要

$$k\Delta x' = k\Delta x - mg \geqslant mg,$$

即 $\Delta x \geqslant 2mg/k$ 即可.

L01.42

> 手持匀质软绳的上端, 让绳自由下垂, 绳的下端恰好触及桌面, 放手任绳下落. 求绳在下落过程中对桌面的压力.

设桌面压力为 N, 绳的线密度为 λ, 重力加速度为 g, 已经落在桌面上的长度为 l, 那么桌面上的压力由两部分组成, 第一部分为支撑已经落在桌面上的那部分绳, 第二部分为那一时刻恰好落在桌面上的那部分绳对桌面的冲击.

$$N = \lambda l g + \lambda v \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}.$$

其中 $v = \sqrt{2gl}$ 为绳子的速度, 这个结果的得到无需考虑绳桌上部分和空中部分相互作用的拉力, 因为绳子是 **软的**. 所以

$$N = 3\lambda g l.$$

若希望写成时间的函数, 代入 $l = \frac{1}{2}gt^2$ 即可:\

$$N = \frac{3}{2}\lambda g^2 t.$$

L01.43

> 匀质软绳全长 l, 单位长度质量为 ρ. 绳盘在地面上, 绳尾系于轻气球. 气球受升力 B 自地面升起, 求解气球的上升情况.

升力 B 将被用在两个地方, 一部分是用于已经在空中的绳加速, 另一部分是让那一时刻刚升上空中的一小部分绳获得初速度. 设绳子已经在空中的部分长度为 x, 速度为 v, 于是

$$B = \rho x\left(g + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right) + \rho v\mathrm{d}t \cdot v\frac{1}{\mathrm{d}t} = \rho x\left(g + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right) + \rho v^2.$$

这个方程的解为

$$v^2 = -\frac{1}{3}gx + \frac{2}{3}\frac{B}{\rho}.$$

如果 $gl > 2B/\rho$, 说明绳子不可能全部飞向空中, 此时在 $v^2 = 0$ 即 $x = 2B/\rho g$ 时停止运动. 如果 $B/\rho < gl \leqslant 2B/\rho$, 说明绳子可以全部飞向空中, 但是因为绳子的重力大于升力, 绳子会在空中减速, 之后反向运动直至有一部分回到地面. 若 $gl < B/\rho$, 说明绳子重力比升力小, 离开地面后会加速 (临界时是匀速) 升向天空.