A075-v0.2.0

Hydrodynamische energie-invanging

Driedimensionale Euler-dynamica, knoopgeometrie en operationele klok

SST-Workbench | Framework v1.0.10 adaptor (lokale runstatus in framework-ledger)

27 oktober 2026 | **DEVELOPMENT ONLY**

Samenvatting

De onderzoeksvraag is of een vrij evoluerende, volledig gekoppelde wervelstructuur na verstrooiing extra lokale energie kan behouden gedurende veel eigen klokcycli, terwijl de lokale fluxbalans en numerieke convergentie sluiten. Deze release introduceert een zelfstandige, driedimensionale, periodieke Fourier–Galerkin-Eulerreferentie, met een finite-core-vorticiteitsinitialisatie, onafhankelijke ontvanger-zonder-broncontrole en twee onafhankelijke resolutierichtingen. Er zijn geen gefitte snelheids-, resonantie- of dempingsparameters. De uitgevoerde `PREVIEW` is bewust ondergeresolveerd en toont geen bronvertrek of onafhankelijke klok. **Fysische conclusie: UNRESOLVED.** De originele preview is zonder lokale Framework-FREEZE uitgevoerd. De latere lokale FREEZE- en gate-uitkomsten staan uitsluitend in de automatische framework-ledger.

1 Exacte vraag en falsifieerbare nulhypothese

Kan een vrij evoluerende, volledig gekoppelde wervelstructuur na verstrooiing een positieve lokale energietoename behouden gedurende vele eigen klokcycli, terwijl de energiefluxbalans sluit en het resultaat numeriek convergeert?

H_0**:** zolang bronvertrek, lange klokduur en onafhankelijke ruimtelijke, temporele en kern-convergentie ontbreken, is invanging niet aangetoond.
H_1**:** een uit onafhankelijke geometrie en vooraf gekozen parameters verkregen, positieve minimumretentie na geverifieerd vertrek over minstens 100 robuuste ontvangerperioden, met sluitende energieflux in een voldoende opgelost Euler-volume. De eis van honderd cycli is hier een *vooraf ingestelde operationele verificatiegrens*, geen nieuwe natuurconstante.

2 Volledige veldvergelijkingen en druk

Met constante dichtheid ρ_f, absolute evolutietijd t en vorticiteit $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \qquad \partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\nabla p/\rho_f, \tag{1}$$

$$\partial_t \mathbf{u} = \mathbb{P}(\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}), \qquad \Delta \left(\frac{p}{\rho_f} + \frac{|\mathbf{u}|^2}{2} \right) = \nabla \cdot (\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}). \tag{2}$$

$\mathbb{P}$ is de divergente-vrije Lerayprojector. De initiële drie gesloten kernen worden gedeponeerd als vorticiteitslijnen en door een expliciet vermelde Gauss-kern gladgemaakt. Het daaropvolgende 3D-veld volgt Fourier–Galerkin-Euler met tweederde-dealiasing en vierde-orde Runge–Kutta. **Geen cirkelgeometrie wordt tijdens evolutie opgelegd.** Deze numerieke benadering is geen bewijs van voortbestaan van drie afzonderlijke materiële tubes bij eindige roosterbreedte. De periodieke rand zorgt voor beeldinteracties en vereist een afzonderlijke domeinlengtestudie.

3 Knoopconfiguraties en invoerherkomst

Test	Receiver 2	Geometrische autoriteit
0_1	circulaire unknot	analytische testgeometrie
3_1	torustrefoil $T(2,3)$	analytische embedding; niet ideaal
5_2	twistknoop	alleen originele `KNOT_5_2_N2048_ORIG.xyz`
6_1	twistknoop	alleen originele `KNOT_6_1_N2048_ORIG.xyz`

In elk geval blijven de eerste ontvanger 0_1 en de inkomende bron 0_1. Alle drie hebben eindige, initieel gladde vorticiteitsbreedte. De twee externe twistknopen ontbreken in de geleverde omgeving en worden daarom niet gesimuleerd, noch vervangen door verzonnen knopen. Bij geladen invoerbestanden worden de oorspronkelijke bytes met SHA-256 vastgelegd; de topologische identiteit vereist vervolgens een afzonderlijke verificatie.

4 Lokale energie, flux en controle zonder donor

De lokale energiedichtheid en het volledige Eulerfluxveld luiden

$$e = \frac{\rho_f}{2}|\mathbf{u}|^2, \qquad \partial_t e + \nabla \cdot [(e+p)\mathbf{u}] = 0. \tag{3}$$

Voor een *meebewegend maar vormvast* zacht venster $W(\mathbf{x} - \mathbf{X}(t))$ met venstersnelheid $\mathbf{w} = \dot{\mathbf{X}}$:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\int W e \, dV = \int \nabla W \cdot \big[(e+p)\mathbf{u} - e\mathbf{w}\big] \, dV.} \tag{4}$$

Het venster volgt een passieve referentiemarker van de *controle zonder donor*; exact hetzelfde venster wordt voor de run met bron gebruikt. Dit voorkomt dat verschillende vensterposities een schijnbare verandering maken. **Het venster is geen volledig vervormend materieel volume.** Flux wordt vergeleken met dE_W/dt en bij toekomstige kwalificatie verfijnd in Δx, Δt en de vensterrandbreedte.

$$\Delta E_W(t) = E_W^{(\text{bron})}(t) - E_W^{(\text{controle})}(t), \qquad \eta_{\text{floor}} = \frac{\inf_{t \in W_{\text{laat}}} \Delta E_W(t)}{E_{\text{donor,isolated}}}. \tag{5}$$

Een positieve waarde bij begin of binnen een kort venster is geen absorptie: de inkomende kern kan nog binnen het venster zijn, de ontvangende geometrie kan zijn verplaatst en de energie omvat interferentiekruistermen. η_{floor} is daarom pas een *retentiemaat* na apart bronvertrek, latetime-klok- en fluxgate.

5 Absolute tijd en ontvanger-eigenklok

Een klok wordt niet vooraf geïdentificeerd met de absolute evolutietijd. Eerst moet een onafhankelijk, stabiel periodiek ontvangstsignaal $q_A(t)$ worden gemeten. Zijn uitgepakte fase $\theta_A(t)$ geeft

$$N_A[t_1, t_2] = \frac{\theta_A(t_2) - \theta_A(t_1)}{2\pi}, \qquad \Delta\tau_A = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\tau_A}{dt} \, dt. \tag{6}$$

Er is *geen* automatische klokvalidatie op basis van enkele maxima. Deze release vereist bronvertrek, meer dan honderd gekwalificeerde ontvangercycli en robuuste piekperioden onder resolutieverandering. Een optisch-fotonmodel, atoomidentiteit of intrinsieke PKLSA-klok wordt niet aangenomen.

6 Numerieke uitvoering: echt uitgevoerde PREVIEW

De onderstaande getallen komen uit het zelfstandig uitgevoerde veldmodel, *niet* uit een authentieke Framework-FREEZE. De genormaliseerde eenheden zijn consequent interpreteerbaar als SI-schaalwaarden; er is geen atomair constante-fit gebruikt.

Diagnostiek	0_1	3_1
Roostercellen per as (grof / fijner)	24 / 32	24 / 32
Fysieke eindtijd (s)	1.20	1.20
Kernbreedte per grof roosterpunt	1.32	1.32
Maximale CFL-waarde	0.07037	0.08188
Relatieve globale energiedrift	1.955e-11	5.727e-11
Fluxbudgetresidu / beginenergie	5.122e-05	5.857e-05
Ruimtelijke verschilmaat / donorenergie	0.00389	0.01271
Temporele verschilmaat / donorenergie	4.306e-06	9.908e-06
Gekwalificeerde klokperioden	geen	geen

De geringe globale energiedrift is een noodzakelijke conserveringscontrole, maar de kernbreedte op het grove rooster is slechts 1.32 rasterstappen; **beide previewcases zijn dus ondergeresolveerd**. De lokale controleverandering is *niet* een post-exit absorptiemeting. Bronvertrek werd niet gemeten. De onbekende fysische uitkomst is geen negatieve of positieve ontdekking.

7 Wetenschappelijke gates, stopcriteria en framework-integratie

Gate	Status	Reden en minimale vervolgeis
G0	NOT RUN	Authentieke Framework v1.0.10 FREEZE is op dit systeem niet gedraaid. Nieuwe private commitment vereist.
G1	PASS	A021/A032-methodologiebytes afzonderlijk tegen SHA-256 gecontroleerd.
G2	UNRESOLVED	Tijd- en ruimterefinement aanwezig, maar kern onvoldoende opgelost; derde niveau en core- en domeinconvergentie ontbreken.
G3	UNRESOLVED	Geen bewezen bronvertrek, geen robuuste eigenklok en geen honderd-cycli-retentie.
G4	NOT RUN	Geen vooraf geregistreerde onafhankelijke blind-holdout.
G5/G6	NOT RUN	Geen native C++/pybind11- of SYCL/device-pariteit voor deze provider.
G7	BLOCKED	De originele $5_2/6_1$ geometriebestanden ontbreken; onafhankelijke topologiecontrole nodig.
G8	UNRESOLVED	Periodiek Euler-veld bestaat, maar finite-core-, venster-, domein- en topologieconvergentie ontbreken.
G9	WITHHELD	Geen fysieke statuspromotie of private reveal.

Exacte gebruikersvolgorde op Windows: `python -m pytest -q tests`; `run_all.cmd FREEZE`; `run_all.cmd BASIC`; `run_all.cmd FULL`. Zonder de gedeelde Framework-installatie kan uitsluitend `python run_preview.py -profile PREVIEW` worden uitgevoerd. Die stand-alone run is geen Framework-gatevalidatie en kan geen nieuwe frozen protocol-IDs uitgeven. De originele A075-v0.1.0 bestanden en outputs blijven ongewijzigd.

8 Eindantwoord

UNRESOLVED. De huidige data bewijzen geen langdurige invanging in een volledig convergente driedimensionale Eulerstroming. De nieuwe release biedt wel een werkelijke 3D-veldprovider, no-donorcontrole, druk-energieboekhouding, reproduceerbare knoopselectie en aparte temporele/ruimtelijke vergelijkingen. De niet-opgeloste bronvertrek-, klok-, kern-, domein- en holdoutgates verhinderen iedere positieve fysische claim.

9 Automatisch vastgelegde registratie en gate-uitkomsten

Onderstaande gegevens worden uitsluitend tijdens een echte Framework-uitvoering gegenereerd. Bij afwezigheid van bestanden is geen framework-gate uitgevoerd.

Machine-readable science contract

Research question Can a source-free, fully 3D Euler vorticity-field receiver, composed of closed finite-core rings/knots, retain additional local kinetic energy through an independently observed post-source-exit interval spanning many receiver clock cycles, while local energy flux and convergence close?

Objective Adversarial falsification: 3D periodic Euler screening with separate controls for conservative energy, pressure, comoving control volume, explicit 0_1/3_1/5_2/6_1 embeddings, and strong non-promotion of short run proxies.

H_0 H0: no independent qualification of source departure, positive late minimum energy above no-donor control across many cycles and convergent energy-flux closure.

H_1 H1: all preregistered post-exit late-time, core, spatial, time, periodic-box, clock and no-donor controls pass in an independent holdout.

Registered equations

E1: Euler and incompressibility

$$\partial_t \mathbf{u} = \mathbb{P}(\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}),\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0,\ \boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u} \tag{7}$$

Dimensional check: L/T^2

E2: Pressure-Poisson recovery

$$\Delta(p/\rho + |\mathbf{u}|^2/2) = \nabla \cdot (\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}) \tag{8}$$

Dimensional check: 1/T^2

E3: Local energy balance translating fixed-shape window

$$\frac{d}{dt}\int We\, dV = \int \nabla W \cdot [(e+p)\mathbf{u} - e\mathbf{w}]\, dV, \quad e = \rho|\mathbf{u}|^2/2 \tag{9}$$

Dimensional check: J/s

E4: Matched donor versus no-donor windows

$$\Delta E_W(t) = E_W^{\text{donor}}(t) - E_W^{\text{control}}(t) \tag{10}$$

Dimensional check: J

E5: Only post-exit retentive floor

$$\eta_{\text{floor}} = \inf_{t \in W_{\text{late}}} \Delta E_W(t)/E_{\text{in}} \tag{11}$$

Dimensional check: 1

E6: Separate absolute time and local receiver clock cycles

$$N_A = \frac{\theta_A(t_2) - \theta_A(t_1)}{2\pi} \tag{12}$$

Dimensional check: 1

Registered code-to-mathematics steps

1. **S01** [G0; equations E1]: Freeze authentic Framework v1.0.10 protocol locally before scientific runs
2. **S02** [G2; equations E1, E3, E4]: Run baseline without donor and matched donor run with identical precommitted control-window trajectory
3. **S03** [G2; equations E1, E3, E4]: Repeat at half timestep holding the absolute physical final time and geometry fixed
4. **S04** [G2; equations E1, E2, E3]: Repeat at finer grid spacing holding the physical core radius and final time fixed
5. **S05** [G3; equations E3, E5, E6]: Check periodic box, core profile, source exit by material transport, and independent clock qualification
6. **S06** [G4; equations E4, E5, E6]: Execute independent held-out initial conditions and source-qualified knot geometries after locked gates

Automatic run provenance

Field	Recorded value
Run ID	20261027T205557452564Z-9a2ca34b
Run phase	BLIND
Protocol bundle SHA-256 (byte exact)	5581263dd89aa58b0f2648fb7b376aa76f8bbec31f5367f4cbd00f1ea6962221

Portable protocol diagnostic SHA-256	dca204dac6826ca0c76112fac3d04afcdc6231e32208db4aafb83728d1300e17
Framework schema	SST-FALSIFIER-PROTOCOL-2
Python	3.13.9 (tags/v3.13.9:8183fa5, Oct 14 2025, 14:09:13) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
Platform	Windows-11-10.0.26300-SP0
Science evidence SHA-256	970751c8cf2812fc5a2300600ead2f1d783e11595a65ee352a407a1046078d6a
Final output manifest	See OUTPUT_MANIFEST.json (finalized after PDF and report metadata)

Gate ledger

Gate	Status	Question	Reason
G0	PASS	Authentic pinned framework v1.0.10: fresh frozen protocol plus unmodified private keys?	Genuine v1.0.10 framework invoked science adapter
G1	PASS	A021/A032 method-hash parity and real knot dataset provenance? (0_1 and 3_1 analytic reference only)	Exact A021/A032 method hash check
G2	UNRESOLVED	3D Euler short-screen diagnostic passes resolved core and fixed-T independent space/time/flux checks?	Independent temporal/spatial short-run periodic Euler screening; not final physical test
G3	UNRESOLVED	Does measured positive minimum excess persist AFTER verified donor exit for >=100 independent receiver cycles?	No verified donor exit, independent clock or long time tail
G4	UNRESOLVED	Does an unseen preregistered initial-state and phase holdout reproduce qualified post-exit capture?	No independent preregistered holdout
G5	NOT_APPLICABLE	Independent native C++ vs NumPy-FP64 parity across fixed fields?	Disabled by framework profile
G6	NOT_APPLICABLE	SYCL/GPU parity across same Euler tests?	Disabled by framework profile
G7	NOT_APPLICABLE	5_2 and 6_1 source-qualified embeddings replicate or falsify outcome? Box/core sensitivity?	Disabled by framework profile
G8	UNRESOLVED	Are fully 3D finite-core, box-size, control-window flux and topology convergences physically certified?	3D periodic Euler field implemented; full flux, finite-core and box convergences not qualified
G9	DEFERRED	Only controlled private reveal after G8 qualifies	Reveal is a separate, commitment-verified phase and is not executed during blind runs.

Scientific qualification (separate from measured gate outcomes)

Gate	Evidence qualification	Blocking prerequisites
G0	QUALIFIED	none
G1	QUALIFIED	none
G2	UNRESOLVED	none
G3	DIAGNOSTIC_ONLY	G2
G4	DIAGNOSTIC_ONLY	G3
G5	NOT_APPLICABLE	G4
G6	NOT_APPLICABLE	G5
G7	NOT_APPLICABLE	G6
G8	DIAGNOSTIC_ONLY	G3
G9	DEFERRED	G8

Backend manifest

{

```
  "native_cpp_parity": "NOT_RUN",
  "physical_answer": "UNRESOLVED",
  "python_reference": {
    "actual_backend": "python-numpy-fft64",
    "authority": "DEVELOPMENT_ONLY",
    "precision": "float64"
  },
  "schema": "SST-BACKEND-MANIFEST-2",
  "science_gate_file": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench\\01_research\\
A_falsifiers\\A075_hydrodynamische_resonante_invanging\\A075-v0.2.0\\A075_Hyd
rodynamische_Resonante_Invanging_v0.2.0-outputs\\science\\A075_GATES.json",
  "source_hashes": {
    "A021":
"b615595589551dafbcabddc223e554abeb6ab5a02a064fa96522af73d533e3e9",
    "A032":
"e78411ee0a3a0cd770bd8293e117f44b1908bd419877b5163d5df21b71b9da0e"
  },
  "status": "DEVELOPMENT_ONLY",
  "sycl_gpu_parity": "NOT_RUN"
}
```


Source manifest


```
{
  "manifest_sha256":
"baf004758e5344092222f859f31a8e288da31757428a3a6bf2ee2b0294999f24",
  "schema": "SST-SOURCE-MANIFEST-2",
  "sources": [
    {
      "catalog_id": "A021",
      "evidence_class": "simulation",
      "exists": true,
      "independence_family": "A021",
      "path": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench\\01_research\\A_falsifi
ers\\A075_hydrodynamische_resonante_invanging\\A075-v0.2.0\\source_evidence\\
A021_README.md",
      "provenance_family": "A021",
      "registry_hint": {
        "catalog_id": "A021",
        "hits": []
      },
      "role": "methodological_reference",
      "sha256":
"b615595589551dafbcabddc223e554abeb6ab5a02a064fa96522af73d533e3e9",
      "source_id": "A021",
      "version": "v0.4.0"
    },
    {
      "catalog_id": "A032",
      "evidence_class": "simulation",
      "exists": true,
      "independence_family": "A032",
      "path": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench\\01_research\\A_falsifi
ers\\A075_hydrodynamische_resonante_invanging\\A075-v0.2.0\\source_evidence\\
A032_README.md",
      "provenance_family": "A032",
      "registry_hint": {
        "catalog_id": "A032",
        "hits": []
      },
      "role": "methodological_reference",
      "sha256":
"e78411ee0a3a0cd770bd8293e117f44b1908bd419877b5163d5df21b71b9da0e",
      "source_id": "A032",
      "version": "v0.1.0"
    },
    {
      "catalog_id": "A075",
      "evidence_class": "simulation",
      "exists": true,
      "independence_family": "A075",
      "path": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench\\01_research\\A_falsifi
ers\\A075_hydrodynamische_resonante_invanging\\A075-v0.2.0\\experiment\\euler
3d.py",
      "provenance_family": "A075",
      "registry_hint": {
```

```
        "catalog_id": "A075",
        "hits": []
      },
      "role": "numerical_solver",
      "sha256":
"82d2eed17d8963dcfdcc13f18647d5b1479c22b00c9909ff500195aa47c5286b",
      "source_id": "LOCAL_CODE",
      "version": "v0.2.0"
    }
  ],
  "workbench_root": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench\\01_research\\A_f
alsifiers\\A075_hydrodynamische_resonante_invanging\\A075-v0.2.0"
}
```


Referenties

[1] P. G. Saffman, *Vortex Dynamics*, Cambridge University Press (1992).

[2] A021-v0.4.0, Trefoil Lobe Self-Confinement, SST-Workbench methodedossier; bijgevoegd als bytes en SHA-256.

[3] A032-v0.1.0, Kelvin–Joule Transient Energy, SST-Workbench methodedossier; bijgevoegd als bytes en SHA-256.

[4] A075-v0.1.0 en afzonderlijke Hamiltoniaanse drieringspilot, verkennende modellen; geen complete Eulerkwalificatie.