


有关艾滋的误解&纠正

转载自人民日报 [WHU性别性向平等研究会](#) 2015-12-08

因为主页君们都是学生，不可避免地对某些方面了解不够全面：（所以有些推送可能有些错误，跪求原谅。然后，我们会尽力的。恩，这个是转载自人民日报关于艾滋的一些误解&纠正，希望大家对艾滋的了解能够更多一些，歧视能够更少一些：）

大家有什么意见建议请提出【虚心求教脸】





世界艾滋病日

了解，防治，消除歧视

@人民日报
PEOPLE'S DAILY

预防艾滋病， 你该知道的常识



- 4.洁身自爱、遵守性道德是预防经性途径传染艾滋病的根本措施。
- 5.正确使用避孕套不仅能避孕，还能减少感染艾滋病、性病的危险。
- 6.共用注射器吸毒是传播艾滋病的重要途径，要拒绝毒品，珍爱生命。
- 7.避免不必要的输血、注射、使用没有严格消毒的拔牙和美容器具等，正规使用经艾滋病病毒抗体检测的血液和血液制品。

@人民日报



世界艾滋病日

了解，防治，消除歧视

@人民日报
PEOPLE'S DAILY

错误认识①：

感染HIV就是艾滋病患者



HIV即艾滋病毒，而艾滋病（AIDS）指的是艾滋病毒感染的最后阶段。

人体在感染艾滋病毒2—10年甚至更久后，因为免疫系统受到毁灭性破坏，才会发展为艾滋病，出现感染、肿瘤等体征。

@人民日报

错误认识②：

**一旦感染艾滋病毒，
剩下的日子就不多了**

不同的艾滋病毒感染者的潜伏期不同。有些会在短短数月内发病，而有些人却能携带HIV生活数十年，甚至达到预期寿命。

谨遵医嘱、坚持有效治疗，可以有效延长感染者寿命。

@人民日报

错误认识③：

**只有滥交者、吸毒者等
高危人群才会感染HIV**

在我国，HIV感染已经从高危人群向一般人群扩散。1985—2005年间，我国艾滋病的主要传播途径为静脉吸毒和非法采供血。而目前我国的艾滋病感染率达千分之六，今年新增患者中94.3%是通过性传播途径感染的。艾滋病毒的传播越来越向城市转移、变得更为隐蔽。

@人民日报



世界艾滋病日

了解，防治，消除歧视

@人民日报
PEOPLE'S DAILY

错误认识④：

同性恋=艾滋病

目前，中国男男性行为人群的平均感染艾滋病率达7.7%，而这一比例还在持续增高，但同性恋本身与艾滋病传播并无关联，而是因为男男性行为的特性更易导致病毒传播。对同性恋的过分恐惧和排斥反而会加大同性恋者的隐蔽性，增加防治艾滋病的难度。

@人民日报



世界艾滋病日

了解，防治，消除歧视

@人民日报
PEOPLE'S DAILY

错误认识⑤：

被蚊虫叮咬可能感染HIV

脱离人体的艾滋病毒十分脆弱，以下日常行为并不会传染HIV：

- ① 抚摸、亲吻、拥抱、握手等礼节性接触；
- ② 与感染者共用碗筷、杯子等日常餐具；
- ③ 使用公共设施，如厕所、游泳池、公共浴池、电话机、公共汽车等；
- ④ 蚊子、苍蝇、蟑螂等昆虫叮咬。

@人民日报



世界艾滋病日

了解，防治，消除歧视

@人民日报
PEOPLE'S DAILY

错误认识⑥：

安全套防不住HIV

世卫组织指出，有证据表明，男用乳胶安全套对艾滋病毒及其它性传播感染的防护率达85%以上。质量好、正规厂家生产的安全套，完全可以有效隔绝病毒、大幅降低性行为的危险性。

当然，最安全的还是避免多个性伴侣、一夜情等高危性行为。

@人民日报



世界艾滋病日

了解，防治，消除歧视

@人民日报
PEOPLE'S DAILY

错误认识⑦：

HIV携带者不能要孩子

艾滋病毒的母婴传播几乎可以完全避免。

携带HIV的孕妇如果与医生积极配合，采用正确的药物和治疗，帮助胎儿抵御HIV，可以有效降低病毒的传递。

不过需要注意的是，艾滋病毒感染者用母乳喂养可能会将HIV传染给孩子。

@人民日报